

Zur Erforschung des Persischen Golfes.

(Beitrag Nr. 6).

Scarabaeidae.

Par Dr. A. Boucomont, Cosne (Nièvre).

Scarabaeus sacer L.: Mésopotamie: Basra, (Schmidt avril 1926).

Scarabaeus cristatus F. (Espèce répandue en Afrique moyenne depuis le Sénégal jusqu'en Abyssinie; décrite d'Arabie par Klug sous le nom de *compressicornis*).

Mésopotamie: Basra (Schmidt, avril 1926). — Perse: Bender Abbas (Schmidt, mai 1926).

Cymnopleurus arabs Garreta, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 357. (Décrit d'Arabie orientale: Dibba, sur la presqu'île d'Oman. Cette espèce est peut-être synonyme de *G. mopsus* Pall., var. *persianus* Reitt. (Wien. Ent. Zeit., XXVIII, 1909, p. 79) que je ne connais que par la description. En tous cas, *G. arabs*, dont je possède un cotype, est certainement distinct de *G. mopsus*).

Perse: Bouehir (Schmidt, mai 1926).

Gymnopleurus coriarius Herbst var. Variété très voisine de la var. *asperatus* Muls., 1842; elle en diffère par l'intervalle sutural qui est marqué d'une série de granules, comme dans la forme typique, au lieu d'être lisse, et par la présence, sur le disque du thorax, de trois lignes plus ou moins nettes, dépourvues de fovéoles, l'une longitudinale, les deux autres obliques, ramifiées à la première; les intervalles des fovéoles sont très densément pointillés, coloration entièrement noire. Comme *asperatus*, cette variété diffère du type par la sculpture du thorax: les fovéoles sont plus petites et plus serrées, avec un granule placé, non pas au centre, mais au bord antérieur.

Perse: Bouehir (Schmidt, mai 1926).

Catharsius inermis Cast. (Espèce africaine étendant son habitat jusqu'au Sind: Kurrachee [Maindron]).

Mésopotamie: Koweit (Schmidt, mai 1926).

Onthophagus Oberthüri d'Orb. (Décrit de Mésopotamie).

Mésopotamie: Basra (Schmidt, avril 1926). Un seul exemplaire (rare!).

Onthophagus Heydeni Har. (Décrit de Samoua, sur l'Euphrate, cité de Bagdad).

Mésopotamie: Basra (Schmidt, avril 1926), un seul exemplaire ♀ (rare!).

Onthophagus sticticus Har. (Décrit d'Égypte et d'Arabie; répandu dans le nord de l'Afrique et en Abyssinie).

Perse: Bouchir (Schmidt, avril 1926).

Onthophagus nitidulus Klug 1845 [non 1855] Décrit de Haute Egypte, cité par d'Orbigny d'Arabie, Mésopotamie, Sind, Abyssinie).

Perse: Bouchir (Schmidt, avril 1926).

Zur Erforschung des Persischen Golfes.

(Beitrag Nr. 7).

Hemiptera.

By W. E. China, British Museum, London.

Heteroptera.

Family Pentatomidae.

Schizops (sp. nov.): 1 ♂, Bender Abbas 27—29. V. 1926 (Schmidt).

Only three species of this genus are known: *S. aegyptiaca* (Lefeb.) is recorded from Corsica, Turkey, Egypt, Nubia, Sudan, Arabia and Uganda (?). *S. insignis* Walk and *S. nepalensis* Dist. are recorded from Burma and Nepal respectively.

Family Lygaeidae.

Spilostethus pandurus var *militaris* (F.): 1 ♂, Buschehr 5. V. 1926; 1 ♂ and 3 larvae, Buschehr 28. IV. 26 (Schmidt).

This species is widely distributed in the Old World, being recorded from the Mediterranean subregion and from the Ethiopian, Oriental and Australasian regions. The variety *militaris* F. is apparently restricted to the Mediterranean subregion and the Ethiopian region.

Spilostethus longulus (Dallas): 2 ♂♂, Bender Abbas 29. V. 1926 (Schmidt).

Recorded from Algeria, Tunisia, Egypt, Arabia and Abyssinia.

Emblethis gracilicornis Puton: 2 ♀♀, Basra 14. IV. 26 (Schmidt).

Recorded from Arabia and Palestine. This species is not a true *Emblethis* and probably forms a new genus between *Ischnopeza* and *Emblethis*.

Disuchus sp.: 1 larva, Buschehr 6—7. IV. 1926 (Schmidt).

The larvae of this genus are at present indeterminate.

Family Reduviidae.

Ectomocoris ululans (Rossi): 1 ♂, Basra, 16—22. IV. 1926 (Schmidt).

Recorded from Mediterranean sub-region, S. Russia, Caucasus, Persia, Mesopotamia and Turkestan.

Pirates (sp. nov.): 1 ♀, Basra 14. IV. 1926 (Schmidt).

This species is similar in general appearance to *Ectomocoris cordiger*