

A 1208

Deutsches Entomologisches Institut  
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften  
Eberswalde



GÜNTHER PETERSEN & HANNELORE GAEDIKE

## Katalog der in den Sammlungen des Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen-II

Dermoptera, Mantodea, Blattariae, Isoptera, Phasmida, Saltatoria

### DERMAPTERA

*addita* BURR, 1913 (*Anisolabis*)

(Ent. Mittl., 2, 66–67, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, Anping, Formosa, leg. SAUTER, im DEI.

*boettcheri* BORELLI, 1923 (*Labia*)

(Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino, 38, Heft 13, 7)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, 11.–12. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*dubius* MOREIRA, 1931 (*Spongovostox*)

(Konowia, 10, 165–169, Fig. 1)

♂ Holotypus, Argentinien, Territorio de Missiones, Rio Parana, leg. LE MOULT, im DEI.

*fulvochracea* BORELLI, 1923 (*Chaetospania*)

(Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, 38, Heft 13, 8–10)

Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Surigao, isola Mindanao, leg. BAKER; 3 ♀♀, Nord-Palawan, Binaluan, leg. BOETTCHER, XI.–XII. 1913.

DEI: 2 ♀♀, Syntypen, N. Palawan, Binaluan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHER.

*infernalis* BURR, 1913 (*Chaetospania*)

(Ent. Mittl., 2, 67–68, Fig. 3)

Syntypen: 1 ♂, 7 ♀♀, Taihorin, 1 ♀, Kosempo und verschiedene Larven.

DEI: 21 Syntypen, davon 4 Larven, heterogen, dringend revisionsbedürftig.

*nodifex* HEBARD, 1917 (*Labia*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 69, 240–242)

Cacao, Trece Aguas, Alta Vera Paz, Guatemala, leg. BARBER & SCHWARZ, ♂ Holotypus, 26. IV. 1906, im U.S. National Museum; 6 ♂♂, 12 ♀♀, vom gleichen Fundort, 29. III./26. IV. 1906; 1 ♀, Fortin, Vera Cruz, Mexico, XI. 1887, leg. BRUNNER; 1 ♂, Cordoba, Vera Cruz, Mexico, III. 1908, leg. KNAB, Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Cacao Trece Aguas, 29. III., Alta V. Paz. Guatemala, leg. SCHWARZ & BARBER.

### MANTODEA

*affinis* GIGLIO-TOS, 1917 (*Humbertiella*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 83)

♀ Holotypus, Nalanda, Ceylon, 1899, leg. HORN, im DEI.

**atra** GIGLIO-TOS, 1913 (*Myrmecomantis*)

Gen. Ins., 144, 6, Taf., Fig. 1, 1a, 1b)

♀ Holotypus, Endeavour River, N.S. Wales, im DEI.

**aurea** GIGLIO-TOS, 1917 (*Calidomantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48, (1916), 48–49)

♀ Holotypus, Tabu, Elfenbeinküste, leg. NAGEL, im DEI.

**camerunensis** GIGLIO-TOS, 1917 (*Plistospilota*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 62)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

**centralis** GIGLIO-TOS, 1917 (*Uromantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 57)

3 ♂♂, Syntypen, San Mateo, 400 m, Costa Rica, im DEI.

**cinctipes** GIGLIO-TOS, 1917 (*Auromantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 56)

♂ Holotypus, San Mateo, 400 m, Costa Rica, leg. HEYNE, im DEI.

**decipiens** GIGLIO-TOS, 1915 (*Pseudomioptera*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 184)

Syntypen: 1 ♂, Columbia, im Mus. Berlin; 4 ♀♀, Cañon del Tolima, Colomb., Central Cordill., 1700 m, im DEI.

**horni** WERNER, 1927 (*Amorphoscelis*)

(Ent. Mittl., 16, 183)

♀ Holotypus, Bas Ogoué, Gabun, leg. LEMOULT, im DEI.

**indica** GIGLIO-TOS, 1914 (*Loxomantis*)

(Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli, 4, Nr. 15, 12)

♂ Holotypus, Madras, im DEI.

**tata** GIGLIO-TOS, 1915 (*Elmantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 162–163)

Syntypen, mehrere ♂♂ und ♀♀ aus Ceylon im Museum Berlin und im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Anuradhapura, Ceylon, leg. HORN; 1 ♂, 2 ♀♀, Habrana, Ceylon, 1899, leg. HORN; 2 ♀♀, Kanthalay, Ceylon, leg. HORN.

**laticollis** BEIER, 1933 (*Odontomantis*)

(Mitt. zool. Mus. Berlin, 18 (1932), 334)

♀ Holotypus, China, Szetschwan, Tjiji, 4. IX. 1930, leg. FRIEDRICH, im DEI.

**timbata** GIGLIO-TOS, 1915 (*Sibylla*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 92)

Syntypen: 1 ♀, Dibongo, im DEI; 1 ♂, Bibianaha an der Costa d’Oro, im Museum London. DEI: Dibongo auf Sanag, Sd. Kann.

**madecassa** BEIER, 1935 (*Palaeophotina*)

(Arb. morph. taxon. Ent. Berlin, 2, 50–51)

♂ Holotypus, Madagaskar, Forêt Analamazotra-Perinet, XII. 1930, leg. OLSUFIEW, im DEI.

*punctata* GIGLIO-TOS, 1915 (*Hyalomantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 45)

Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Madagaskar.

DEI: 1 Ex. SC. Madagaskar, leg. HILDEBRANDT (schlecht erhalten).

*rotunda* GIGLIO-TOS, 1917 (*Hierodula*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 65–66)

Syntypen: 1 ♂, 2 ♀♀, Kinabalu, Borneo, im Museum Sarawak; 1 ♂, Borneo, im DEI.

*similis* GIGLIO-TOS, 1917 (*Uromantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 57)

Syntypen: 2 ♂♂, San Mateo, 400 m, Costa Rica, leg. HEYNE, im DEI.

*thoracoides* GIGLIO-TOS, 1915 (*Coptopteryx*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 67)

Syntypen: 1 ♀, Asuncion, Paraguay, im Museum Torino; 1 ♂, Montevideo, im Museum Berlin [Dahlem].

DEI: 1 ♂, Montevideo.

*tritobus* GIGLIO-TOS, 1917 (*Galepsus*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 102)

Syntypen: 2 ♂♂, Ruaha, Museum London; 1 ♂, Lindi, im DEI.

DEI: 1 ♂, Lindi, D. Ostafrika.

*vitalisi* WERNER, 1927 (*Amantis*)

(Ent. Mittl. 16, 183)

♀ Holotypus, Indochina, leg. VITALIS DE SALVAZA, im DEI.

*vitripennis* BEIER, 1933 (*Creobroter*)

(Mitt. zool. Mus. Berlin, 18, 335)

♀ Holotypus, China, Szetschwan, Bébé, Bez. Chungking, 7. VIII. 1930, leg. FRIEDRICH, im DEI.

*wernerii* KARNY, 1915 (*Phyllothelys*)

(Suppl. Ent., 4, 106–107)

Syntypen: 1 ♂, Kosempo, V. 1912; 1 ♀, Banshoryo-Distr., Sokutsu, VI. 1912.

DEI: 1 ♂, Kosempo, Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

## BLATTARIAE

*arawaka* HEBARD, 1929 (*Lophoblatta*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 55, 350–353, Taf. XIII, Fig. 6, 7)

♂ Holotypus, Caparo, Trinidad, 10. 1913, leg. KLAGES, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 1144.

Paratypen, 1 ♂, 1 ♀, River Estate, Diego Martin, Trinidad, leg. WOOD; 1 ♀, Port of Spain, Trinidad, leg. CARACCIOLA; 2 ♀♀, St. Augustin, Trinidad, 25. III. 1916, leg. WOOD; 27 ♂♂, 15 ♀♀, Caparo, Trinidad, VI.–VIII. 1913, leg. KLAGES; 1 ♂, 4 ♀♀, Trinidad, leg. CHIPMAN; 1 ♂, 1 ♀, Cariacuitta, Venezuela, 1. 1911, leg. STEWARDSON BROWN; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Kartabo, British Guiana, X. 1922, leg. HAVILAND; 1 ♀, Ongelyk, Para River, Surinam, 2. V. 1927, leg. BRADLEY.

DEI: 3 Paratypen, Caparo, Trinidad, VIII. 1913, leg. KLAGES.

*argentina* HEBARD, 1922 (*Ischnoptera*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 73 (1921), 270–272, Taf. XI, Fig. 4–6)

♂ Holotypus, San Nicolas, Buenos Aires, Argentina, 5. XI. 1897, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 671;

Paratypen, 3 ♂♂, 1 ♀, mit den gleichen Angaben; 1 ♂, 2 ♀♀, Carcaraña, Santa Fé, Argentina; 1 ♀, Teáño, Santiago del Estero; 1 ♂, Cordoba, Argentina, leg. SCHULZ; 1 ♂, Colonia, Florencia, Rio Japenaga, Chaco, Argentina; 1 ♂, Paraguay.

DEI: 1 Paratypus, San Nicolas, Buenos Aires, Argentina.

***atra*** SHELFORD, 1906 (*Paranauphoeta*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1906, 275)

Eine große Serie, Kuching.

DEI: 1 Syntypus, N.W. Borneo, Kuching, Capt. 13. XI. 1899, leg. SHELFORD.

***bicolor*** SHELFORD, 1908 (*Liosilpha*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 120, Taf. II, Fig. 5)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

***bicolor*** SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 125–126)

Syntypen: Kamerun, leg. CONRADT, 1 ♂, im DEI; 1 ♀, in Sammlung BOLIVAR.

***bicolor*** SHELFORD, 1908 (*Periplaneta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 122–123)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

***cahita*** HEBARD, 1922 (*Panchlora*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 48, 174–175, Taf. VII, Fig. 1)

♂ Holotypus, Venvidio, Sinaloa, Mexico, 18. VIII. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 761.

47 ♀♀, Paratypen vom gleichen Fundort, 28. VII.–2. IX. 1918.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung, 12. VIII. und 18. VIII. 1918.

***chopardi*** HEBARD, 1922 (*Euphyllodromia*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 73 (1921), 202–204, Taf. XV, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, Bartica, British Guiana, leg. PARISH, 19. XII. 1912, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5369.

Paratypen: 11 ♂♂, 4 ♀♀, vom gleichen Fundort, 10. XII.–12. VI. 1912 und 1913; 4 ♀♀, Demerara, British Guiana, 1901, leg. CREW; 1 ♂, Gourdonville, French Guiana, Oktober; 1 ♂, Charvein, French Guiana, November.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Bartica, British Guiana, 12. VI. 1912, leg. PARISH.

***cinnamomea*** HEBARD, 1927 (*Epilampra*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 78 (1926), 202–204, Taf. XVI, Fig. 4)

♂ Holotypus, St. Jean du Maroni, French Guiana, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1021; Paratypen 25 ♂♂, 22 ♀♀, mit den gleichen Angaben; 2 ♀♀, Nouveau, Chantier, French Guiana, 2. und 12.; 1 ♀, St. Laurent du Maroni, French Guiana, Dezember.

DEI: 1 Paratypus, Francse Guyana, St. Jean du Maroni, leg. LEMOULT.

***conradti*** SHELFORD, 1908 (*Anaplecta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 115, Taf. II, Fig. 1)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

***conradti*** SHELFORD, 1908 (*Paraplecta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 129, Taf. II, Fig. 10)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI (schlecht erhalten).

***conradti*** SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 117–118, Taf. II, Fig. 4)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

***cruralis*** SHELFORD, 1908 (*Homalosilpha*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 121, Taf. II, Fig. 8c)

♀ Holotypus, British Uganda, leg. GRAUER, im DEI.

***dahomensis*** SHELFORD, 1906 (*Anaplecta*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1906, 244, Taf. XVI Fig. 2)

Syntypen, eine große Serie, Athiémé, Dahomey, im Hope Museum Oxford.  
DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

***elegans*** SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 124)

♂ Holotypus Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

***epilamproides*** SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 123–124, Taf. II, Fig. 7)

Syntypen, 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT, im Museum Oxford; 1 ♀, im DEI.

***erythronotata*** SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 119)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

***formosana*** KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 102)

♀ Holotypus, Taihanroku, Formosa, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

***formosana*** KARNY, 1915 (*Periplaneta*)

(Suppl. Ent., 4, 96–97)

Syntypen: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Fuhosho; 3 ♂♂, Taihorin, 1911; 2 ♂♂, Taihorinsho, VIII. 1909, leg. SAUTER.

DEI: ♀ Lectotypus, von PRINCIS 1961 festgelegt, Fuhosho, Formosa, VII. 1909, leg. SAUTER; ♂ Paralectotypus, Taihorin, Formosa, 7. V. 1911, leg. SAUTER; 3 weitere Typen, von PRINCIS nicht gesehen: 1 Ex. Fuhosho, Formosa, leg. SAUTER; 1 Ex. Taihorinsho, Formosa, VIII. 1909, leg. SAUTER; 1 Ex. Taihorin, Formosa, 7. V. 1911, leg. SAUTER.

***formosana*** KARNY, 1915 (*Theganopteryx*)

(Suppl. Ent., 4, 103–104)

Syntypen: 4 ♂♂, 8 ♀♀, Taihanroku; 1 ♂, 5 ♀♀, Hoozan; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Taihorin, 1911, leg. SAUTER.

DEI: 5 Ex. Taihanroku, Formosa, 7. IX. und 7. XI., leg. SAUTER; 1 ♂, 1 ♀, Hoozan, Formosa, 7. X. und 7. XI., leg. SAUTER; 2 Ex. Taihorin, Formosa, 7. XII., leg. SAUTER.

***fossicauda*** HEBARD, 1916 (*Cariblatta*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 42, 177–179, Taf. XI, Fig. 13–17; Taf. XII, Fig. 17, 18)

♂ Holotypus, Caparo, Trinidad, leg. KLAGES, 8. 1913, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 415; Paratypen, 24 ♂♂, 17 ♀♀, vom gleichen Fundort, VI./VIII. 1913.  
DEI: 1 Paratypus, Caparo, Trinidad, VIII. 1913, leg. KLAGES.

***funebris*** SHELFORD, 1908 (*Periplaneta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 122)

Syntypen: Kamerun, leg. CONRADT, 1 ♂, im DEI; 1 ♀, im Museum Oxford.

*frieseanus* PRINCIS, 1963 (*Ectobius*)

(Beitr. Ent., 18, 68–70, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, Albanien, Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit *Olea* und *Ficus*, 50 bis 150 m, 14.–27. V. 1961; Paratypen: 4 ♂♂, mit den gleichen Angaben (3 Ex. im DEI, 1 Ex. in Sammlung PRINCIS); 3 ♀♀, Albanien, Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 1961, (2 Ex. im DEI, 1 Ex. in Sammlung PRINCIS); 1 ♀, Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Wiese, 1200 m, 3.–8. VII. 1961, im DEI.

*gaudens* SHELFORD, 1910 (*Homalosilpha*)

(Gen. Ins., Fasc. 109, 19)

♂ Holotypus, Bac-quang, Tonking.

Entgegen der Originalbeschreibung „Type im Oxford Museum“, befindet sich der Holotypus im DEI.

*hemisectia* HEBARD, 1920 (*Anaplecta*)

(Mem. Amer. Ent. Soc., 4, (1919), 20–23, Taf. II, Fig. 8)

♂ Holotypus, Corozal, Canal Zone, Panama, 17. XI. 1913, leg. HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 430; Paratypen: 1 ♀, Gold Hill, Canal Zone, Panama, 14. XI. 1913; 1 ♀, Porto Bello, Panama, 17. IV. 1912, leg. BUSCK; 1 ♂, Taboga Island, Panama, 11. VI. 1911, leg. BUSCK; 19 ♂♂, 13 ♀♀, Tabernilla, Canal Zone, Panama, 1. VI. bis 31. VII. 1907 und 1911, leg. BUSCK; 1 ♀, Empire, Canal Zone, Panama, 14. XI. 1913, leg. HEBARD; 1 ♂, Canal Zone, 5 Meilen westlich von Empire, Panama, 14. XI. 1913, leg. HEBARD; 1 ♂, 2 ♀♀, Paraíso, Canal Zone, Panama, 24. IV. bis 10. V. 1911, leg. SCHWARZ, BUSCK; 2 ♀♀, Cabima, Panama, 20./22. V. 1911, leg. BUSCK; Corozal, Canal Zone, 2 ♀♀, 14. XI. 1913, leg. HEBARD, 1 ♂, 6. IV. 1911 leg. BUSCK; 3 ♂♂, Chorrera, Panama, 10.–17. V. 1912, leg. BUSCK.

DEI: 5 Paratypen: 2 Ex. Paraíso, Canal Zone, Panama, 5./10. V. 1911, leg. SCHWARZ; 1 Ex. Cabima, Panama, 22. V. 1911, leg. BUSCK; 1 Ex. La Chorrera, Panama, 17. V. 1912, leg. BUSCK; 1 Ex. Tabernilla, Canal Zone, Panama, 16. V. 1907, leg. BUSCK.

*landalei* REHN & HEBARD, 1927 (*Cariblatta*)

(Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 54, Article I, 45–47, Taf. II, Fig. 10–14)

♂ Holotypus, Pleasant Hill, Blue Mountains, Jamaica, 3700–3800 Fuß, 28. VII. 1923, leg. REHN, in Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5404; Paratypen vom gleichen Fundort, 1 ♀, 24. VII. 1924; 2 ♂♂, 1 ♀, 21. VII.; 2 ♂♂, 3 ♀♀, 24. VII.; 1 ♂, 1 ♀, 25. VII.; 4 ♂♂, 2 ♀♀, 28. VII.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung, 28. VII. 1923.

*metae* HEBARD, 1921 (*Hyporhynchoda*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 47, 138–139, Taf. X, Fig. 29, 30)

♀ Holotypus, Villavicencio, Intendencia del Meta, Colombia, Elevation, 1400 Fuß, XII. 1912, leg. MARÍA, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 667; 14 ♀♀, Paratypen, vom gleichen Fundort, 5. 1917–8. 1919.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

*minuta* SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 124–125)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

*mirabilis* SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 116–117, Taf. II, Fig. 3)

Syntypen: 5 ♂♂, 1 ♀, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 4 ♂♂, 1 ♀, Kamerun, leg. CONRADT.

*modestiformis* KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 101)

Syntypen: 2 ♀♀, Taihanroku; 1 ♂, Taihorin, Formosa, 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♀ Taihanroku, Formosa, 7. IX., leg. SAUTER; 1 ♂, Tainan, Formosa, 7. V. 1912, leg. SAUTER. Taihorin in der Originalbeschreibung wohl irrtümlich statt Tainan gesetzt.

*natalensis* REHN, 1922 (*Chorisoblatta*)

(Ann. Transv. Mus., 9, 11–13, Taf. 1, Fig. 3, 5)

♂ Holotypus, Pinetown, Natal, leg. LEIGH, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5368; Paratypen: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Pinetown, Natal., 16. II.–1. III. 1909, leg. LEIGH; Durban, Natal., leg. LEIGH, 3 ♂♂, 25. III., 5./6. VIII. 1909; 5 ♂♂, 6 ♀♀, 4. VII., IX., X. und XI. 1907, 24. XI. 1908.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Durban Natal, 25. III. 1909, leg. LEIGH.

*neutra* SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 118, Taf. II, Fig. 6)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

*nigra* SHELFORD, 1909 (*Pronauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, 621)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

*pallida* SHELFORD, 1908 (*Chorisoneura*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 130, Taf. II, Fig. 9)

♂, ♀, Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT.

*paradoxa* KARNY, 1914 (*Ipolatta*)

(Ent. Mittl., 3, 250)

Holotypus, Khasia Hills, Assam, im DEI.

*perspicillaris* KARNY, 1915 (*Theganopteryx*)

(Suppl. Ent., 4, 103)

Syntypen: 4 ♂♂, 2 ♀♀, Hoozan, 1910, leg. SAUTER.

DEI: 4 Ex. Hoozan, Formosa 7. I. und 7. VII., leg. SAUTER.

*perspicua* SHELFORD, 1908 (*Oxyhaloa*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 128)

Syntypen: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI (schlecht erhalten); 1 ♀, Kamerun, in Sammlung BOLIVAR.

*platystylata* HEBARD, 1922 (*Neoblattella*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 73 (1921), 229–232, Taf. IX, Fig. 21–23, Taf. X, Fig. 1)

♂ Holotypus, Tgarapé-Assú, Pará, Brazil, leg. PARISH, 17. I.–6. XI. 1912; in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5376; Paratypen: 10 ♂♂, 13 ♀♀, mit den gleichen Angaben; 5 ♂♂, 3 ♀♀, Bartica, British Guiana, 19. XII. 1912 bis 15. III. 1913, leg. PARISH; 2 ♂♂, 1 ♀, 1 juv., St. Jean du Maroni, French Guiana, IV./V.; 1 ♀, Charvein, French Guiana. DEI: 1 Paratypus, Tgarapé-Assú, Sta. of Para, Brazil, 6. II. 1912, leg. PARISH.

*pygmaeus* KARNY, 1915 (*Perispherus*)

(Suppl. Ent., 4, 92)

Syntypen: 1 ♂, Suisharyo, 1911; 1 ♀, Kosempo, VII. 1909.

DEI: 1 ♀, Kosempo, Formosa, VII. 1909, leg. SAUTER.

*ruficollis* KARNY, 1915 (*Theganopteryx*)

(Suppl. Ent., 4, 104)

♀ Holotypus, Fuhosho, VII. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

*sauteri* KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 102)

Syntypen: 1 ♀, Anping, VII. 1912; 1 ♂ [recte ♀], Kankau (Koshun), IV. 1912; 1 ♀, Taihorin, 1911.

DEI: 1 ♀, Kankau (Koshun), Formosa, IV. 1912, leg. SAUTER.

*schenklingi* KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 101–102)

Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Taihorin; 1 ♀, Taihanroku; 1 ♀, Kankau (Koshun), VII. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Taihorin, Formosa, 7. VII. 1911, leg. SAUTER; 1 ♀, Kankau (Koshun), Formosa, VII. 1912, leg. SAUTER; 1 ♀, Taihonroku, Formosa, 7. VIII., leg. SAUTER.

*shelfordi* KARNY, 1915 (*Paranauphoeta*)

(Suppl. Ent., 4, 94–95)

136 Syntypen, Hoozan; Polisha 1908; Teraso 1909; Fuhosho, 1909; Chip-Chip, 1909; Kosempo, 1908–1911.

DEI: 1 Ex. Polisha, Formosa, XI. 1908, leg. SAUTER; 4 Ex. Chip-Chip, Formosa, I./II. 1909; 13 Ex. Kosempo, Formosa, XI. 1908; 22. VI. 1910, 7. IX. 1911, 7. XI. 1911, leg. SAUTER; 16 Ex. Fuhosho, Formosa, II./VI./VII. 1909.

*sumatrana* SHELFORD, 1909 (*Areolaria*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, 621)

♀ Holotypus, Sumatra, im DEI (schlecht erhalten).

*testacea* SHELFORD, 1911 (*Hemithyrsocera*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8, 1–2)

Mehrere Exemplare: Erythraea, Ghinda, Cheren; Typus im Oxford University Museum.

DEI: 2 Paratypen, Cheren, Erythraea (etikettiert als *Theganopteryx testacea* sp.n.).

*translucida* SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr. 1908, 119)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

## ISOPTERA

*albipes* HOLMGREN, 1915 (*Calotermes*)

(Nowa Caledonia, A: Zool., 2, 89–90)

♂♀, Syntypen, Loyalty Inseln, Maré, 17. XI. 1911, im Basler Naturhistorischen Museum.  
DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

*allocerus* SILVESTRI, 1908 (*Psammotermes*)

(Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena, 13, 73–75, Taf. VIII, Fig. 1–17)

Eine große Anzahl Soldaten, Namaland, Salsola-Dünen am Nordende der Lüderitzbucht, I. 1904, VII. 1903; 1 Soldat, Kamaggas, Klein-Namaland, VII. 1904; leg. SCHULTZE.

DEI: 9 Syntypen, Lüderitzbucht, S. W. Afrika, I. II. 1904, leg. SCHULTZE.

*angusticeps* EMERSON, 1925 (*Capritermes*)

(Zoologica, New York, 6, 447–449, Fig. 91)

Viele Soldaten und Imagines, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON; mehrere Soldaten von Dunoon, leg. GAIGE; Holotypus Soldat.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 21. IV. 1919, leg. EMERSON.

**bailyi** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 398–399, Fig. 64 e–h)

Viele geflügelte Imagines, 1 König, 1 Königin und viele Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 30. VIII. 1920, leg. EMERSON.

**beebei** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 415–416, Fig. 73)

1 geflügelte Imago, mehrere große und viele kleine Soldaten, Holotypus großer Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 23. VII. 1919, leg. EMERSON.

**biformis** WASMANN, 1902 (*Buteremes*)

(Zool. Jahrb. Syst. 17, 133–135, Taf. 4, Fig. 10, 10a)

Syntypen: große und kleine Soldaten, Arbeiter und Nymphen, Bandarawella, Ceylon, leg. HORN; Soldaten, Arbeiter, Larven, junge Imagines, Khandala, bei Bombay, leg. ASSMUTH.

DEI: Syntypen in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

**brevipitus** EMERSON, 1925 (*Anoplotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 424–425, Fig. 78)

Viele geflügelte Imagines, Könige und Königinnen, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 21.VII. 1919, leg. EMERSON.

**brevipilus** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 395–397, Fig. 63)

Viele geflügelte Imagines und Soldaten, Holotypus Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 1919, leg. EMERSON

**ceylonicus** WASMANN, 1902 (*Termes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 112–113)

Syntypen, eine größere Anzahl Soldaten und Arbeiter, Nalanda; Bentotta; Bandarawella; Ceylon 1899, leg. HORN.

DEI: 2 Syntypen in Alkohol, Nalanda, Ceylon, 1899, leg. HORN; zahlreiche Exemplare in Alkohol, Bentotta, Ceylon, 1899, leg. HORN.

**comstockae** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 390–391, Fig. 57 e, f)

Viele Soldaten, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 5 Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 11. VIII. 1920, leg. EMERSON.

**globicola** WASMANN, 1902 (*Microtermes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 116–117)

Syntypen, Soldaten, Arbeiter, Anurhadapura, Ceylon, 1899, leg. HORN.

DEI: Zahlreiche Exemplare in Alkohol Anurhadapura, Ceylon, 1899, leg. HORN.

**grandis** HOLMGREN, 1912 (*Porotermes*)

(Ent. Mitt., 1, 281)

2 Syntypen, Soldaten, Cape Otnay, Viktoria, leg. FOREST.  
DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

**horni** WASMANN, 1902 (*Termes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 111–112)

Syntypen, Soldaten und Arbeiter, Nalanda; Soldaten und Arbeiter, Pankulam; Soldaten und Arbeiter Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

DEI: 7 Ex. in Alkohol Bandarawella, Ceylon; 1 Ex. in Alkohol, Nalanda, Ceylon, 1899, leg. HORN.

**inanis horni** WASMANN, 1902 (*Eutermes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 137)

Syntypen in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, leg. HORN, im DEI.

**inquilinus** EMERSON, 1925 (*Mirotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 440–442, Fig. 87)

Zahlreiche geflügelte Imagines, Könige und Königinnen, viele Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 23. VIII. 1920, leg. EMERSON.

**longicornis** WASMANN, 1902 (*Capritermes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 126–128, Taf. 4, Fig. 7)

Syntypen, mehrere geflügelte Imagines, 1 Soldat, einige Arbeiter, Anuradhapura; Soldaten und Arbeiter, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

DEI: 12 Ex. in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

**manni** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 412–414, Fig. 72)

Viele Soldaten und geflügelte Imagines, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 24. VI. 1920, leg. EMERSON.

**mariannus** HOLMGREN, 1912 (*Calotermes*)

(Ent. Mitt., 1, 281–282)

Holotypus, Imago, Marianen, im DEI.

**mazaruniensis** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 411–412, Fig. 71)

Einige geflügelte Imagines, Soldaten, 1 König, 1 Königin, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 3. V. 1924, 20. VII. 1920, leg. EMERSON.

**minutus** EMERSON, 1925 (*Armitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 374–375, Fig. 53)

1 König und viele Soldaten, viele Königinnen der 2. Form und 1 König der 2. Form, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 23. VI. 1919, leg. EMERSON.

***nervosus*** HILL, 1927 (*Microcerotermes*)

(Mem. Nat. Mus. Melbourne, Nr. 7, 73–78, Taf. III, Fig. 77–81; Taf. VI, Fig. 188; Taf. IX, Fig. 189; Taf. VII, Fig. 218)

Australien, Northern Territory: Holotypus, Darwin; Stapleton; Broock's Creek; Melville Island; Daly River District; leg. HILL; Groote Eylandt; Maria Island?; Connexion Island?; leg. TINDALE; im National Museum Victoria.

DEI: 6 Paratypen, N. Territory, Daly River District, 12. X. 1914, leg. HILL.

***obscuriceps*** WASMANN, 1902 (*Termes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 113–115)

Syntypen, Trincomali, Ceylon, 1899, leg. HORN; Soldaten und Arbeiter, Bandarawella, 1899, leg. HORN.

DEI: Zahlreiche Exemplare in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

***palmquisti*** SJÖSTEDT, 1907 (*Termes*)

(Wiss. Ergeb. Schwed. Zool. Exp. Kilimandjaro Meru, Nr. 15, 16–18, Taf. 4, Fig. A)

Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, 35 geflügelte Imagines, 20. II. 1906, 130 geflügelte Imagines, 13. III. 1906; 8 geflügelte Imagines, 7. V. 1906, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, III, 1906.

***perparvus*** EMERSON, 1925 (*Kalotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 332–334, Fig. 32)

Viele Exemplare aller Kasten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie der Holotype, Kartabo, British Guiana, 27. VII. 1919, leg. EMERSON.

***planiceps*** EMERSON, 1925 (*Capritermes*)

(Zoologica, New York, 6, 449–450, Fig. 92)

Zahlreiche Soldaten, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 7 Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 27. VIII. 1920, leg. EMERSON.

***queenslandicus*** MJÖBERG, 1920 (*Stolotermes*)

(Arkiv. Zoologi, 12, Nr. 15, 6–9)

Syntypen, Cedar Creek, April; Malanda, Februar, Juni; Herberton, Januar.

DEI: 1 Syntypus in Alkohol, Cedar Creek. N. Queensland, IV. 1913, leg. MJÖBERG.

***samoanus*** HOLMGREN, 1912 (*Calotermes*)

(Ent. Mitt., 1, 282)

Syntypen, Imagines (flügellos), Apia Samoa, im DEI.

***silvestrii*** EMERSON, 1925 (*Anoplotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 421–423, Fig. 76)

Viele geflügelte Imagines, Könige und Königinnen, Holotypus, geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 25. VI. 1919, leg. EMERSON.

***snyderi*** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 405–407, Fig. 68)

Viele geflügelte Imagines und Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON; zahlreiche Soldaten, Trinidad, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 12. VIII. 1920, leg. EMERSON.

**snyderi** EMERSON, 1925 (*Syntermes*)  
 (Zoologica, New York, 358–359, Fig. 44)

2 geflügelte Imagines und viele Soldaten, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 2 Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 29. VII. 1920, leg. EMERSON.

**subfusciceps** EMERSON, 1925 (*Rhinoterme*)  
 (Zoologica, New York, 6, 356–357, Fig. 43)

Holotypus Königin, viele kleine Soldaten, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie der Holotype, Kartabo, British Guiana, 28. IX. 1920, leg. EMERSON.

**teevani** EMERSON, 1925 (*Armitermes*)  
 (Zoologica, New York, 6, 371–372, Fig. 51)

Mehrere geflügelte Imagines und Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, leg. TEE-VAN; viele Soldaten, Kartabo, leg. EMERSON; Soldaten bei Onderneeming, leg. BODKIN.

DEI: 3 Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 1919.

**tenebrosus** EMERSON, 1925 (*Rhinoterme*)  
 (Zoologica, New York, 6, 354–356, Fig. 42)

Viele Exemplare aller Kasten, Holotypus großer Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 2 Paratypen in Alkohol aus der Kolonie der Holotype, Kartabo, British Guiana, 16. VI. 1920, leg. EMERSON.

**territus** EMERSON, 1925 (*Syntermes*)  
 (Zoologica, New York, 6, 359–361, Fig. 45)

Zahlreiche Exemplare, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 1 Paratypus in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 1919, leg. EMERSON.

**tuberosus** EMERSON, 1925 (*Mirotermes*)  
 (Zoologica, New York, 6, 442–444, Fig. 88)

1 Königin, viele Soldaten, Holotypus Soldat, Barakara; 1 König, 1 Königin und zahlreiche Soldaten, Cow Island; 2 Soldaten Trinidad, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie des Holotypus, Barakara, British Guiana, 15. V. 1920, leg. EMERSON.

**verruculosus** EMERSON, 1925 (*Mirotermes*)  
 (Zoologica, New York, 6, 433–435, Fig. 84)

2 Königinnen, viele geflügelte Imagines, zahlreiche Soldaten, Holotypus Königin, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 7. VI. 1919, leg. EMERSON.

**wheeleri** EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)  
 (Zoologica, New York, 6, 391–392, Fig. 60)

Viele Soldaten und geflügelte Nymphen, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 7 Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie des Holotypus, Kartabo, British Guiana, 11. VIII. 1920, leg. EMERSON.

## PHASMIDA

*doederleini* GÜNTHER, 1929 (*Graeffea*)

(Mittl. Zool. Mus. Berlin, 14 (1928), 684–686, Taf. III, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, 67 ♂♂, 16 ♀♀, adult, Schraderberg, 2100 m, 22.–31. V. 1913, leg. BÜRGER, im Museum Berlin.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

*flavidum* HEBARD, 1933 (*Pseudophasma*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 59, 33–34, Taf. II, Fig. 9)

Guaicaramo, Intendencia del Meta, Columbien, leg. MARIA, 1 ♀ Holotypus, 1926, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 1218; 3 ♂♂, 1 ♀, VI. 1925 und 1930 vom gleichen Fundort; 1 ♂, Muzo, Boyaca, 1921, leg. MARIA; 6 ♂♂, Villavicencio, Intendencia del Meta, 1921, leg. MARIA, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Villavicencio, Meta, Colombia, 1921, leg. MARIA.

*injucundus* GÜNTHER, 1937 (*Neopromachus*)

(Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, 82, 93–94)

24 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen, Torricelli-Gebirge, 120–780 m.

DEI: 3 Exemplare, Kaiser Wilhelmsland, Torricelli-Gebirge, 1. 1910, leg. SCHLAGINHAUFEN.

## SALTATORIA

### Grylloidea

*affinis* REHN, 1914 (*Phaeophilacris*)

(Wiss. Ergebn. Zentr. Afr. Exp., 5, 1, 216–219)

♀ Holotypus, Bukoba, Westküste des Victoria-Nyanza, 13.–15. VI. 1907, im Museum Berlin; 5 ♂♂, 17 ♀♀, 5 Larven, Paratypen, mit den selben Angaben.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*angustifrons* CHOPARD, 1937 (*Gryllulus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 136–137)

♀ Holotypus, Ferghana, Skobelev, 8. V. 1910, leg. SHESTOPOEROV, im DEI.

*annulatum* HEBARD, 1928 (*Cycloptilum*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 54, 114–116, Taf. XVI, Fig. 5, 6)

♂ Holotypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 11. VIII. 1920, leg. HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1117; 5 ♂♂, 6 ♀♀, Paratypen vom selben Fundort, 4.–13. VIII. 1920; 1 ♀, Puerto Colombia, Atlantico, 12. VII. 1920, leg. HEBARD.

DEI: 1 Paratypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 4. VIII. 1920, leg. HEBARD.

*bicolor* CHOPARD, 1937 (*Larandeicus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 145–146, Fig. 6)

♂ Holotypus, N. Transvaal, Waterpoort, leg. LINGNAU, im DEI.

*bidens* HEBARD, 1931 (*Cycloptilum*)

(Trans. Amer. Soc., 57, 147–150, Taf. XXIII, Fig. 7–11)

♀ Holotypus, St. Simon's Island, Georgia, 30. VIII. 1911, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1175; 52 ♂♂, 53 ♀♀, 16 Larven, Paratypen, aus verschiedenen Staaten der U.S.A., genaue Funddaten siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, St. Simon's Island, Glynn Co. Georgia, 30. VIII. 1911, leg. REHN & HEBARD.

*brevipes* CHOPARD, 1937 (*Duolandrevus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 138–139)

♂ Holotypus, Nord Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*castaneus* CHOPARD, 1937 (*Loxoblemmus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 137–138, Fig. 1)

♂ Holotypus, Nord Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*curtipennis* CHOPARD, 1937 (*Duolandrevus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 139–140)

♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Nord Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*duplicovenatus* CHOPARD, 1937 (*Aphonomorphus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 149)

♀ Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. HEYNE, im DEI.

*formosanus* KARNY, 1915 (*Pentacentrus*)

(Suppl. Ent., 4, 70)

♂ Holotypus, Suisharyo, Formosa, X. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

*fraterculus* CHOPARD, 1937 (*Heterotrypus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 148, Fig. 9)

♂ Holotypus, Nord Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*ingens* KARNY, 1915 (*Diestrammena*)

(Suppl. Ent., 4, 66–67)

♂ Holotypus, Taihorin, 7. VIII. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

*integer* ANDER, 1933 (*Cratomelus*)

(Ent. Tidskr., 54, 138–139, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Santiago, Chile, XII. 1925, leg. FAZ, im DEI.

*maculifrons* CHOPARD, 1937 (*Anaxipha*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 141–142, Fig. 4)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Costa-Rica, Turrialba, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

*majusculum* KARNY, 1915 (*Paratrigonidium*)

(Suppl. Ent., 4, 69)

♀ Holotypus, Akau, Formosa, XI. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

*multivenosa* CHOPARD, 1937 (*Aela*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 142–144, Fig. 5, 7)

♂ Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

*oya* TINDALE, 1928 (*Gryllotalpa*)

(Rec. S. Aust. Mus., 4, 7–9, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, viele Paratypen, South Australia, Glenelg, leg. EDQUIST & TINDALE; Henley Beach, leg. REID & TINDALE; Port Elliott, Kangaroo Island, leg. LEA; im South Australian Museum.

DEI: 1 Paratypus, S. Australien, Henley Beach, 4. 1926, leg. TINDALE.

*pulchella* HEBARD, 1928 (*Tairona*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 54, 27–29, Taf. IV, Fig. 3, 4; Taf. V, Fig. 4; Taf. VI, Fig. 3)

♂ Holotypus, Hacienda Cincinnati, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 5000 Fuß, 10. VII. 1913, leg. CARRIKER Jr., in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1089; 3 ♀♀, Paratypen,

vom selben Fundort; 3 ♂♂, 24 ♀♀, vom gleichen Fundort, 4000 Fuß, 16.—25. VII. 1920; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Minca, Magdalena, Colombia, 2500 Fuß, 24. VII. 1920, leg. REHN & HEBARD; 1 ♂, Hacienda Victoria, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 4100 Fuß, 31. VII. 1920, leg. HEBARD; 1 ♂, 1 ♀, Eisenbahmlinie zwischen Hacienda Cincinnati und Hacienda Vista Nieve, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 4500—4700 Fuß, 21. VII. 1920, leg. REHN. DEI: 1 Paratypus, Minca, Magdalena, Sierra San Lorenzo, Colombia, 2500 Fuß, 24. VII. 1920, leg. HEBARD; 1 Paratypus, Hacienda Cincinnati, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 4500 Fuß, 16.—25. VII. 1920, leg. REHN & HEBARD.

***unipartitus*** KARNY, 1915 (*Heterotrypus*)

(Suppl. Ent., 4, 67—68)

♀ Holotypus, Takao, Formosa, XI. 1907, leg. SAUTER, im DEI.

***varians*** HEBARD, 1932 (*Sympyloxyphus*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 58, 360—362, Taf. XX, Fig. 7, 8)

♂ Holotypus, Punta Gorda, British Honduras, II. 1931, leg. WHITE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1208; 17 ♂♂, 4 ♀♀, mit den selben Angaben; 3 ♂♂, 1 ♀, Lancetilla Atlantida, Honduras, 26. VIII. 1930, leg. REHN; 1 ♂, Valles, San Luis Potosi, Mexico, 26. I. 1906, leg. HEBARD; 4 ♂♂, 2 ♀♀, San Rafael, Vera Cruz, Mexico, leg. HEBARD; 2 ♂♂, 1 ♀, Medellin, Vera Cruz, Mexico, IX. 1895, leg. HEBARD; 1 ♀, Cordoba, Vera Cruz, Mexico, XI. 1887, leg. BRUNER; 1 juv. ♀, Vera Cruz, Mexico, 14. I. 1927, leg. HEBARD.

DEI: 1 Paratypus, Punta Gorda, British Honduras, III. 1931, leg. WHITE.

***vittatum*** CHOPARD, 1937 (*Acclodes*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 144—145)

♀ Holotypus, Costa Rica, Turrialba, 900 m, 23. XI. 1923, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

## Tettigonoidea

***abbreviata ebneri*** UVAROV, 1921 (*Gampsocleis*)

(Ent. Rec., 33, 150)

♀ Holotypus, 49 ♂♂, 63 ♀♀, Paratypen, Umgebung Saloniki.

DEI: 1 ♂, 3 ♀♀, Paratypen, V./VI. 1916, leg. BURR.

***confusus*** FINOT, 1897 (*Ephippiger*)

(Ann. Soc. Ent. France, 65, 542—543)

Mehrere ♂♂ und ♀♀, Syntypen, Algerien, Chabet-et-Ameur, 6.—9., leg. FINOT; Bordj-Ménaïel, 7.—8., 6. Larven, leg. FINOT; Tunesien, Tebaurouk, 8., leg. SICARD.  
DEI: 1 Syntypus, Chabet el Ameur.

***fureata sinaloa*** HEBARD, 1932 (*Scudderia*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 58, 306—307)

♂ Holotypus, Venividio, Sinaloa, Mexico, 18. VIII. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1201; 7 ♂♂, 9 ♀♀, 1 juv., vom selben Fundort, 11. VIII.—2. IX. 1918; 3 ♀♀, Los Mochis, Sinaloa, 2.—10. XII. 1917, leg. KUSCHE; 1 ♂, Villa Union, Sinaloa, 27. IX. 1918, leg. KUSCHE.

DEI: 1 Paratypus, Villa Union, Sinaloa, Mexico, 27. IX. 1918, leg. KUSCHE; 1 Paratypus, Venividio Sinaloa, Mexico, 15. VIII. 1918, leg. KUSCHE.

***hoozanensis*** KARNY, 1915 (*Elimaea*)

(Suppl. Ent., 4, 76)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Hoozan, Formosa, IX. 1910, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

***karnya*** WILLEMSSE, 1933 (*Tarphus*)

(Naturh. Maandbl., 22, 18)

♀ Holotypus, China, Kreis Nanchuan, Cinfu-Shan, 1929—31, leg. FRIEDRICH, im DEI.

***microprra*** HEBARD, 1926 (*Canlopsis*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 52, 333—335, Taf. XXI, Fig. 12)

♂ Holotypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 8. VIII. 1920, leg. HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1066; 10 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, mit den selben Angaben; 1 ♂, Cordoba, El Valle, Colombia, 23. V. 1918, leg. CARRIKER Jr.; 1 ♀, Medellin, Vera Cruz, Mexico, leg. HYDE; 1 ♂, 1 ♀, Eden, Nicaragua, 13. IV./4. VI. 1922, leg. HUBER, in der Sammlung A.N.S.P.; 1 ♂, San Ramon, Rio Wanks, Nicaragua, Cape Gracias, 375 Fuß, V./VI. 1905, leg. PALMER, in der Sammlung A.N.S.P.; 1 ♀, Gatun, Canal Zone, Panama, 22. VIII. 1916, leg. HARROWER; 1 ♂, Barro Colorado Island, Gatun Lake, Canal Zone, Panama, 19. VII. 1924, leg. BANKS, im Mus. Comp. Zool. 3 ♀♀, Limon Plantation, Rio Chagres, Panama, 14. VII. 1918, leg. DIETZ & ZETEK, im U.S.N.M.; 1 ♂ Pinogana, Darien, Panama, XII. 1915, leg. MUÑOZ; 1 ♂, Boca, Murindo, Intendencia del Choco, Colombia, 9. II. 1918, leg. CARRIKER Jr.

DEI: 1 Paratypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 8. VIII. 1920, leg. HEBARD.

***schenklingi*** KARNY, 1915 (*Elimaea*)

(Suppl. Ent., 4, 75—76)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kankau (Koshun), Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Kankau, Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

***simplex*** HEBARD, 1932 (*Microcentrum*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 58, 317—319, Taf. XX, Fig. 1; Taf. XXI, Fig. 9, 10)

♂ Holotypus, Morales, Izabal, Guatemala, VIII. 1929, leg. WHITE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1197; 15 ♂♂, 3 ♀♀, Paratypen vom selben Fundort, VII.—IX. 1929; 1 ♀, France, Field, Canal Zone, Panama, 7. VII. 1920, leg. HEBARD; 1 ♀, Red Tank, Canal Zone, Panama, 1. VII. 1924, leg. BANKS, im Mus. Comp. Zool.; 1 ♂, San Rafael, Vera Cruz, Mexico, leg. TOWNSEND; 1 ♂, Teocelo, Vera Cruz, Mexico, IX., leg. BARRETT, im A.N.S.P.; 1 ♀, Tehuacan, Puebla, Mexico, 1903, leg. DIGUET, in Sammlung HEBARD; 1 ♂, Patrerillos, Cortes, Honduras, 800 Fuß, 20. VIII. 1930, leg. REHN, im A.N.S.P.

DEI: 1 Paratypus, Morales, Guatemala, XI. 1929, leg. WHITE.

***sinaloae*** HEBARD, 1925 (*Insara*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 51, 293—295, Taf. VII, Fig. 8)

♂ Holotypus, Venvideo, Sinaloa, Mexico, 2. IX. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1038; 17 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, 8. VIII.—2. IX. 1918.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***sinaloae*** HEBARD, 1925 (*Montezumina*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 51, 297—299, Taf. VII, Fig. 10—12)

♂ Holotypus, Venvideo, Sinaloa, Mexico, 2. IX. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 984; 30 ♂♂, 7 ♀♀, 7 juv. Paratypen, vom selben Fundort, 8. VIII.—2. IX. 1918; 1 ♀, Villa Union Sinaloa, 27. IX. 1918.

DEI: 1 Paratypus, Venvideo, Sinaloa, Mexico, VIII. 1918, leg. KUSCHE.

***tridactyla*** REHN & HEBARD, 1914 (*Dichopetala*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 66, 149—155, Fig. 50, 51, 53, 55, 57, 59)

♂ Holotypus, Camacho, Zacatecas, Mexico, XI. 1887, leg. BRUNER, in Sammlung HEBARD; 4 ♂♂, 14 ♀♀, Paratypen, mit den selben Angaben; 2 ♀♀, Jimulco, Couhuila, Mexico, XI., leg. BRUNER, in Sammlung HEBARD.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Comancho, Mexico, XI. 1887.

*trigonia* RAGGE, 1957 (*Phaneroptera*)

(Proc. Ent. Soc. London, Ser. B, 26, 124–126, Fig. 1–4)

♂ Holotypus, Takao, Formosa, 11. VIII. 1907, leg. SAUTER, im Museum Wien; 8 ♀♀, mit den selben Angaben; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Kankau, Formosa, IV./V./VI. 1912, leg. SAUTER, im DEI. DEI: 3 Paratypen, Kankau (Koshun), Formosa, V./VII. 1912, leg. SAUTER.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

*similis* DOHRN (*Casigneta*)

1 Ex. Sumatra, Soekaranda, DOHRN, als Typus ausgezeichnet.

**Acriodoidea***aberrans* WILLEMS, 1932 (*Oedipodacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 289, Taf. XI, Fig. 3, 4)

♀ Holotypus, Khasia Hills, Assam, im DEI.

*aberrans* WILLEMS, 1937 (*Phlaeoba*)

(Natuurh. Maandbl., 26, 48, Fig. 1)

♀ Holotypus, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*adelogyrus* HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 23, 36–41, Taf. III, Fig. 31)

♂ Holotypus, Florida, De Leon Springs, 8.–9. IX. 1917, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD; 84 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung. DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben des Holotypus.

*africana chinensis* WILLEMS, 1933 (*Gastrimargus*)

(Natuurh. Maandbl., 22, 15–16, Fig. 1)

31 ♂♂, 55 ♀♀, Syntypen, China, Dsachi Bezirk, Tatsienlu, VIII.–IX. 1930, im DEI. DEI: 1 ♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

*amphinoctoides* GÜNTHER, 1939 (*Bolivarilettix*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier.- u. Völkerk. Dresden, 20, Reihe A, 80–81, Fig. 46, 47)

♀ Holotypus, Philippinen, Isla de Siargao, leg. BOETTCHER, im DEI.

*apalachicolae* HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 23, 41–46, Taf. I, Fig. 1, 3.; Taf. II Fig. 20)

♂ Holotypus, Camp. Torreya, Liberty County, Florida, 29. VII. 1925, leg. HUBBELL, im Museum of Zoology, University of Michigan; 41 ♂♂, 30 ♀♀, Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Liberty Co., Florida, Camp Torreya, 30. VIII. 1925, leg. HUBBELL.

*arabicus* UVAROV, 1936 (*Stenohippus*)

(Journ. Linn. Soc. Zool., 39, 540–541)

♂ Holotypus, Hedjaz, Mecca, 20. X. 1931; 6 ♂♂, 9 ♀♀, vom selben Fundort, 8. III.–9. X.; 1 ♀, Jidda, 28. III. 1930; 1 ♂, 1 ♀, Medina, 17. VI. 1931; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Hafair, 10. VIII. 1934; leg. PHILBY.

DEI: 1 Paratypus, Hedjaz, Mecca, 6. X. 1931; 1 Paratypus, Medina, 17. VI. 1931; leg. PHILBY.

*armillatus* KARNY, 1915 (*Parapleurus*)

(Suppl. Ent., 4, 83–84)

Syntypen, 1 ♂, Taihorinsho; 1 ♀, Hoozan.

DEI: 1 ♀, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

***boettcheri*** GÜNTHER, 1938 (*Scelimena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 23, 389–391)

11♂♂, 7♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

DEI: 12 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

***boettcheri*** GÜNTHER, 1938 (*Syzygotettix*)

(Stett. Ent. Ztg., 99, 198–199, Fig. 90–92)

7♂♂, 6♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 9 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

***bürgersi*** RAMME, 1941 (*Desmopterella*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 25, 64–65, Taf. IX, Fig. 4, Textfig. 30)

♂ Holotypus, 3♀♀, Paratypen, Regenberg, 550 m, 8.–15. V.; weitere Paratypen, 13♂♂, 2♀♀, Lager am Töpferfluß, 4. u. 5.; 5♂♂, 14♀♀, Hauptlager bei Malu, 1. u. 2.; 7♂♂, 4♀♀, Lager am Lehmfluß, 4. u. 5.; 3♂♂, 7♀♀, Lager am Rosensee, 2.; 2♂♂, Hundsteinspitz, 3.; 3♀♀, Schraderberg, 5.; sämtlich von der Deutschen Kaiserin Augusta Fluß-Expedition, 1912–13, leg. BÜRGERS; 2♂♂, 3♀♀, Neu Guinea, 7. 1896; 2♀♀, Oertzengebirge, 5. 1898, leg. LAUTERBACH; 5♀♀, Simpsonhafen, 5. 1909; 2♀♀, Berlinhafen, leg. SCHOEDE; 1♀, Satelberg, leg. NEUHAUSS; 1♀, Wasior, Wandammen, 7. 1928, leg. MAYER; 3♀♀, Neupommern, Karlei, Weite Bucht, 1929, leg. SCHNEIDER; im Museum Berlin.

DEI: 2 Paratypen, D. N. Guinea, Lager am Töpferfluss, 16./19. IV. 1913, leg. BÜRGERS.

***bugoienensis*** REHN, 1914 (*Paralobopoma*)

(Wiss. Ergeb. Dtsch. Zentr. Afr. Exped., 5, III, 73–75)

♀ Holotypus, 2♀♀, Paratypen, Bugoie-Wald, nordwestlich Ruanda, 2500 m, im Museum Berlin; 21♂♂, 76♀♀, 4 Larven in Alkohol, vom gleichen Fundort, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN; 1♂, Rugege-Wald, südwestlich Ruanda, 1800 m, 20. VIII. 1907, leg. SCHUBOTZ.

DEI: 1 Paratypus, Bugoie Porest. Ruanda, C. Afrika, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN.

***burri*** UVAROV, 1953 (*Cophohippus*)

(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, 21, 180–181, Fig. 239–241)

Angola, Moxico district, ♂ Holotypus, 1♂, 1♀, Upper Mu-Simoj river, 27. IX. 1927; 1♀, Upper Luena river, 26.–28. V. 1927; 4♂♂, 9♀♀, Villa Luso, 1.–9. VI. 1927; 2♂♂, Busaco, 23. VI. 1927; 6♀♀, r. Chimbumba, tributary of r. Lumeji, 6. VII. 1927; 1♂ Munhangio, Lungue Bungu road, 24. X. 1927; 1♂, 5♀♀, valley of r. Mu-Simoj, 25. X. 1927; Bihé district, 1♀, r. Cohemba, 29.–31. VIII. 1927; 1♂, 2♀♀, 1.–4. IX. 1927; Luchase district, 1♀, r. Makontole, 11. X. 1927; 3♂♂, 1♀, r. Quangu, 15. X. 1927; Belgian Congo, Katanga province, 1♀, r. Lubudi, 12. XI. 1927; alle leg. BURR; Northern Rhodesia, 1♀, Abercorn, 25. VIII. 1950, leg. BREDO.

DEI: 2 Paratypen, Angola, Moxico Distr., Villa Luso, 1.–9. VI. 1927, leg. BURR.

***ceraseus*** UVAROV, 1922 (*Rhachitopis*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1922, 145–146, Taf. I, Fig. 4)

♂ Holotypus, Herbert, Cape Province, 15. V. 1917, leg. LOUNSBURY; 1♀, Stydenburg, Cape Province, 26. II. 1917, leg. LOUNSBURY; 4♂♂, 1♀, Orange Free State, Bloemfontein distr., Bethulie, Dealesville to Bloemfontein, Petrusburg, leg. LOUNSBURY; 8♂♂, 23♀♀, Orange River Colony, leg. HAMILTON, alle im British Museum.

DEI: 2 Paratypen, Orange R. Colony, 1903–19, leg. HAMILTON.

***ceratiola*** HUBBELL & WALKER, 1928 (*Schistocerca*)

(Occ. Pap. Mus. zool. Univ. Mich., Nr. 197, 2–10)

♂ Holotypus, Orlando, Orange County, Florida, 28. VIII. 1924, leg. WALKER; 371♂♂, 603♀♀, vom selben Fundort, 28. VIII.–20. IX. 1924, leg. WALKER & HUBBELL; 2♂♂,

3 ♀♀, vom selben Fundort, 5. IX. 1925, leg. HUBBELL; 3 ♀♀, Apopka, Orange Co., Fla., 19.—21. IX. 1924, leg. WALKER & HUBBELL; 1 ♂, 4 ♀♀, Tavares, Lake Co., Fla., 19. IX. 1924, leg. WALKER & HUBBELL; 1 ♀, Altamonte Springs, Siminole Co., Fla., VIII. 1924, leg. WALKER, im Museum of Zoology, University of Michigan.  
DEI: 6 Paratypen, Orange Co., Fla., Orlando, 19. IX. 1924, leg. WALKER.

**chinensis** WILLEMSE, 1933 (*Conophymacris*)

(Natuurh. Maandbl., 22, 17, Fig. 2)

22 ♂♂, 36 ♀♀, China, Dsaschi Bezirk, Patsienlu, 7. VIII., Type im DEI.  
DEI: 1 ♂, Tjiji, 6. IX. 1830, hiermit als Lectotypus festgelegt; 9 ♂♂, 7 ♀♀, Kiulung; 1 ♂, 6 ♀♀, Dsaschi, leg. FRIEDRICH.

**chinensis** WILLEMSE, 1932 (*Gelastorrhinus*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 285—286, Taf. XI, Fig. 2)

♀ Holotypus, Hongkong, X. 1913, im DEI.

**conradti** GÜNTHER, 1939 (*Dinotettix*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, 20, Reihe A, 202—203, Fig. 136)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

**crassipes** HANCOCK, 1912 (*Euparatettix*)

(Mem. Dept. Agricult. Ind. Ent., 4, 153—154)

♂♂ ♀♀, Bihar, Pusa; Chapra; Pupri, Muzaffarpur; Bengal, Dacca, in Sammlung Pusa.  
DEI: 2 Paratypen, Pusa, Bengal, 28. IX. 1910.

**crassipes** KARNY, 1915 (*Hedotettix*)

(Suppl. Ent., 4, 80—81)

Syntypen, 1 ♂, Chikutoki; 1 ♂, Kosempo, V. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♂, Chikutoki, Formosa, leg. SAUTER.

**cristatus** KARNY, 1915 (*Hedotettix*)

(Suppl. Ent., 4, 81—82)

♂ Holotypus, Sokutsu, Formosa, 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**davisi** HEBARD, 1918 (*Eotettix*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 44, 153—156, Taf. VIII, Fig. 13)

♂ Holotypus, De Funiaq Springs, Walton County, Florida, 30. VIII. 1915, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 478; 89 ♂♂, 31 ♀♀, vom selben Fundort, 29./30. VIII. 1915, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

**digitifera** HEBARD, 1923 (*Chibacharis*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 49, 289—291, Taf. XVI, Fig. 5—7)

♂ Holotypus, La Pica, Santander, Colombia, 9000 Fuß, 10.—15. II. 1917, leg. CARRIKER Jr., in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 900; 17 ♂♂, 24 ♀♀, vom selben Fundort, Paratypen.  
DEI: 3 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

**dimorphipes** UVAROV, 1953 (*Orthochtha*)

(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, 21, 147—148, Fig. 180—183)

♂ Holotypus, 20 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, N. Rhodesien, Luano Valley, Chisowe, I.—IV. 1928, leg. BURR.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

*dohrni palawanica* GÜNTHER, 1939 (*Xistrella*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, 20, Reihe A, 150)

2 ♂♂, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913; 2 ♀♀, Nord-Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, N. Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913; 1 ♀, N. Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER.

*dubia* WILLEMS, 1932 (*Gelastorrhinus*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 286–287)

♂ Holotypus, Hongkong, X. 1913, im DEI.

*ebneri carpathica* ČEJCHAN, 1958 (*Miramella*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges., 48, 89–90, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, Ostslowakische Karpaten, Rabja Skala, 71. VIII. 1957, leg. MASNER; 60 ♂♂, 59 ♀♀, Rabja Skala, leg. MASNER; Nova Sedlica, VIII. 1957, leg. GAISLER &amp; ŠÍR; Polonia Balzatul und Hoverla, Ukrainische SSR.

DEI: 2 Paratypen, Slov. N. Sedlice env., 17. VIII. 1957, leg. MASNER.

*elegantula* WILLEMS, 1930 (*Paratraulia*)

(Tijdschr. voor Ent., 73, 190–191, Fig. 98)

Sumatra, Fort de Kock, 2 ♂♂, 2 ♀♀; Tandjunggadang, 3 ♂♂, 5 ♀♀; Gunung Linggalang, 1 ♂, 1 ♀; leg. JACOBSON. Der ♀ Holotypus befindet sich im Museum Leiden. Aus der Originalbeschreibung geht nicht hervor, von welchem Fundort der Holotypus ist.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Gunung, Singgalang, Westküste Sumatra, 1000 m, VII. 1925, leg. JACOBSEN.

*excentrica* WILLEMS, 1932 (*Boettcheria*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 147–148)

♀ Holotypus, N. Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*exiguus* GÜNTHER, 1935 (*Bolotettix*)

(Arb. morph. tax. Ent. Berlin, 2, 259–260, Fig. 4)

2 ♂♂, 3 ♀♀, Long Petak, 450 m, VIII./X./XI., im Mus. Buitenzorg, Dresden und im DEI.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Midden, O. Borneo, 27. XI. 1925.

*extenuatus* HANCOCK, 1906 (*Stenodorsus*)

(Ent. News. Philadelphia, 17, 91)

Zahlreiche Exemplare, Marcapata, Peru, in der Sammlung HANCOCK.

DEI: 2 Paratypen, Marcapata, Peru.

*flavomaculata* WILLEMS, 1932 (*Maculacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 153–154)

Mindanao, Surigao, ♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, in Sammlung WILLEMS, 1 ♂, im DEI, 1 ♂ im Museum Stockholm, 1 ♂ Dinagat, Philippines, in Sammlung WILLEMS.

DEI: 1 Paratypus, Surigao Mindanao.

*forcipatus* HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 23, 51–56, Taf. I, Fig. 5, 6, Taf. II, Fig. 22, 23)

♂ Holotypus, 5,5 Meilen westlich von Orlando, Orange County, Florida, 6. IX. 1924, leg. WALKER; 97 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Orange Co., Florida, Orlando, VIII. 1924, leg. WALKER.

*fuscocincta portugalensis* RAMME, 1931 (*Oedipoda*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17, 193, Taf. I, Fig. 5)

Ca. 30 Paare aus Porto, Portugal, im Museum Berlin.  
DEI: 4 Paratypen, Porto, Portugal.

*gracilis* WILLEMSE, 1932 (*Meubelia*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 282)

Philippines, Bucas, 3 ♀♀, davon ♀ Holotypus, in Sammlung WILLEMSE; Philippines, Siargao; Philippines, Dinagat; Philippines, Cátbalogan, in Sammlung WILLEMSE; Philippines Panaon, Siargao, im DEI; Philippines Bucas 1 ♀; Mindanao, Surigao, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Ex. Siargao, Philippinen; 1 Ex. Panaon, Philippinen.

*gracilis* WILLEMSE, 1932 (*Philippinaeris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 284–285, Taf. XII, Fig. 7)

♂ Holotypus, Mindanao, Surigao; 5 ♂♂, Philippines, Siargao, 4 ♂♂, in Sammlung WILLEMSE, 1 ♂, im DEI; 2 ♂♂ Philippines, Bucas, 1 ♂, in Sammlung WILLEMSE, 1 ♂ im Museum Stockholm, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Siargao, Philippinen.

*heldreichi adaliae* UVAROV, 1928 (*Tmethis*)

(Ent. Mitt., 17, 176–177)

♂ Holotypus, Paratypen, 1 ♂, 3 ♀♀, Adalia, 15. VI. 1927; 1 ♀, Köppeshan, 3. VI. 1927, S. W. Anatolien. Holotypus, Paratypen, im DEI; 1 ♂, 2 ♀♀, Paratypen, im British Museum (N.H.)  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

*hesperus* MORSE, 1899 (*Paratettix*)

(Journ. N. York. Ent. Soc., 7, 198)

276 ♂♂, ♀♀, Syntypen, Glendale Or., 9. IX. 1897, leg. MORSE; 303 Adulte Ashland, Corvallis, Drain, Philomath, Or., 7.–15. IX.; Ahwanee, Calif., 15. VIII., leg. MORSE; Dallas, Or., Wickham (BRUNER), Sonoma, Marin Co., Calif., leg. OSTEN SACKEN. Santa Cruz, 3. VIII.; Palo Alto, 10./12. V./3. VIII.; Mt. Hamilton, 13.–24. V.  
DEI: 6 Syntypen, Glendale Or., 9. IX. 1897.

*insignis* HEBARD, 1923 (*Amblytropidia*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 49, 198–201, Taf. XI, Fig. 18, 19)

♂ Holotypus, Gatun, Canal Zone, Panama, 16.–22. VIII. 1916, leg. HARROWER, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 457; Paratypen, 39 ♂♂, 16 ♀♀, vom selben Fundort, 12. VII. bis 22. VIII. 1916, leg. HARROWER, in Sammlung HEBARD; 1 ♂, westlich von Empire, Canal Zone, Panama, 14. IX. 1913, leg. HEBARD; 1 ♂, Hacienda Cincinnati, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 10. VII. 1913, leg. CARRIKER JR., 1 ♀, Susumuco; Cundinamarca, Colombia, 10. X. 1917, leg. MARIA; 1 ♀, Villavicencio, Intendencia del Meta, Colombia, V. 1917, leg. MARIA.

DEI: 3 Paratypen, Gatun, Panama, 12.–22. VII. 1916, leg. HARROWER.

*javanicum* WILLEMSE, 1932 (*Anacridium*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 143)

♀ Holotypus, Java, Pradjekan, im DEI.

*kankauense* KARNY, 1915 (*Acrydium*)

(Suppl. Ent., 4, 79)

Syntypen, 9 ♂♂, 14 ♀♀, 1 ♀ Larve, Kankau (Koshun), Formosa, IV. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 10 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

*lithocletus* REHN & REHN, 1934 (*Gymnotettix*)

(Mem. Amer. Ent. Soc., 8, 14–21, Taf. 1, Fig. 1; Taf. III, Fig. 11–15)

♂ Holotypus, Cantarranas, Rio Choluteca, Department of Teguigalpa, Honduras, 2200 Fuß, 4. VIII. 1930, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5532; 55 ♂♂, 84 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, 19. VII.–9. VIII. 1930; 1 ♂, 1 ♀, Minas de Oro, Department of Comayagua, leg. EDWARDS, im Mus. Comp. Zool.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Cantarrana, Rio Choluteca, Honduras, 2200 Fuß, 4. VIII. 1930.

*magnifica* UVAROV, 1923 (*Staurocleis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist., (9) 11, 682–684)

♂ Holotypus, Entebbe Uganda, 5. III. 1913, leg. GOWDEY; 112 ♂♂ ♀♀, vom selben Fundort und von Chagwe, Mabina Forest, Mbale, Tero in Uganda.  
DEI: 1 Paratypus, Entebbe, 4. IX. 1912.

*marcapata* HANCOCK, 1906 (*Olumbo*)

(Gen. Ins., 48, 44)

Pachitea und Marcapata, Peru.

DEI: 1 Paratypus, Marcapata, Peru.

*millierei* FINOT, 1884 (*Dericorys*)

(Bull. Soc. Ent. France, 1884, 27)

Syntypen, Oran, Algerien.

DEI: 2 Syntypen, Oran, 13. IX. 1879.

*mindanaensis* GÜNTHER, 1938 (*Hirrius*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 23, 304)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Mindanao, Ganaao, leg. SCHULTZE.

DEI: 2 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

*minuta* UVAROV, 1953 (*Quangula*)

(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, 21, 197–198, Fig. 270–273)

Angola, Luchase district, ♂ Holotypus, 7 ♂♂, 8 ♀♀, Paratypen, r. Quangu, 13.–16. X. 1927; Moxico district, 3 ♂♂, 1 ♀, r. Munhangao, 10. VIII. 1927; 1 ♀, Busaco, 28. VI. 1927; 1 ♂, r. Subengile, 18. VIII. 1927; 5 ♂♂, 9 ♀♀, r. Lungue Bungu, 8. X. 1927; 1 ♂, r. Mu-Simoj, 25. X. 1927; Bihé district, 3 ♂♂, 6 ♀♀, Cohemba, 20.–26. VIII. 1927; alle leg. BURR.

DEI: 1 Ex. Angola, Distr. of Luchase, River Quangu, 18. X. 1927, leg. BURR; 1 Ex. Angola, Distr. of Moxico, Valley of River, Mu-Simoj, 25. X. 1927, leg. BURR.

*mirandus* REHN, 1929 (*Hylopedetes*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 55, 62–66, Taf. I, Fig. 6; Taf. II, Fig. 2; Taf. III, Fig. 4, 5; Taf. IV, Fig. 12, 14)

♂ Holotypus, La Emilia, near Guápiles, Costa Rica, 1000 Fuß, 15. VIII. 1923, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5467; Paratypen alle vom selben Fundort, 1 ♀, 22. VII. 1929; 2 ♂♂, 6 ♀♀, 15. VIII. 1923; 1 ♂, 6 ♀♀, 16. VII. 1923; 1 ♀, 18. VIII. 1923; 1 ♂, 20. VIII. 1923.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung, 5./6. VIII. 1923.

*modestus crypsidomus* HEBARD, 1922 (*Agroecotettix*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 48, 53–55, Taf. II, Fig. 4–6)

♂ Holotypus, Marathon, Brewster County, Texas, 3940–4160 Fuß, 12. IX. 1912, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 750; 87 ♂♂, 102 ♀♀, Paratypen aus Texan und Mexico, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Marathon, Brewster Co., Texas, 26.–27. VIII. 1912, leg. REHN & HEBARD.

*multicolora* WILLEMSE, 1932 (*Boacridium*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 155–156)

Holotypus, Paratypus, Mindanao, Surigao, Holotypus im Museum Stockholm.  
DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

*multicoloris* WILLEMSE, 1932 (*Conuacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 291)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, 1 ♂ durch Phenol entfärbt, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*nitidula* KARSCH, 1891 (*Segellia*)

(Berl. Ent. Zeitschr., 36, 185)

Syntypen, zahlreiche Exemplare beider Geschlechter von der Barombi-Station, Kamerun, leg. PREUSS, im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

*obtusoalatus* SJÖSTEDT, 1933 (*Coryphistes*)

(Ark. Zool., 25, B, Nr. 5, 1–2, Textfig. 1, 2)

2 ♀♀ Syntypen, N.S. Wales, leg. BOETTCHER, im DEI und Museum Stockholm.

*örtendahli* SJÖSTEDT, 1932 (*Karasicola*)

(Soc. Ent. France Livre Centenaire, 548–549, Taf. XXVII, Fig. 4, 4a, 4b, 5)

36 ♂♂, ♀♀, Syntypen, S. W. Afrika, Klein Karas, IV./V. 1931, leg. ÖRTENDAHL, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

*olsufieffi* GÜNTHER, 1939 (*Rhenitettix*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, 20, A, 93)

♀ Holotypus, Madagaskar, Forêt Analamazotra-Perinet, XII. 1930, leg. OLSUFIEW, im DEI.

*oresterus* REHN & REHN, 1934 (*Sethus*)

(Mem. Amer. Ent. Soc., 8, 49–54, Taf. II, Fig. 3; Taf. V, Fig. 42–49)

♂ Holotypus, Peña Blanca, above Rosario Mine, San Juancito Mountains, Honduras, 5900 Fuß, 22. VII. 1930, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5530; 18 ♂♂, 29 ♀♀ vom selben Fundort, 11.–26. VII., 14. VIII. 1930, leg. REHN.  
DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 26. VII. 1930.

*palaicana* WILLEMSE, 1935 (*Traulia*)

(Ent. Ber., 9, 139)

♀ Holotypus, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII., leg. BOETTCHER, im DEI nicht vorhanden, 1940 an RAMME ausgeliehen, nach dessen Tod in seinem Nachlaß nicht aufzufinden.

*palaicanica* GÜNTHER, 1938 (*Thoradonta*)

(Stett. Ent. Ztg., 99, 130–131, Fig. 13, 14)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI. XII. 1913, leg. BOETTCHER.  
DEI: 3 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

*palaicanicus* GÜNTHER, 1939 (*Bolivariettix*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, 20, A, 80)

8 ♂♂, 6 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

*palaeanicus* GÜNTHER, 1938 (*Falconius*)(Mitt. Zool. Mus. Berlin, **23**, 404–405)

1 ♂, 2 ♀♀, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1933, leg. BOETTCHER.

DEI: ♀ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*palaeanicus* GÜNTHER, 1939 (*Paraguclus*)(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, **20**, A, 39–40)

4 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 3 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

*paraguensis* GÜNTHER, 1939 (*Bolivaritettix*)(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, **20**, A, 82–83, Fig. 48, 49)

4 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, 11. XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 5 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

*pedestris* UVAROV, 1953 (*Pseudogomphothela*)(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, **21**, 187–188, Fig. 246)

♂ Holotypus, 13 ♂♂, 13 ♀♀, Paratypen, Northern Rhodesia, Luano Valley, Chisorwe, 30. I. bis 30. III. 1928, leg. BURR.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung, 3. II./8. III. 1928.

*plagiata* UVAROV, 1953 (*Dnopherula*)(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, **21**, 178–179, Fig. 237, 238)

Angola, Luchase district, ♂ Holotypus, river Quangu, 15. X. 1927; Moxico district, 1 ♀, r. Luena, village of Katula, 18. V. 1927; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Villa Luso, 1.–9. VI. 1927; 1 ♂, 1 ♀, circa mile 1475, 4.–10. VIII. 1927; 4 ♂♂ r. Lungue Bungu, 3. X. 1927; Bihé district, 1 ♂, 2 ♀♀, Cohemba, 21.–31. VIII. 1927; 1 ♂, 14.–15. IX. 1927; Belgian Congo, Katanga province, 1 ♂, 1 ♀, Nasantoye, r. Lubudi, 12. XI. 1927; alle leg. BURR.

DEI: 2 Paratypen, Angola, Distr. of Moxico, Villa Luso, 300 Fuß, 1.–9. VI. 1927, leg. BURR.

*platynota* KARNY, 1915 (*Potua*)(Suppl. Ent., **4**, 77–78)

Syntypen, 1 ♀, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 1912; 1 ♂, Kosempo, V. 1912.

DEI: ♀ Syntypus Sokutsu, Banshoryo-Distr., 22. VI. 1912, leg. SAUTER.

*podisma* KARNY, 1915 (*Oxya*)(Suppl. Ent., **4**, 86–87)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

*productus* SJÖSTEDT, 1935 (*Paratettix*)(Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., **15**, Nr. 2, 14)

♂ Holotypus, N. S. Wales, Sydney, leg. LÜDDEMANN, im DEI.

*prolongatus* HANCOCK, 1899 (*Allotettix*)(Ent. News. Philadelphia, **10**, 276–277)

Bolivien, in Sammlung HANCOCK.

DEI: 1 Paratypus, Bolivien.

*puer seminole* HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, **23**, 28–32, Taf. III, Fig. 27–29)

♂ Holotypus, Arcadia, De Soto Co., 27. VIII. 1923, leg. WALKER, in Sammlung HEBARD; 116 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Manatee Co., Florida, Manatee, 22. VIII. 1925, leg. HUBBELL.

*pulchella* HEBARD, 1925 (*Sinaloa*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 51, 288–289, Taf. VII, Fig. 6; Taf. VIII, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, Venvidio, Sinaloa, Mexico, 2. IX. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 982; 5 ♂♂, 8 ♀♀, Villa Union, Sinaloa, 21./27. IX. 1918; 22 ♂♂, 26 ♀♀, 6 juv. Venvidio, Sinaloa, 11. VIII.–2. IX. 1918.

DEI: 4 Paratypen, Venvidio, Sinaloa, Mexico, VIII. 1918, leg. KUSCHE.

*pulchra* SJÖSTEDT, 1920 (*Terpillaria*)

(Ark. Zool., 12, Nr. 20, 51–52)

4 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen, Nordwest-Australien, Kimberley-District, I.–III. 1910–13, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

*punctatus* UVAROV, 1926 (*Aulacothrus*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1925, 432–434, Taf. XLVII, Fig. 11, 12)

♂ Holotypus, 30 Paratypen beider Geschlechter, Kano Provinz, Azare Gebiet bei Sherifuri, Nord Nigeria, leg. LLOYD.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

*pyramidata* REHN, 1930 (*Andriana*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 81 (1929), 506–508, Taf. 20, Fig. 7, 8; Taf. 21, Fig. 1, 2)

♀ Holotypus, Madagascar Lamberton, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5476; 4 ♂♂, 13 ♀♀, vom selben Fundort; 1 ♂ Mahatzinjo, Madagascar, in Sammlung HEBARD.

DEI: 2 Paratypen, Madagascar, Lamberton.

*rubritarsi* WILLEMSE, 1932 (*Incolacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 151–152)

♀ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Philippinen, Siargao, in Sammlung WILLEMSE; 1 ♀ im DEI; 1 ♀ im Museum Stockholm.

*rugulosus* KARNY, 1915 (*Hedolettix*)

(Suppl. Ent., 4, 81)

♂ Holotypus, Suisharyo, Formosa, X. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

*saigonensis* GÜNTHER, 1938 (*Loxilobus*)

(Stett. Ztg., 99, 206, Fig. 107, 109)

2 ♀♀, Syntypen, Cochinchina, Saigon, XI. 1913, leg. HOFFMANN.

DEI: ♀ Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

*salutator* REHN, 1927 (*Zapata*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 53, 221–226, Taf. XXII, Fig. 6–9)

♂ Holotypus, Tumamoc Hill, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, 2400–3092 Fuß, 3./4. X. 1910, leg. HEBARD & REHN, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1110; 51 ♂♂, 55 ♀♀, Paratypen, Arizona, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Tumamoc Hill, Tucson Mts. Pima, Co. Ariz., 2400–3092 Fuß, 3. bis 4. X. 1910, leg. REHN & HEBARD; 1 Paratypus, Sonora Road Canyon, Tucson, Mts. Pima, Co., Ariz., 3000 Fuß, 11. X. 1910.

*sauteri* GÜNTHER, 1941 (*Coptotettix*)

(Stett. Ztg., 102, 162–163, Taf. 1, Fig. 8, 9)

Syntypen, 1 ♂, Takao, 12. VIII. 1907; 1 ♀, Takao, im Museum Dresden; 3 ♂♂, 1 ♀, Takao, VII./VIII. 1907, im Museum Berlin; 1 ♀, Takao, im DEI; mehrere ♂♂ und ♀♀, Takao, im Museum Wien; 1 ♀, China, Fokien, Shaowu, 500 m, leg. KLAPPERICH, im Museum Bonn.

DEI: ♀ Syntypus, Takao, Formosa, leg. SAUTER.

*sauteri* KARNY, 1915 (*Dittopternis*)

(Suppl. Ent., 4, 84–85)

Syntypen, 1 ♂, Hoozan, 1910; 1 ♂, Taihorin, 1911; 1 ♂, 2 ♀♀, Kosempo, 1911; 1 ♂, 2 Larven, Kankau (Koshun), IV. 1912, Formosa, leg. SAUTER.  
DEI: 1 ♀, Kosempo, Formosa, 1911, leg. SAUTER; 1 ♂, 1 Larve, Kankau, VI. 1912, leg. SAUTER; 1 ♂, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

*saxatile* MORSE, 1894 (*Spharagemon*)

(Proc. Boston. Soc. Nat. Hist., 26, 229–232)

91 ♂♂, 60 ♀♀, Syntypen, Massachusetts: Blue Hill, Needham, Sherborn, Waltham, Wellesby; Connecticut: Greenwich, New Haven, Thompson; in der Sammlung der Cornell University.  
DEI: 1 Syntypus Greenwich, Conn., 27. VIII. 1892; 1 Syntypus Waltham, Mass., 24. VII. 1892.

*sokutsuense* KARNY, 1915 (*Acrydium*)

(Suppl. Ent., 4, 79–80)

♂ Holotypus, Sokutsu, Formosa, 7. VI. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

*steini* REHN, 1914 (*Pteropera*)

(Wiss. Ergeb. Dtsch. Zentr. Afr. Exped., 5, III, 122–124)

Bugoie-Wald, Nordwest-Ruanda, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN, ♂ Holotypus, im Museum Berlin; 6 ♂♂, 44 ♀♀, Paratypen in Alkohol; 2 ♀♀, in Alkohol, Bugoie-Wald, Nordwest-Ruanda, XI. 1907; 1 ♂, 7 ♀♀ in Alkohol, Vulkangegend nordöstlich des Kiwu-Sees, X. 1907, leg. WIESE.

DEI: ♀ Paratypus, Bugoie Forst, N. W. Ruanda, C. Afrika, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN.

*striata* WILLEMS, 1932 (*Gelastorrhinus*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 287–288, Fig. 3)

2 ♂♂, 1 ♀, Holo- und Paratypen, Luzon, Manila, X. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung, beide mit Typus ausgezeichnet, das ♂ wird hiermit als Lectotypus festgelegt.

*suavis* REHN, 1930 (*Arexion*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 81 (1929), 509–512, Taf. 21, Fig. 3–7)

♀ Holotypus, Madagascar, Lamberton, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5462; 6 ♂♂, 10 ♀♀, vom selben Fundort; 1 ♀, Madagascar, Sammlung HEBARD.  
DEI: 1 Paratypus, Madagascar, Lamberton.

*talamancae* REHN, 1929 (*Microlopteryx*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 55, 52–55, Taf. V, Fig. 5, 6, 8, 9, 12, 13)

♂ Holotypus, North end of Suretka Trail, Duroy River, Estrella Valley, Liman Province, Costa Rica, 100–150 Fuß, 9. IX. 1927, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5471; 18 ♂♂, 18 ♀♀, Paratypen, Costa Rica, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Atlanta Farm, Estrella Valley, Costa Rica, 7. IX. 1927, leg. REHN.

*tenuis* HEBARD, 1923 (*Opaonella*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 49, 303–305, Taf. 17, Fig. 5, 6)

♂ Holotypus, 3 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, Muzo, Boyacá, Colombia, 2700 Fuß, IX. 1919, leg. MARIA, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 905; 2 ♂♂, 6 ♀♀, Pacho Cundinamarca, 5900 Fuß, 19. III. 1917, leg. MARIA; 5 ♂♂, 2 ♀♀, Choachi, Cundinamarca, 5900 Fuß, II./III. 1916, leg. MARIA; 1 ♂, 1 ♀, Fómeque, Cundinamarca, 5900 Fuß, V. 1914, leg. MARIA.

DEI: 1 Paratypus, Fomeque, Colombia, V. 1914, leg. MARIA.

***tequestae*** HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, **23**, 46–51, Taf. I, Fig. 2, 4, Taf. II, Fig. 21)

♂ Holotypus, Orlando, Orange County, Florida, 10. V. 1924, leg. HUBBELL, im Museum of Zoology, University of Michigan; 158 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Orange Co., Florida, Orlando, 10. V. 1924, leg. WALKER.

***tessmanni*** GÜNTHER, 1938 (*Trachytettix*)(Mitt. Zool. Mus. Berlin, **23**, 412–414)

2 ♀♀, Südostkamerun, Uam-Gebiet, Bosum 4. V. 1914, leg. TESSMANN, im Museum Berlin; 2 ♂♂, Côte d'Ivoire, Dimbroko.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Côte d'Ivoire, Dimbroko.

***trifasciata*** WILLEMSE, 1932 (*Incolacris*)(Ann. Soc. Ent. France, **101**, 152)

Philippinen, Siargao, ♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, in Sammlung WILLEMSE; 1 ♂, Paratypus, im DEI; 1 ♂, Paratypus, im Museum Stockholm.

***tristis*** KARSCH, 1891 (*Cyphocerastis*)(Berl. Ent. Ztschr., **36**, 182)

Syntypen, zahlreiche Exemplare beider Geschlechter von der Barombi Station, Kamerun, leg. PREUSS, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

***turgida*** REHN, 1930 (*Bara*)(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, **81** (1929), 502–504, Taf. 20, Fig. 3–6)

♀ Holotypus, Madagascar, Lamberton, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5475; 6 ♂♂, 30 ♀♀, vom selben Fundort.

DEI: 3 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

***vicinus*** GÜNTHER, 1938 (*Syzygotettix*)(Stett. Ent. Ztg., **99**, 199, Fig. 91, 93)

5 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 9 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

***virescens*** WILLEMSE, 1939 (*Maculacris*)(Natuurh. Maandbl., **28**, 73)

♀ Holotypus, Philippines, Surigao, Mindanao, im Gegensatz zur Originalbeschreibung im DEI.

***viridis*** WILLEMSE, 1932 (*Binaluacris*)(Ann. Soc. Ent. France, **101**, 149)

♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: Holotypus mit den Angaben der Beschreibung.

***viridis*** SJÖSTEDT, 1920 (*Calephorops*)(Ark. Zool., **12**, Nr. 20, 6)

Syntypen, Queensland, Bellenden Ker, 21 ♂♂ ♀♀; Yarrabah, Tolga ♂ ♀, leg. MJÖBERG, 1910 bis 1913.

DEI: 1 Syntypus, Bellenden Ker, Queensland, leg. MJÖBERG.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

*brevipes* MILLER (*Gymnophothrus*)

1 Exemplar, Kilosa, 24. VIII. 1926, leg. MILLER; 1 Ex. Tanganyika Territory, Uluguru Mts, II. 1927, leg. MILLER, als Paratypen ausgezeichnet.

### Tridactyloidea

*biloba* HEWARD, 1928 (*Rhipipteryx*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 54, 292–294, Taf. XXVII, Fig. 4)

♂ Holotypus, Upper Reservoir, Banana River, Costa Rica, 100 Fuß, 9. XI. 1909, leg. CALVERT, in Sammlung A.N.S.P., Typen Nr. 5441; 37 ♂♂, 14 ♀♀, Paratypen vom selben Fundort; 1 ♂, Zone limit five miles west of Empire, Canal Zone, Panama, 14. XI. 1912, leg. HEWARD.

DEI: 3 Paratypen mit den Angaben des Holotypus.

*chopardi* WILLEMS, 1922 (*Rhipipteryx*)

(Ent. Mitt., 11, 174–176)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 5 ♀♀, Paratypen, Port Allegre, Süd Brasilien, leg. WILLE.

DEI: Holotypus, 1 ♂, 2 ♀♀, Paratypen, ohne Fundortangaben.

*insignis* CHOPARD, 1937 (*Rhipipteryx*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 150–152, Fig. 14, 15)

♂ Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

*latipes* CHOPARD, 1937 (*Tridactylus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 149–150, Fig. 13)

♂ Holotypus, Brésil, Espírito Santo, X. 1920–II. 1921, leg. HOFFMANN, im DEI.

### Zusammenfassung

Es wird der zweite Teil eines Kataloges der im Deutschen Entomologischen Institut aufbewahrten Typen vorgelegt.

### Summary

There is presented the second part of a catalogue of type specimens preserved in the collections of the Deutsches Entomologisches Institut.

### Резюме

Предлагается вторая часть каталога типов, которые хранятся в Немецком Энтомологическом Институте.