Ein neuer *Crossotarsus*.

Von Karl E. Schedl, Westeregeln.

Crossotarsus Horni n. sp.

Männchen. — Rotbraun, Absturz dunkler, 4,50 mm lang, 3,20 mal so lang als breit. Nahe verwandt mit *Cr. subdepressus* m. aber etwas lichter in Farbe, mit flacher glänzender Stirn, feinerer Halsschildskulptur und auf den Flügeldecken längs der Naht mit einem flachen matten Eindruck.

Stirn glänzend, eben, unten fein, oben sehr grob punktiert und spärlich abstehend behaart.

Halsschild quadratisch, seitliche Ausschnitte mäßig tief, Vorderecken derselben gut ausgebildet, hinten verlaufend gerundet, Oberfläche minutiös genetzt, sehr fein spärlich punktiert, Mittelfurche kurz.

Flügeldecken deutlich breiter (14,5 : 13) und 2,20 mal so lang als das Halsschild, Seiten parallel, hinten im kurzen Bogen eingezogen und dann in je einen zweispitzigen Seitenfortsatz endigend; fein liniert punktiert, 3,5, und 7. Reihe gegen die Basis furchenförmig vertieft, erste und zweite Reihe im basalen Drittel mit größeren, nahezu ineinander verschmelzenden Punkten, Zwischenräume glatt und mit vereinzelten feinen Pünktchen; Absturz ähnlich wie in *Cr. subdepressus* m., der obere matte Teil weniger gewölbt, gegen die mondsichelförmige senkrechte Apikalfläche deutlicher abgesetzt, die Zwischenräume daselbst etwas erhaben fein gekörnt und abstehend einreihig behaart, die Punkte der Reihen gröber, die matte rauhe Fläche im Ausmaße der ersten drei Punktstreifen bis über die Mitte der Flügeldecken nach vorne fortgesetzt, Apikalfläche rauh und matt, seitliche Fortsätze schlanker als in *Cr. subdepressus*, mehr nach unten gerichtet, die Zähnchen selbst spitziger; Abdomen normal.

Typen im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem, und in meiner Sammlung.

Fundort: Kerhamanab, Java, Bandoeng, Roepke, XII. 1909, an *Cinelsona ledgeriana*.

Interessant sind noch die folgenden Fundorte für welche sich Belegstücke im Deutschen Entomologischen Institut befinden:

1. *Platypus solutus* m., Deutsch-Ostafrika, A. Holtz leg.
2. „ *gregalis* m., Franz. Guyana, Maroni.
3. *Crossotarsus propatulus* m., Kilasra.
4. „ *praeclarus* m., Deutsch-Ostafrika, Trockenwald bei Miotokovu, Methner leg.