

7 A 208

Institut für Pflanzenschutzforschung  
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR  
Bereich Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten  
Eberswalde-Finow (DDR)



HANNELORE GAEDIKE

## Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XXIII

(Coleoptera: Rhipiceridae, Cebrionidae, Elateridae, Eucnemidae, Throscidae, Chelonariidae, Buprestidae, Phyllocoptidae, Dicronychidae, Dascillidae, Helodidae, Dryopidae, Georyssidae, Heteroceridae, Dermestidae, Byrrhidae)

### Rhipiceridae

**constricticollis** VAN EMDEN, 1926 (*Callirrhapis*)  
Nova Guinea Zool. 15, 208—209

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Neu Guinea, Dormanpadbivak, 1410 m, 10. 1920, leg. VAN HEURN.  
DEI: 1 ♂, Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**grandicornis** VAN EMDEN, 1926 (*Callirrhapis*)  
Nova Guinea Zool. 15, 208

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Sattelberg, Coll. BENNIGSEN, im DEI.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**horni** VAN EMDEN, 1924 (*Eumonotes*)  
Ent. Mitt. 13, 30—33, Fig. 7, 8

Syntypen, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 1912, 1 ♂, ca. 7. 8., 1 ♀, ca. 7. 7., leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. 8. 1912.

**melanocephalus** VAN EMDEN, 1924 (*Simianellus*)  
Ent. Mitt. 13, 33—34

1 ♂, und Bruchstücke eines zweiten, Syntypen, Formosa, Kosempo, 6. 1912, leg. SAUTER.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Formosa, Kosempo, 6. 1912, leg. SAUTER.

**nevermanni** VAN EMDEN, 1931 (*Callirrhapis*)  
Ent. Bl. 27, 147—149

Syntypen: 2 ♂♂, 2 ♀♀, La Palma ?, 1500 m, leg. GONGORA; 1 ♂, 1 ♀, La Palma, 1500 m, 8. 2. 1925, aus Puppenzelle, leg. GONGORA; 3 ♂♂, 1 ♀, La Palma, 1500 m, 21. 2. 1925.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Costa Rica, La Palma, 1500 m, 8. 2. 1925, leg. GONGORA.

**olivatorum** KRAATZ, 1859 (*Arraphus*)  
Berl. ent. Ztschr. 3, 55; Taf. 3, Fig. 6

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, bei Athen, zwischen der losen Borke eines Olivenbaumes, leg. KRÜPER.  
DEI: 2 Syntypen, Græcia.

**sauteri** VAN EMDEN, 1924 (*Sandalus*)  
Ent. Mitt. 13, 28—30, Fig. 1—3

♂ Syntypen, Formosa, Hoozan, 9. 1910, leg. SAUTER.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Formosa, Hoozan, 9. 1910, leg. SAUTER.

**variegata** VAN EMDEN, 1926 (*Callirrhapis*)  
Nova Guinea Zool. 15, 207—208

Syntypen: 1 ♂, Neu-Guinea Exped., Idenburg Riv., Prauwenbivak, 11. 1920, leg. VAN HEURN; 1 ♀, Neu-Guinea Exped., Mamberamo Riv., Piomierbivak, 6.—7. 1920, leg. VAN HEURN; 1 ♂, Hattam, Neu Guinea, Utrechtis zend. Gen., Mus. Leyden; 1 ♂, Gazellen-Halbinsel, Coll. BENNIGSEN; 1 ♂, Coll. KRAATZ, ohne Patria; 1 ♂, Neu-Guinea, Coll. SCHWARZ, im DEI; 2 ♂♂, Deutsches Neu-Guinea, Dallmannhafen, 12. 1908, leg. WALIS und NEUHAUSS, im Mus. Berlin; 1 ♂, Neu-Guinea, 1909, leg. MÜLLER, im Mus. Dresden; 1 ♂, Kaiser-Wilhelms-Land, Bongu, 9942, Mus. Dresden.  
DEI: ♂ Lectotypus, N. Guinea Expedition, Idenburg Riv., Prauwenbivak, 11. 1920, leg. v. HEURN; 1 Paralectotypus, N. Guinea; hiermit festgelegt.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

***erinitus*** VAN EMDEN (*Sandalus*)

DEI: 1 ♀, Usambara, Nguelo, als Typus ausgezeichnet.

***gracilis*** VAN EMDEN (*Sandalus*)

DEI: 1 ♂, Benguella, leg. WELLMANN, als Typus ausgezeichnet.

***nitens*** VAN EMDEN (*Sandalus*)

DEI: 1 ♂, Ungoni, 10. 12., als Typus ausgezeichnet.

Cebriionidae

***anthracinus*** CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 403

Syntypen, Andalusien, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, And., WALTL, in Coll. HEYDEN.

***aterrimus*** CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 396–397

Syntypen, Algerien, Philippeville, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Philippeville, TARNIER, in Coll. HEYDEN.

***bruteriei*** HEYDEN, 1870 (*Cebrio*)

Berl. ent. Ztschr. 14 (Beiheft), 122–124

3 Syntypen, Portugal, Weg zwischen Celorio und Mangualde, in der Ebene am Fuß der Serra Estrella, auf *Spartium*-Hecken, 1 Ex., 25. 6. 1868, leg. HEYDEN, 2 Ex., leg. DE LA BRÜLERIE; in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, leg. HEYDEN, in Coll. HEYDEN.

***deformis*** CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 38

Syntypen, Algerien, Oran, HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Oran, in Coll. HEYDEN.

***fiorii*** LEONI, 1906 (*Cebrio*)

Riv. Col. Ital. 4, 212; Taf. 2, Fig.

Zahlreiche ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Puglia, Bisceglia, leg. FIORI; zahlreiche ♂♂ Syntypen, Basilicata, Lavello und Molise, Termoli, leg. LEONI; Vulture, leg. BALDINI.  
DEI: 2 Syntypen, Italien, Basilicata, leg. LEONI.

***laticornis*** CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 409

Syntypen, Tanger, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Tanger, in Coll. HEYDEN.

***segmentatus*** CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 390–391

Syntypen, Mogador, HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Amsmid bis Mogador, 14.–20. 6. 1872, leg. FRITSCH & REIN, in Coll. HEYDEN.

***centralis*** CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 397

Syntypen, Algerien, Oran, HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Oran, TARNIER, in Coll. HEYDEN.

Elateridae

***abbreviatus*** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 128–129

♂♂ Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 5 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

***abdominalis*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 322–323

Syntypen, N-Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Borneo; 3 Syntypen, Kina Balu.

***acuminatus*** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)

Stett. ent. Ztg. 63, 241–242

Syntypen, Transvaal.

DEI: 1 Syntypus, Transvaal, leg. HARTMANN.

***acutus*** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)

Stett. ent. Ztg. 63, 242–243

Syntypen, West-Afrika, Landana.

DEI: 1 Syntypus, Landana, 22. 7. 1892.

***adlocoides*** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
Soc. ent. 23, 114

Syntypen, Sudan.

DEI: ♂ Lectotypus, Sudan, Kati, von GIRARD festgelegt.

***adrastoides*** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 157–158

♂ Syntypen, Usambara.

DEI: ♀ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Usambara, leg. WEISE, durch VON HAYEK festgelegt.

***adrastoides*** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 351–352

Syntypen, Guadalupe (Peru?).

DEI: 7 Syntypen, Guadeloupe.

***adustus*** ELSTON, 1924 (*Lacon*)  
Trans. Proc. R. Soc. S. Austral. 48, 205

Holotypus, Paratypen, Queensland: Cairns, leg. LEA; Coen River und Stewart River, leg. DODD; Townsville, leg. TINDALE; Malanda, leg. MJÖBERG. Holotypus, im South Austr. Mus.  
DEI: 2 Paratypen, Queensland, Coen River.

***aeneipennis*** SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 52–53

♂ Syntypen, Brasilien, B. Retiro.

DEI: 2 Syntypen, B. Retiro.

***aenescens*** SCHWARZ, 1907 (*Crepidomenus*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 83

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: ♀ Lectotypus, Victoria, durch NEBOISS festgelegt.

***aenetus*** SCHWARZ, 1901 (*Hypnooides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 30–31

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

***aenetus*** SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 57–58

♂ Syntypen, Venezuela.

DEI: 5 Syntypen, Venezuela.

***aequalis*** SCHWARZ, 1902 (*Agoniodes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 332

Mehrere Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS, im Mus. Brüssel.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

***aequalis*** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 35, 107; Taf. 2, Fig. 40

♂ ♂ Syntypen, Sizilien.

DEI: 1 ♂, Syntypus, ohne Fundortangaben.

***africanus*** SCHWARZ, 1905 (*Corymbites*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 291

Syntypen, Transvaal.

DEI: ♀ Lectotypus, Transvaal, von GIRARD festgelegt.

***africanus*** SCHWARZ, 1898 (*Glyphonyx*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 154–155

♂ Syntypen, Kamerun.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun; 3 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

***africanus*** SCHWARZ, 1905 (*Spilus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 283–284

Syntypen, Kamerun; Congo Franç., Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun; 1 Paralectotypus, Congo Franç., Benito; 1 Paralectotypus, Kamerun, Victoria; 1 Paralectotypus, ohne Fundortangaben; von GIRARD festgelegt.

***agriotides*** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 338–339

Syntypen, Brasilien, Itaby, Prov. Goyas.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.–11. 1897.

***agriotiformis*** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 188

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♂ Lectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

***alboguttatus*** SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 334—335

Syntypen, D. N.-Guinea.

DEI: 1 Syntypus, D. N.-Guinea, Simbang.

***altaicus*** SCHWARZ, 1900 (*Athous*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 108—109

♂♂, 1 ♀, Syntypen, Altai.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

***altaicus*** SCHWARZ, 1900 (*Corymbites*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 110

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Sibiria occ., Altaisk, leg. ROST, im DEI.

***alternatus*** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 311—312

Syntypen, Br. Neu-Guinea, Astrolabe-Gebirge.

DEI: 1 Syntypus, Br. N.-Guinea, Astrolabe Geb., leg. WEISKE.

***alternatus*** SCHWARZ, 1903 (*Monoercepdius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 398

Syntypen, Süd-Australien.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, N. S. Wales.

***ambiguus*** SCHWARZ, 1905 (*Lobotarsus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 279—280

Syntypen, Madagaskar, Cap. d'Amble.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Madagaskar, von GIRARD festgelegt.

***ambiguus*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 320—321

Syntypen, Birma.

DEI: 1 Syntypus, Birma.

***ambiguus*** SCHWARZ, 1901 (*Parapomachilius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 340—341

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

***amitinus*** SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 110—111

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Goyaz.

DEI: 1 Syntypus, Jatahy, Goyaz.

***analis*** SCHWARZ, 1892 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 36, 383

♂ Holotypus, Asia minor, Tokat., im DEI.

***anatolicus*** REITTER, 1901 (*Ludius*)

Wien. ent. Ztg. 20, 100

Syntypen, Anatolien, Ak-Chehir, leg. KORB.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Ac-Chehir, leg. KORB.

***ancoralis*** SCHWARZ, 1901 (*Heteroderces*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 24—25

Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN.

DEI: 7 Syntypen, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

***angularis*** SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 104

Syntypen, Columbia, Cauca-Tal.

DEI: 1 Syntypus, S. Amerika, Caucatal.

***angularis*** SCHWARZ, 1905 (*Hemipops*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 266

Syntypen, Sumatra, Soekaranda.

DEI: 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

***angularis*** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderces*)

Stett. ent. Ztg. 63, 243—244

Syntypen, Madagascar.

DEI: 3 Syntypen, Madagascar, leg. SIKORA.

***angularis*** SCHWARZ, 1898 (*Phedomenus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 142—143

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**angularis** SCHWARZ, 1903 (*Tilotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 359–360

Syntypen, Madagaskar.

DEI: 2 Syntypen, Madagaskar, Ambergiebirge; 2 Syntypen, ohne Fundortangaben.

**angustatus** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 115

Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

**angusticollis** SCHWARZ, 1906 (*Aptopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 143–144

55 Syntypen, Mendoza.

DEI: 2 Syntypen, Mendoza.

**angusticollis** SCHWARZ, 1898 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 155–156

Syntypen, Assam.

DEI: 2 Syntypen, Assam.

**angustifrons** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 234–235

Syntypen, Brasilien, Santos.

DEI: 1 Syntypus, Santos.

**angustus** SCHWARZ, 1899 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 77–78

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika, Usaramo, Mhonda.

DEI: 1 Syntypus, Usambara, Nguelo; 1 Syntypus, D. Ost Afrika, Usaramo; 1 Syntypus, Mhonda.

**angustus** SCHWARZ, 1904 (*Atractosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 59–60

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasil.

**angustus** SCHWARZ, 1901 (*Sphenomerus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 21–22

Syntypen, Ceylon, Kandy, leg. HORN.

DEI: 2 Syntypen, Kandy.

**angustus** SCHWARZ, 1901 (*Stenopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 308

Syntypen, Süd-Amerika, Caucathal.

DEI: 1 Syntypus, S. Amerika, Caucathal.

**annamensis** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 322

Syntypen, Süd-Annam, Pha-Rang.

DEI: 1 Syntypus, Süd-Annam, Pha-Rang, leg. FRUHSTORFER.

**annulatus** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 352–353

Syntypen, Santa Rita.

DEI: 2 Syntypen, Santa Rita.

**anpingensis** MIWA, 1930 (*Cardiophorus*)  
Wien. ent. Ztg. 47, 91

Syntypen, Formosa, Anping, 5. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Anping, 5. 1912, leg. SAUTER.

**antennalis** SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 139–140

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

**antennalis** SCHWARZ, 1901 (*Agelasinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 354–355

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga.

**antennalis** SCHWARZ, 1907 (*Paracardiophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 81–82

Syntypen, Australien, N. S. Wales.

DEI: 1 Syntypus, N. S. W.

**antennalis** SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 71–72

Syntypen, Venezuela, Merida.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, Merida.

**antennarius** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 359

Holotypus, Australia merid., im DEI.

**antennarius** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 46

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, ohne Fundortangaben, von GIRARD festgelegt.

**antennatus** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 358

3 Syntypen, Victoria occ.

DEI: 2 Syntypen, Victoria occ.

**anticus** SCHWARZ, 1902 (*Eschatroxus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 255—256

2 Syntypen, Neu Guinea, Stephansort.

DEI: 3 Ex., N. Guinea, Stephansort, als Typen ausgezeichnet, es ist nicht festzustellen welche zwei Tiere SCHWARZ bei der Beschreibung vorgegeben haben.

**anulatus** SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 32

♂♂ Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN; ♀♀ Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Weligama; 1 ♀, Syntypus, Nalanda.

**apicalis** SCHWARZ, 1900 (*Arrhaphes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 94—95

4 Syntypen, Mentawai-Sipora, leg. MODIGLIANI; 1 Syntypus, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra; 3 Syntypen, Mentawai, Sipora, Sereinu, 5.—6. 1894, leg. MODIGLIANI.

**apicalis** SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 327

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

**apicalis** SCHWARZ, 1905 (*Elasmosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 273—274

Syntypen, Usambara, Nguelo.

DEI: ♀ Lectotypus, Nguelo, von GIRARD festgelegt.

**apicalis** SCHWARZ, 1902 (*Ethesopush*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 149

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, 1885, leg. DRAKE.

**apicalis** SCHWARZ, 1898 (*Hemicleus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 183—184

Holotypus, Usambara, Ost-Afrika.

DEI: ♀ Holotypus, Usambara, leg. WEISE.

**apicalis** SCHWARZ, 1898 (*Melanthoides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 141—142

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Lolodorf.

**apicalis** SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)  
Arkiv Zoologi 1, 48—49

2 ♀♀, Syntypen, Kamerun; 1 Ex., leg. SJÖSTEDT, 1 Ex., in Coll. SCHWARZ.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**apicalis** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 123—124

Syntypen, Brasilia, Jatahy-Goyaz.

DEI: 5 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

**apicalis** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 363

Holotypus (teste NEBOISS), N. Queensland, leg. WEISKE, im DEI.

**apicalis** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 73—74

2 Syntypen, Brasilien, leg. BRUCH.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, 10. 11. 1901, leg. BRUCH.

**araxicola** REITTER, 1895 (*Hypnoidus*)  
Ent. Nachr. 21, 91

Syntypen, Araxesthal bei Ordubad.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDER, REITTER, in Coll. HEYDEN.

*arenarius* SCHWARZ, 1901 (*Paracardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 37

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Weligama.

*arenicola* SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 23–24

Syntypen, Ceylon; Trinkomalee, Weligama, Anuradhapura, leg. HORN.  
DEI: 5 Syntypen, Trinkomalee; 1 Syntypus, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

*arenicola* SCHWARZ, 1901 (*Paracardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 36

Syntypen, Ceylon, Trinkomalee, leg. HORN.  
DEI: 1 Lectotypus, 2 Paralectotypen, Trinkomale, durch VON HAYEK festgelegt.

*arenosus* SCHWARZ, 1901 (*Paracardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 35

Syntypen, Ceylon, Colombo, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Colombo.

*arisanus* MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)  
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 206

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER. Paratypen; Arisan, 12. 1915, leg. MAKI; Arisan, 10. 10. 1912, leg. NITOBÉ; Kaushirei, 11. 5. 1909, leg. NITOBÉ.  
DEI: Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER.

*armeniacus* SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 365

DEI, Syntypen, Hoch-Armenien, in Coll. SCHWARZ.  
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, ohne Fundortangaben.

*aspersus* SCHWARZ, 1902 (*Altolytus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 309–310

♂ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson.  
DEI: Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

*assamensis* SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 204–206

Syntypen, Assam.  
DEI: 1 Syntypus, Assam.

*assamensis* SCHWARZ, 1905 (*Hemipros*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 264–265

♂, ♀, Syntypen, Assam, Kohima.  
DEI: 5 Syntypen, Assam.

*assamensis* SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 283–284

♂ Syntypen, Assam.  
DEI: 5 Syntypen, Assam.

*assamensis* SCHWARZ, 1905 (*Pscaphus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 260–261

Holotypus, Assam, Kohima, leg. DUCHON, im DEI.

*ater* SCHWARZ, 1902 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 135–136

♂ Syntypen, Brasilien, Espírito-Santo.  
DEI: 1 Syntypus, Espírito Santo, Brasil, leg. MICHAELIS.

*ater* SCHWARZ, 1906 (*Asaphoides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 367–368

Holotypus (teste NEBOISS), Australia (merid. ?), im DEI.

*ater* SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 101–102

Syntypen, Guinea.  
DEI: ♂ Lectotypus, Guinea, von GIRARD festgelegt.

*aterinus piloselloides* SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 88; als var. beschrieben

Syntypen, Sibirien; Amur, Wladiwostock.  
DEI: 1 Syntypus, Sibirien or., in Haupsammlung; 2 Syntypen, Wladiwostock; 1 Syntypus, Amur, in Coll. KOLTZE.

*athoides* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 152

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

**athoides** SCHWARZ, 1903 (*Euplastius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 62

Syntypen, California.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Californien, von BECKER (Can. Ent. 43, 171–174; 1961) festgelegt.

**athoiformis** SCHWARZ, 1903 (*Euplastius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 61–62

Syntypen, Alabama.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 Paralectotypen, Alabama, von BECKER (Can. Ent. 43, 175; 1961) festgelegt.

**athoiformis** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 188–189

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♂ Lectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

**atomus** SCHWARZ, 1904 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 80

2 Syntypen, Argentinien, Buenos Aires (?), leg. BRUCH.

DEI: 1 Syntypus, Buenos Aires, leg. BRUCH.

**atricornis** HEYDEN, 1884 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 28, 278

Einige Syntypen, Amurgebiet, Insel Askold, 1883, in Coll. HEYDEN und KOLTZE.

DEI: Lectotypus, Amur, I. Askold, 1884, in Coll. HEYDEN; 3 Paralectotypen, Askold, in Coll. KOLTZE; von GURJEVA festgelegt.

**atripes** REITTER, 1896 (*Elater*)  
Wien. ent. Ztg. 15, 288

Syntypen, Thian-Schan, durch HAUSER.

DEI: 2 Syntypen, Thian-Schan, Musart, 6. 1894, Coll. HAUSER.

**auratilis** SCHWARZ, 1903 (*Tetralobus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 364–365

♂ Syntypen, Franç. Congo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♂♂, Paralectotypen, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**auricollis** SCHWARZ, 1905 (*Adelocera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 273

Syntypen, Madagaskar, Cap d'Ambre, Diego-Suarez.

DEI: ♂ Lectotypus, Cap d'Ambre, Madagascar, ex Coll. SCHNEIDER; 1 ♂, Paralectotypus, Diego Suarez; von GIRARD festgelegt.

**aurilegulus** L. W. SCHAUFUSS, 1862 (*Elater*)  
Sitz. Ber. Isis Dresden 1862, 200–201

30 Syntypen, Spanien, leg. STAUDINGER.

DEI: 1 Syntypus, Spanien.

**auronebulosus** REITTER, 1896 (*Selatosomus*)  
Wien. ent. Ztg. 15, 290

Syntypen, Turkestan, Thian-Schan, durch HAUSER.

DEI: 1 Syntypus, Thian-Schan, Musart, 6. 1894, Coll. HAUSER; 1 Syntypus, Juldus, Kuldscha.

**azoricus** TARNIER, 1860 (*Oophorus*)

Colopteres des Iles Azores. In: A. MORELET, Voyage aux Azores gr. 8, 93–94

Syntypen, Azoren, Umgebung von Ponta Delgada und Villa do Porto, auf den Inseln San Miguel und Santa Maria.  
DEI: 1 Syntypus, Azoren, Santa Miguel.

**basalis** SCHWARZ, 1898 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 192

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: 1 Syntypus, Usambara, leg. WEISE.

**basalis** SCHWARZ, 1902 (*Dioxypterus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 315–316

Syntypen; Neu Pommern; Gazellen-Halbinsel; Herbertshöhe.

DEI: 1 Syntypus, Herbertshöhe.

**basalis** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilioides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 346

Syntypen, Callanga, Peru.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

**basalis** SCHWARZ, 1902 (*Pyrophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 284–285

Syntypen, Ecuador, Napo und Archidona.

DEI: ♂ Lectotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH; 1 ♂, Paralectotypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH, von COSTA (Arquivos de Zool. 29, 195; 1978) festgelegt.

**basilaris** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 112–113

Syntypen, Brasilia, Jatahy, Goyaz.  
DEI: 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

**basimaculata** SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)  
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru-Expedition 7 Col. 63

4 ♂♂ ♀♀, Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, untere Kulturzone, 4. 1906; Meru-Niederung, Ngare na nyuki, 1. 1906; alle leg. SJÖSTEDT.  
DEI: Meru Niederung, leg. SJÖSTEDT, 1 Syntypus, 25. 11. 1905, 1 Syntypus, Jan.

**benitensis** HAYEK, 1973 (*Agrypnus*)  
Bull. Brit. Mus. N. H. Ent. Suppl. 20, 130; nom. nov. pro *depressus* SCHWARZ, 1902;  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 312–313

Syntypen, Congo Franç., Benito.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Congo Franç., Benito.

**bennigseni** SCHWARZ, 1902 (*Dioxypterus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 314–315

♀♀ Syntypen; Neu Pommern; Gazellen Halbinsel; Baining-Berge.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Baining Berge, durch VAN ZWALUWENBURG (Pacific Insects 1, 364; 1959) festgelegt.

**bennigseni** SCHWARZ, 1898 (*Ludius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 410

♂♂ Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika.  
DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afr., leg. v. BENNIGSEN.; 1 ♂, Paralectotypus, D. es. Sal.; von GIRARD festgelegt.

**bennigseni** SCHWARZ, 1896 (*Pantolamprus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 89–90

Syntypen, Pangani-Steppe, leg. BENNIGSEN.  
DEI: ♀ Lectotypus, D. Ost Afrika, leg. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

**berhardinus** STIERLIN, 1879 (*Melanotus*)  
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 439–440

♂♀ Syntypen, Schweiz (ohne genauere Fundortangaben).  
DEI: 1 Syntypus, Simplon; 1 Syntypus, St. Bernhard; 1 Syntypus, Wallis.

**bicolor** SCHWARZ, 1906 (*Isehiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 107–108

Syntypen, Surinam.  
DEI: 1 Syntypus, Surinam.

**bicolor** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 122–123

Syntypen, Australien mer., Victoria.  
DEI: 1 Syntypus, Australien, Victoria.

**bicostata** SCHWARZ, 1902 (*Anacantha*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 196–197

♂♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.  
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.–11. 1897.

**bifasciatus** SCHWARZ, 1903 (*Paracosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 79

Syntypen, Bolivien, Cochabamba.  
DEI: 2 Syntypen, Boliv., Cochabamba, leg. GERM.

**bifasciatus** SCHWARZ, 1902 (*Semiotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 129–130

♀♀ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

**biformis** SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 268–269

♂♀ Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 6 Syntypen, Peru, Callanga.

**bifoveolatus** SCHWARZ, 1902 (*Pristilophus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 291–292

Syntypen, Tonga-Tabu, vom Mus. GODEFFROY.  
DEI: 1 Syntypus, Tong Tabu., Mus. GODEFFROY Nr. 15619.

**bilineatus** SCHWARZ, 1906 (*Tomocephalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 150–151

Syntypen, Chiriquí.  
DEI: 1 Syntypus, Chiriquí.

**bimaculata** SCHWARZ, 1905 (*Penia*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 262—263

Syntypen, Assam.  
DEI: 1 Syntypus, Assam.

**bimaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Cardiorhinus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 295—296

Syntypen, Ecuador, Archidona.  
DEI: 2 Syntypen, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH.

**bimaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 262—263

♂♂ Syntypen, Columbien.  
DEI: 2 Syntypen, Columbien.

**bimaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 113—114

2 Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Australia, Victoria, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 211; 1979) festgelegt.

**bimarginatus** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
Soc. ent. 23, 93

Zahlreiche Syntypen, Madagascar, Montagnes d'Ambre.  
DEI: 3 Syntypen, Amber-Gebirge.

**bioculatus** SCHWARZ, 1902 (*Thaumastiellus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 336

Holotypus, Tonkin, Montes Mauson.  
DEI: Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

**bipartitus** SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 313—314

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 5 Syntypen, Peru, Callanga.

**bipunctatus** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
Soc. ent. 23, 82—83

Syntypen, Madagascar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.  
DEI: 1 Syntypus, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe; 1 Syntypus, Madagascar.

**bipunctatus** SCHWARZ, 1906 (*Panaspaeus*)  
In: WYSMAN, Gen. Ins. 46, 148

Syntypen, Neu Seeland.  
DEI: 1 Syntypus, Neu Seeland, verloren gegangen.

**bipunctatus** SCHWARZ, 1905 (*Phedomenus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 288

Syntypen, Togo.  
DEI: ♂ Lectotypus, Togo, Bismarckburg, von GIRARD festgelegt.

**bivittatus** SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 58

♀? Holotypus, Paraguay, im DEI.

**blepharipes** SCHWARZ, 1901 (*Crepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 311—312

♂♀ Syntypen, Mexico, Durango.  
DEI: 3 Syntypen, Mexico, Durango.

**bodemeyeri** REITTER, 1906 (*Elater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 449

2 ♀, Syntypen, Anatolian, Alem-Dagh und Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Goek Dagh, leg. v. BODEMEYER.

**boliviensis** SCHWARZ, 1906 (*Triplonychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 144

Syntypen, Bolivien, Yungas de La Paz.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivia, Yungas de La Paz, 1000 m.

**brevicollis** SCHWARZ, 1891 (*Agricotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 104; Taf. 2, Fig. 34

♂♀ Syntypen, Syrien.  
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Kaifa, leg. REITTER; 1 Syntypus, Syrien, leg. COVE?

**brevicornis** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 155—156

Syntypen, Usambara, Nguela.  
DEI: 2 Paralectotypen, Usambara, Nguela, durch VON HAYEK festgelegt.

*brevicornis* SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 61–62

♂♀ Syntypen, Brasilia merid., Nova Friburgo.  
DEI: 1 Syntypus, Süd-Brasilien, Neu Freiburg, leg. WIENGREEN.

*brevipennis* SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 319

Syntypen, Rio Grande do Sul.  
DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

*brevipennis* SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)

siehe *curtipennis* SCHWARZ, 1906

*brevipennis* SCHWARZ, 1897 (*Athous*)  
Wien. ent. Ztg. 16, 135

Syntypen, Abchasia, leg. ROST.  
DEI: 2 Syntypen, Abchasia, leg. ROST.

*brevipennis* SCHWARZ, 1903 (*Drasterius*)

siehe *curtipennis* SCHWARZ, 1906

*brevipennis* SCHWARZ, 1903 (*Lobolarsus*)  
Arkiv Zoologi 1, 44–46

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

*breipes* SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 101–102

Syntypen, Argentina.  
DEI: 1 Syntypus, Argent.

*breviusculus* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 156

Syntypen, Afrika, Banana.  
DEI: 2 Syntypen, Banana, leg. BUSSCHODTS.

*bruchi* SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 103

♀ Holotypus, Brasilia, leg. BRUCH.  
DEI: Holotypus, Brasilien, 11. 1901, leg. BRUCH.

*bruchi* SCHWARZ, 1904 (*Grammophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 71–72

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Argentinien, Gob. Neuquen., leg. BRUCH.  
DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Gob. Neuquen, 12. 1. 1898, leg. BRUCH.

*bruchi* SCHWARZ, 1906 (*Monadicus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 142–143

Syntypen, Buenos Aires, leg. BRUCH.  
DEI: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, 1896, leg. BRUCH.

*bruchi* SCHWARZ, 1906 (*Triplonychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 144–145

Holotypus, Argentinien, Prov. Tucuman, leg. BRUCH.  
DEI: Holotypus, Argentina, Prov. Tucuman, 30. 1. 1904, leg. BRUCH.

*brunneipennis* MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)  
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 206

Syntypen, Formosa, Kankau, 6., 8., 9. 1912, leg. SAUTER.  
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 8. 1912, 9. 1912, leg. SAUTER.

*brunneiventris* SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 316–317

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.  
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

*brunneiventris* SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 217

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, durch GIRARD festgelegt.

*brunneiventris* SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)

In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 60

♂ Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Kulturzone, 4. 1906, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, Kulturzone, 9. 4. 1905–6, leg. SJÖSTEDT; 1 ♀, Paralectotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300–1900 m, 3. 3. 1905–6, leg. SJÖSTEDT; von GIRARD festgelegt.

***brunneofasciatus*** SCHWARZ, 1906 (*Anchastus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 137

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.  
DEI: 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

***brunneus*** SCHWARZ, 1902 (*Anchastus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 253—254

Syntypen, Brasilien Yrimaguas.  
DEI: 1 Syntypus, Yrimaguas.

***brunneus*** SCHWARZ, 1907 (*Crepidomenus*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 85—86

Holotypus (teste NEBOISS), Neu Seeland, im DEI.

***brunneus*** SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 334—335

Syntypen, Brasilien.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

***brunnicornis*** SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 36, 164 nota 1

Syntypen, China, Peking.  
DEI: 1 Syntypus, Peking.

***brunnipennis*** SCHWARZ, 1908 (*Olophoeus*)  
Soc. ent. 23, 113—114

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ? Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

***brunnipes*** SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 321

Syntypen, West-Australien, Swan-River, im Mus. GODEFFROY.  
DEI: 1 Syntypus, Swanriver, Alte Sammlung.

***brunnipes*** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 119—120

♂♀ Syntypen, Queensland.  
DEI: 2 Syntypen, Queensland.

***bucharensis*** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 102

Syntypen, Buchara, Samarkand.  
DEI: Lectotypus, 5 Paralectotypen, Buchara; 1 Paralectotypus, Samarkand, STDGR. 81; durch VON HAYEK festgelegt.

***caledonica*** SCHWARZ, 1903 (*Chrosis*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 390—391

♂♂ Syntypen, Neu Caledonien.  
DEI: 1 Syntypus, N. Caledon.

***candezei*** FLEUTIAUX, 1935 (*Agraeus*)  
Ann. Soc. ent. Fr. 104, 24—25

Syntypen; Süd-Borneo, Martapoera, 6.—7., leg. DOHERTY, in Coll. FLEUTIAUX. Nord-Borneo, Kuching, leg. LEWIS, im Br. Mus. Java; leg. RAFFRAY und MAINDRON, im Mus. Paris. Sumatra, im DEI. Singapour, leg. RAFFRAY, im Mus. Bruxelles.  
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Sumatra, durch VON HAYEK (Bull. Brit. Mus. N. H. Ent., Suppl. 20, 46; 1973) festgelegt.

***candezei*** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 267—268

♂♀ Syntypen, Brasilien, Santos.  
DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. METZ; 2 Syntypen, Brasilien, Santos.

***candezei*** SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 327—328

Syntypen, Java, durch CANDÈZE.  
DEI: 1 Syntypus, Java, Trezny ?, Coll. CANDÈZE; 1 Syntypus, Coll. CANDÈZE.

***candezi*** STIERLIN, 1864 (*Melanotus*)  
Berl. ent. Ztschr. 8, 149

Syntypen, Sicilien.  
DEI: 2 Syntypen, Sicilia.

***candezi*** SCHWARZ, 1896 (*Singhalenus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 97

Syntypen, Cochinchina.  
DEI: 1 Syntypus, Cochinchina.

**capensis** SCHWARZ, 1903 (*Idiotropia*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 375–376

Syntypen, Cap.

DEI: Lectotypus, Cap, Alte Sammlung, von GIRARD festgelegt.

**carinicollis** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
Soc. ent. 23, 83

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

**carinicollis** SCHWARZ, 1894 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 148–149

♂♂ Syntypen, Turkestan, Kulab.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Kulab.

**carinicornis** SCHWARZ, 1903 (*Megapenthes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 368–369

Syntypen, Nguela.

DEI: ♂ Lectotypus, Nguela, von GIRARD festgelegt.

**carinulatus** SCHWARZ, 1902 (*Melanozanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 326–327

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo.

**caspicus** HEYDEN, 1883 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1883, 358

1 Syntypus, Tekke, in Coll. KRAATZ; 1 Syntypus, Baku, leg. SCHNEIDER, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Baku, leg. SCHNEIDER.

**castaneus** MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)  
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 207

Syntypen, Formosa: Taihorin, 7. 1912 und Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER; Horisha, 7. 1926, leg. MIWA; Gyochi, 20. 5, 1909, leg. NITORE.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 8., leg. SAUTER.

**castaneus** MIWA, 1930 (*Neodiploconus*)  
Wien. ent. Ztg. 47, 92

Syntypen, Formosa: Kosempo, 22. 5. 1912 und Alikang, 6. 1909, leg. SAUTER; Kagi, 4. 1907, leg. MATSUMURA; Kanshirei, 18. 4. 1928, leg. TAKAHASHI; Horisha, 7. 1926, leg. MIWA; Rokkiri, 3. 5. 1908, leg. NITORE.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Alikang, 6. 1909, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

**cervicolor** HEYDEN, 1880 (*Athous*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 24, 289

2♂♂ Syntypen, Asturien, Arvas, 1868, leg. HEYDEN.

DEI: 1 ♂; Syntypus, Asturiae, Albas, 29. 7. 1868, leg. HEYDEN, in Coll. HEYDEN.

**championi** SCHWARZ, 1898 (*Anchastus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 147–148

Syntypen, Mexico.

DEI: 6 Syntypen, Mexico.

**championi** SCHWARZ, 1902 (*Athous*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 328–329

♂♀ Syntypen, Mexiko, Durango.

DEI: 2 Syntypen, Mexiko, Durango.

**chilensis** SCHWARZ, 1904 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 70–71

Syntypen, Chile.

DEI: 1 Syntypus, Chile.

**christophei** GIRARD, 1974 (*Olophoeus*)  
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 10, 721–722, Fig. 1, 3, 9

♂ Holotypus, Angola, Benguella, leg. WELLMAN; 10 ♂♂, Paratypen, vom selben Fundort sowie von Huambo/Angola 1934, leg. PIMENTEL.

DEI: 4 Paratypen, Benguella, leg. Wellman.

**cincticollis** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 118–119

2 Syntypen, Argentina, Prov. Tucuman, leg. BRUCH.

DEI: 2 Syntypen, Argentinien, Prov. Tucuman, 11. 1899, 20. 3. 1900, leg. BRUCH.

**cinctipennis** SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 371–372

Syntypen, Afrika or., Ikutha.

DEI: 1 Syntypus, Afr. or., Ikutha.

**cinctipennis** SCHWARZ, 1903 (*Horistonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 74—75

♂♂ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

**cinctipennis** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 77—78

Syntypen, São Paulo.  
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

**cinnamomeus** SCHWARZ, 1909 (*Elastrus*)  
Soc. ent. 24, 122

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.  
DEI: 3 Syntypen, Madagaskar, Amberg.

**cinnamomeus** SCHWARZ, 1902 (*Olophoeus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 315—316

Syntypen, Transvaal.  
DEI: 2 Syntypen, Transvaal, HARTMANN.

**circumcinctus** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 138

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

**collaris** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 302

Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

**collaris** SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 67—68

♂♂ Syntypen, Brasilien, São Paulo.  
DEI: 3 Syntypen, S. Paulo.

**collaris** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 360—361

Holotypus, Australia merid., im DEI.

**collaris** SCHWARZ, 1903 (*Symphostethus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 382—383

♀♀ Syntypen, Deutsch Neu Guinea.  
DEI: 1 Syntypus, Herbertshöhe.

**commutabilis** ELSTON, 1924 (*Lacon*)  
Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 48, 207

Holotypus, Paratypen; Northern Territory, Port Darwin, leg. HUNT, in Coll. FERGUSON; Northwest Australien: Derby, leg. DODD; Noonkanbah, leg. MÖÖBERG. Holotypus, in Coll. ELSTON.  
DEI: 1 Paratypus, Port Darwin, N. Territory.

**concameratus** SCHWARZ, 1903 (*Steatoderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 373—374

♀♀ Syntypen, Kamerun, Lolodorf.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Lolodorf, von GIRARD festgelegt.

**concolor** STIERLIN, 1862 (*Elater*)  
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 1 Heft 1, 36

Syntypen, Schweiz, Burgdorf, leg. MEYER-DÜR.  
DEI: 2 Syntypen, Burgdorf.

**condensus** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 360

Syntypen, Australia merid.  
DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, ohne Fundortangaben, aus Coll. SCHWARZ.

**confinis** SCHWARZ, 1909 (*Campylolopsephus*)  
Soc. ent. 24, 118

♂♂ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.  
DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**confusus** FLEUTIAUX, 1918 (*Cardiophorus*)  
Ann. Soc. ent. France 87, 228—229

Syntypen; Annam: Qui-Nhon und Tourane, leg. LA PERRAUDIÈRE; Hue, leg. DELAUNEY; Chochinchine, Saigon.  
DEI: 1 Syntypus, Annam, Qui Nhon.

***confusus*** GIRARD, 1976 (*Propsephus*)

Ann. Soc. ent. France (N.S.) 12, 421–422, Fig. 6–9

♂ Holotypus, Tanzanie, Nguelo, Usambara, leg. ROLLÉ, im Mus. Paris; 2 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, im DEI und Coll. GIRARD.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***conicipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Anoplischius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 136–137

Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

***conicipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Steatoderus*)

Stett. ent. Ztg. 63, 296–297

♂? Syntypen, Philippinen.

DEI: 1 Syntypus, Philippinen, leg. DOHRN.

***consors*** HEYDEN, 1884 (*Athous*)

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 293–294

♂ Holotypus, Insel Askold.

DEI: Holotypus, Amur, I. Askold, 1884, in Coll. HEYDEN.

***conspersus*** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 63

Syntypen, Peru.

DEI: 2 Syntypen, Peru.

***conspicuus*** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 35, 86; Taf. 1, Fig. 4

♂♂ Syntypen, Klein-Asien, Karaman.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Typus, Asia minor, Taurus Cilic.

***constrictus*** SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 312

♀♀ Syntypen, Tokelan-Inseln, Atafu.

DEI: 1 Syntypus, Duke of York (= Atafu), Mus. GODEFFROY Nr. 2394.

***cordubensis*** HEYDEN, 1882 (*Silesis*)

Dtsch. ent. Ztschr. 26, 45–46

9 Syntypen, Sierra de Cordoba, leg. EHLERS.

DEI: 3 Syntypen, Sr. Cordoba, leg. EHLERS, in Coll. HEYDEN.

***corymbitooides*** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 358

Syntypen, Australien mer., Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Victoria.

***corymbitooides*** SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)

Arkiv Zoologi 1, 47–48

6 ♂♂ ♀♀, Syntypen, Kamerun.

DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Camerun, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

***cosmesoides*** SCHWARZ, 1906 (*Parapomachilias*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 140–141

Syntypen, Mendoza.

DEI: 6 Syntypen, Argentinien, Mendoza.

***crassipes*** SCHWARZ, 1900 (*Limonius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 105–106

Syntypen, Turcia, Constantinopel.

DEI: 1 Syntypus, Tureia; 1 Syntypus, Constantinopel, leg. STRÜBING.

***crassiusculus*** SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 106–107

Syntypen, Argentina.

DEI: 2 Syntypen, Argentinien.

***crassiventris*** SCHWARZ, 1899 (*Agrypnus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 75–76

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

***crassus*** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)

Stett. ent. Ztg. 68, 72

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Victoria.

***cribratus*** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)

Soc. ent. 23, 122–123

Syntypen, West-Afrika (Kamerun ?).

DEI: ♂ Lectotypus, Afr. occ., von GIRARD festgelegt.

***cribricollis*** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
Soc. ent. 23, 123

Syntypen, Senegal, Casamance.  
DEI: ♂ Lectotypus, Casamance, von GIRARD festgelegt.

***cruciatus*** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilioides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 344—345

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 5 Syntypen, Peru, Callanga.

***crucifer*** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 129—130

Syntypen, Bolivia, La Paz.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivia, La Paz.

***cuneipennis*** SCHWARZ, 1906 (*Crepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 111—112

♂♂, 1 ♀, Syntypen, ohne Fundortangaben aus Amerika.  
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.—11. 1897.

***cuneolus*** SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 148—149

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: ♂ Lectotypus, Dar-es-Sal., von GIRARD festgelegt.

***cuneolus*** SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 278—279

Syntypen; Sumatra, Liangagas, Soekaranda, durch DOHRN.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN.

***cuneolus*** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 330—331

Syntypen; Sumatra; Borneo, Kina-Balu.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera; 2 Syntypen, Kina-Balu.

***curticollis*** SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 109

Holotypus, Brasilia, Apiahy, leg. KRUG.  
DEI: Holotypus, D. KRUG.

***curtipennis*** SCHWARZ, 1906 (*Alautis*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 326; nom. nov. pro *brevipennis* SCHWARZ, 1905,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 285

Syntypen, Gabun.  
DEI: 2 Syntypen, Gabun.

***curvatus*** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 245—246

Syntypen, Nord-Amerika, Alabama.  
DEI: ♀ Lectotypus, 9 Paralectotypen, Alabama, leg. SPEYER, von BECKER (Can. Ent. 43, 165—166; 1961) festgelegt.

***cylindricollis*** SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 65—66

Syntypen, Brasilien, St. Catharina, Lages.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Lages, 1.—3. 1887, leg. FRUHSTORFER; 2 Syntypen, S. Catarina, leg. LÜDERWALDT.

***cylindricollis*** SCHWARZ, 1902 (*Agriotes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 209

Syntypen, China, Prov. Fokien.  
DEI: 8 Syntypen, Fokien.

***cylindricollis*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 326—327

Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

***cylindricus*** SCHWARZ, 1898 (*Athoomorphus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 156

Syntypen, Afrika, Orange.  
DEI: 2 Syntypen, Orange.

**cylindricus** SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 68–69

♂♂ Syntypen, Brasilien.  
DEI: 11 historische Exemplare, ohne Fundortangaben, vielleicht Typen.

**decoratus** SCHWARZ, 1897 (*Diacanthus*)

siehe *decorus* SCHWARZ, 1906

**decoratus** SCHWARZ, 1898 (*Lobolarsus*)

siehe *lotodorfensis* HAYEK, 1973

**decorus** SCHWARZ, 1906 (*Diacanthus*)

In: WYTSMAN, Gen. insect. 46, 223; nom. nov. pro *decoratus* SCHWARZ, 1897,  
Wien. ent. Ztg. 16, 136

♀ Holotypus, Turkestan, im DEI.

**delicatulus** SCHWARZ, 1897 (*Hypnoidus*)

Wien. ent. Ztg. 16, 129

Syntypen, Bagdad.

DEI: 2 Syntypen, Bagdad.

**dentatus** SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 149–150

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

**denticulatus** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)

Soc. ent. 23, 121–122

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**depressicollis** SCHWARZ, 1901 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 305

Syntypen, Insel Palau.

DEI: 1 Syntypus, Palau.

**depressifrons** DESBROCHERS, 1870 (*Athous*)

Abbeille 7, 113–114

♂♀ Syntypen, Corsica.

DEI: 1 Syntypus, Corsica.

**depressus** SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 326–327

Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS, im Mus. Brüssel.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

**depressus** SCHWARZ, 1902 (*Lobolarsus*)

siehe *benitensis* HAYEK, 1973

**depressus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)

siehe *planatus* SCHWARZ, 1906

**deromecoides** SCHWARZ, 1906 (*Medonia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 136

Syntypen, Chile.

DEI: 6 Syntypen, Chile.

**desbrochersi** CANDEZE, 1881 (*Melanotus*)

Elaterides nouveaux 3, 87

Syntypen, Azoren, in Coll. DESBROCHERS.

DEI: 1 Syntypus, Açores, DESBR.

**differens** SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 254

♂♀ Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, leg. SIKORA; 5 Syntypen, Plateau de l'Androy-Reg. d'Ambovombe.

**dimidiatofasciatus** SCHWARZ, 1904 (*Acolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 71

Syntypen, São Paulo.

DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

**dimidiatus** SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 66–67

♂♀ Syntypen, Brasilien, Espírito Santo.

DEI: 8 Syntypen, Espírito Santo; 4 Syntypen, Brasilien.

**dimidiatus** SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 306—307

Syntypen; Soekaranda, Liangagas, durch DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN; 2 Syntypen, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN.

**dimidiatus** SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 124

♂♀ Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

**dimidiatus** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 67+72

♀ Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

**diplotrichus** SCHWARZ, 1902 (*Anoplischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 224

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

**diplotrichus** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 93

Syntypen, Franz. Kongo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**discicollis** SCHWARZ, 1906 (*Cardiorhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 149—150

2 Syntypen, St. Catharina, durch ROLLE, im DEI.

**discicollis** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 353—354

Syntypen, Brasilien.

DEI: 2 Syntypen, Brasil.

**discicollis** SCHWARZ, 1902 (*Elater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 322—323

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

**discicollis** SCHWARZ, 1898 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 145—146

♂♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 5 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

**discicollis** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 141—142

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 2 Syntypen, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT; 1 Syntypus, St. Catharina; 1 Syntypus, Brasilien, St. Catharina.

**discicollis** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 334

Syntypen, Rio Grande do Sul.

DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

**discoidalis** SCHWARZ, 1906 (*Acolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 128

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

**discoidalis** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 328—329

Syntypen, Sumatra, Indrapoera; Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS; 1 Syntypus, N. Borneo; 2 Syntypen, Kina Balu.

**discoidalis** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 386

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Austr.

**discolor** SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 254—255

♂♀ Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**discolor** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 79—80

♂♂♀ Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Deutsch Ost-Afrika; 4 Paralectotypen, Ostafrika; alle aus Coll. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

***divaricatus*** SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 62–63

Syntypen, Brasilien, Santos.

DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. METZ; 1 Syntypus, Santos, Alto da Serra.

***divisus*** SCHWARZ, 1898 (*Anoplischiopsis*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 141

Syntypen, Mexico, S. Cristóbal.

DEI: 1 Syntypus, S. Cristóbal, 16.

***dohrni*** SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 280–281

♂♀ Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

***dohrni*** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 250–251

Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

***dolosus*** SCHWARZ, 1898 (*Agonischioides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 153

Syntypen, Assam.

DEI: 9 Syntypen, Assam.

***dolosus*** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 387

Syntypen, Süd-Australien, Melbourne.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Melb.; 4 Syntypen, S. Australien; 1 Syntypus, Austral.

***dorsalis*** SCHWARZ, 1901 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 310–311

Syntypen, Mexico, Durango.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Durango, Colonia 16.

***dorsalis*** SCHWARZ, 1898 (*Hemicleus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 129

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

***dorsalis*** SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 360

Syntypen, Kinchassa.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀, Paralectotypen, Kinchassa, Waelbroeck, 30. 10. 1896, von GIRARD festgelegt.

***dorsalis*** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 80; als var. zu *discolor* SCHWARZ beschrieben

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNINGSEN, von GIRARD festgelegt.

***drakei*** SCHWARZ, 1896 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 103

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 5 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

***drakei*** SCHWARZ, 1896 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 99–100

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI.

***drakei*** SCHWARZ, 1896 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 101

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 4 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

***dubiosus*** SCHWARZ, 1907 (*Megaphenthes*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 78–79

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Victoria.

***dubius*** SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)  
In: SJÖSTEDT, Kilimanjaro Meru Expedition 7 Col., 65–66

Holotypus, Meru, Ngare na nyuki, 12. 1905, leg. SJÖSTEDT.

DEI: Holotypus, Meru, Niederung, leg. SJÖSTEDT.

***dubius*** SCHWARZ, 1902 (*Hapalesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 126

Holotypus, Australia mer., Victoria, im DEI.

**dubius** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 319—320

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

**duchoni** SCHWARZ, 1905 (*Alaotypus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 257—258

3 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON, im DEI.

**duchoni** SCHWARZ, 1905 (*Hemioips*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 263—266

3 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON.

DEI: 2 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON.

**dugesi** CANDEZE, 1893 (*Glyphonyx*)  
Elaterides nouveaux 5, 66

Syntypen, Mexico, Guanajuato.

DEI: 1 Syntypus, Mexico.

**edmundi** QUELLE, 1955 (*Elasmosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 2, 288

Holotypus, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1897, leg. CONRADT, im Zool. Mus. Berlin; Paratypen, Congo, Riv. San Benito, 1885, leg. GUIRAL, im Mus. Paris; Ogoué, Franz. Äquatorial-Afrika, Lambarene, 1913, leg. ELLENBERGER, im Mus. Paris.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT.

**egregius** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 325—326

Syntypen, Java, leg. DUCHON.

DEI: 1 Syntypus, Java, leg. DUCHON.

**elegantulus** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 316; nom. nov. pro *elongatus* SCHWARZ, 1902,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 320—321

♂♂ Syntypen, Central-Tonkin, Chiem-Hoa.

DEI: 1 Syntypus, Central-Tonkin, Chiem Hoa, 8.—9., leg. FRUHSTORFER.

**elegantulus** SCHWARZ, 1906 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 139—140

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

**ellipticus** SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 59

Syntypen, Peru, Chanchamayo.

DEI: 1 Syntypus, Peru, leg. LANGE.

**elongatus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)

siehe *elegantulus* SCHWARZ, 1907

**elongatus** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
Soc. ent. 23, 123

Syntypen, Togo.

DEI: ♂ Lectotypus, Togo, von GIRARD festgelegt.

**elongatus** SCHWARZ, 1902 (*Nomopelus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 292—293

Syntypen, Transvaal.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Transvaal, leg. HARTMANN, von GIRARD festgelegt.

**elongatus** SCHWARZ, 1902 (*Spheniscosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 275—276

♀ Holotypus, N.-Borneo, im DEI.

**elongatus** SCHWARZ, 1901 (*Stenopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 308—309

Syntypen, Süd-Amerika, Caucathal.

DEI: 1 Syntypus, S. Amerika, Caucathal.

**emarginatus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 121—122

Holotypus, Aru Inseln, im DEI.

**emgei** SCHWARZ, 1893 (*Elathous*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 37, 191

Holotypus, Griechenland, Salonichi, leg. EMGE, im DEI.

**epirus** SCHWARZ, 1875 (*Athous*)  
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 4, 475–476

Syntypen, südliche Türkei, Janina.  
DEI: 1 Syntypus, Janina.

**erythrurus** SCHWARZ, 1902 (*Arrhaphes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 258–259

Syntypen, Sumatra, Sockaranda und Liangagas, leg. DOHRN.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Sockaranda, leg. DOHRN; 1 Syntypus, Sockaranda, J. 1894, leg. DOHRN.

**euaensis** SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 352

Syntypen, Tonga-tabu, Eua, im Mus. GODEFFROY.  
DEI: „Neotypus“ (Pac. Insects 1, 366; 1950) Eua, Mus. GODEFFROY. Die Begründung für die Festlegung eines Neotypus erscheint nicht stichhaltig, da das Exemplar in der Coll. SCHWARZ ebenfalls ein Etikett „Mus. GODEFFROY“ trägt. Bei diesem ♂ handelt es sich somit zweifelsfrei um ein Exemplar der Typenserie. Das ♂ wird hiermit als Lectotypus festgelegt.

**excisus** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 152–153

Syntypen, Ost-Afrika, Dar-es-Salaam; Pangani; Usambara; Somali.  
DEI: 2 Syntypen, Dar-es-Salaam; 1 Syntypus, Pangani-Steppe; 1 Syntypus, Usambara, leg. WEISE; 1 Syntypus, Somalia.

**exclamationis** SCHWARZ, 1903 (*Athous*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 58–59

Syntypen, Nord-Amerika, Alabama.  
DEI: 1 Syntypus, Alabama, leg. SPEYER.

**exiguus** SCHWARZ, 1903 (*Paracosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 79–80

Syntypen, Bolivien, Cochabamba.  
DEI: 2 Syntypen, Boliv., Cochabamba, leg. GERM.

**eximius** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 331–332

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.  
DEI: 3 Syntypen, N. Borneo; 3 Syntypen, Kina-Balu.

**fasciculatus** SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)  
Dtsch. ent. Ztg. 63, 214–215

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

**fasciculatus** SCHWARZ, 1905 (*Hemicleucus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 276–277

Syntypen, Kamerun, Barombi.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**fasciculatus** SCHWARZ, 1906 (*Paracrepidomenus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 365–366

Syntypen, N. S. Wales, Victoria occ.  
DEI: ♂ Lectotypus, 4 Paralectotypen, Victoria occ., von NEBOISS festgelegt.

**fastigiatus** SCHWARZ, 1898 (*Laeon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 185

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♂, 2 ♀♀, Paralectotypen, Usambara, leg. WEISE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 153; 1973) festgelegt.

**feai** FLEUTIAUX, 1835 (*Agraeus*)  
Ann. Soc. ent. Fr. 104, 23

Syntypen; Birmanie; Tenasserim; Sikkim; Assam; Almora, Berenag, 6000 Fuß; Himalaya, Kulu, 3600 Fuß.  
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Tenasserim, Thagatā, 2.–4. 1887, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 31–32; 1973) festgelegt.

**ferrugatus** SCHWARZ, 1906 (*Ischioidontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 110

Syntypen; Peru, Callanga; Bolivia, La Paz; Brasilia, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, Yungas de La Paz; 1 Syntypus, Peru, Callanga.

**ferrugineus** SCHWARZ, 1900 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 97

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS.

**ferrugineus** SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 147

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salam.

**ferrugineus** SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 366

1 ♂, Syntypus, Graecia, in Coll. SCHWARZ; Syntypen, Dalmatien, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Graecia.

**ferrugineus** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 187–188

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.  
DEI: ♂ Lectotypus, D. O. Afrika; 1 Paralectotypus, Usambara; 1 Paralectotypus, Dar-es-Salam, leg. v. BENNIGSEN; von GIRARD festgelegt.

**ficeuzzensis** BUISSON, 1912 (*Athous*)  
Col. Rundsch. 1, 132–133

♂♂ Syntypen, Sizilien, Ficuzza, in Coll. LEONHARD.  
DEI: 1 Syntypus, Sizilien, Ficuzza, 1906, leg. LEONHARD.

**figuratus** SCHWARZ, 1896 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 100–101

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.  
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

**filicornis** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 359

Syntypen, Australie mer., Melbourne.  
DEI: 1 Syntypus, Melb.

**filicornis** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 136–137

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: ♂ ? Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

**fimbriatus** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 119–120

4 Syntypen, Mendoza, im DEI.

**fimbriatus** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
Soc. ent. 23, 122

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ ? Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**flaceolus** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 74–75

Syntypen, Australien, Victoria occ.  
DEI: 1 Syntypus, Austr. occ.

**flavescens** SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 102

Syntypen, Mendoza.  
DEI: 3 Syntypen, Mendoza.

**flavifrons** SCHWARZ, 1903 (*Megapenthes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 369

♀? Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

**flavipes** SCHWARZ, 1902 (*Anchastus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 332

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tenasserim, Tanlong, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: 2 Syntypen, Tenasserim, Tanlong, 4000 Fuß, 5., leg. FRUHSTORFER.

**flavipes** SCHWARZ, 1906 (*Megapenthes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 135–136

Syntypen, Mendoza.  
DEI: 4 Syntypen, Mendoza.

**flavobasalis** HEYDEN, 1889 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 33, 328

Holotypus, Lusitaniae (Portugal), Serra do Estrella, leg. KOLTZE, im DEI.

**flavobasalis** SCHWARZ, 1902 (*Elater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 324–325

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.  
DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

***flavobasalis*** SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 93–94

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

***flavobasalis*** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 73

♂♂ Syntypen, Australien, Victoria occid.  
DEI: 1 Syntypus, Victoria occ.

***flavobasalis*** SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 260–261

Syntypen, China, Prov. Fokien.  
DEI: 2 Syntypen, Fokien.

***flavofasciatus*** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 305–306

Syntypen, Borneo, Kina Balu.  
DEI: 2 Syntypen, N. Borneo; 3 Syntypen, Kina Balu.

***flavofasciatus*** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 263–264

Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.  
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

***flavofasciatus*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 324

Syntypen, N.-Borneo.  
DEI: 4 Syntypen, Borneo, Kina-Balu, 1500 m.

***flavovittatus*** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 351

♂♀ Syntypen, Brasilien.  
DEI: 5 Syntypen, Brasilien, Lages, leg. FRUHSTORFER.

***flavovittatus*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 323–324

Syntypen, N. Borneo.  
DEI: 2 Syntypen, Kina Balu.

***flavus*** SCHWARZ, 1903 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 77–78

Syntypen, Peru, Vilcanota.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Vilcanota.

***flavus*** SCHWARZ, 1903 (*Nomopleurus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 374–375

Syntypen, Oranje.  
DEI: Lectotypus, Oranje, von GIRARD festgelegt.

***fleutiauxi*** SCHWARZ, 1905 (*Nomopleurus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 292

Syntypen, Afrika merid.  
DEI: 1 Paralectotypus, Südafrika, von GIRARD festgelegt.

***florentini*** FLEUTIAUX, 1894 (*Agonischius*)  
Ann. Soc. ent. France 63, 688

Syntypen; Tonkin, Lang-Son, leg. FLORENTIN. Laos, Luang-Prabang, leg. Massie. Tonkin, Dang-Trua, leg. DORR.  
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, leg. FLORENTIN.

***foersteri*** SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 310

♀♀ Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

***formosanus*** SCHWARZ, 1902 (*Sephilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 319–320

Syntypen, Formosa.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa.

***fornicatus*** NEBOISS, 1967 (*Paracalais*)  
Proc. R. Soc. Vict. 80, 273–274, Fig. 21–23; Taf. 44, Fig. 10

♀ Holotypus, Queensland, Endeavour R., im Mus. Melbourne; 11 Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER; 1 ♀, Paratypus, N. S. Wales, Endeavour R.

***forticornis*** SCHWARZ, 1900 (*Elater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 99–100

♂♂ Syntypen, Süd-Ungarn, Rhilo-Dagh, Balkan, leg. MERKL.  
DEI: 4 Syntypen, Süd-Ungarn, leg. MERKL.

***foveiventris*** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 103

Syntypen, Graecia.

DEI: Lectotypus, Graecia, Parnassos, leg. v. OERTZEN, durch von HAYEK festgelegt.

***fragilis*** SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 36, 160; Taf. 2, Fig. 24

♂♀ Syntypen, Turkestan, 1889, leg. HABERHAUER.  
DEI: 1 Syntypus, Turkestan.

***fruhstorferi*** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 340

♂♀ Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.  
DEI: 8 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, 4.–5.

***fruhstorferi*** SCHWARZ, 1902 (*Campsosternus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 318

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: 4 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, 4.–5., leg. FRUHSTORFER.

***fucosus*** SCHWARZ, 1901 (*Melanozanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 321–322

Syntypen, Süd-Ost-Borneo.  
DEI: 1 Syntypus, Sd. Ost Borneo.

***fulgidus*** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 109

Syntypen, Kamerun, Barombi.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

***fulvescens*** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 73

2 Syntypen, Argentinien, Buenos Aires, leg. BRUCH.  
DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Prov. Buenos Aires, 7. 4. 1896, leg. BRUCH.

***fulvus*** SCHWARZ, 1903 (*Steatoderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 373

♀♀ Syntypen, Nguela.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Nguelo, Usambara, von GIRARD festgelegt.

***fumosus*** SCHWARZ, 1900 (*Melanozanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 92–93

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

***fuscipennis*** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 362–363

Syntypen, Victoria.  
DEI: 2 Syntypen, Victoria.

***fusconiger*** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 87

Syntypen, Kamerun, Victoria.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Victoria, von GIRARD festgelegt.

***fuscus*** MIWA, 1930 (*Agriotes*)  
Wien. ent. Ztg. 47, 93–94

Syntypen, Formosa: Sokutsu, Banshoryo district, 7. 7. 1912; Kosempo, 7. 9. 1909; alle leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, 7. 7. 1912, leg. SAUTER.

***fusiformis*** SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 317–318

♂♀ Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.  
DEI: 2 Paralectotypen, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

***fusiformis*** SCHWARZ, 1902 (*Stichotomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 336

Syntypen, Australia bor., Port Mackay.  
DEI: 3 Syntypen, Australia bor., Port Mackay.

***gabunensis*** SCHWARZ, 1903 (*Tetralobus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 363–364

♂♂ Syntypen, Gabun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Gabun, von GIRARD festgelegt.

***gaedikei*** GIRARD, 1974 (*Olophocetus*)  
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 10, 722–724, Fig. 5

♂ Holotypus, Angola, Benguella, leg. WELLMAN, im Mus. Paris; 9 ♂♂, Paratypen, vom selben Fundort, 1 Ex., im Mus. Paris, 4 Ex., im DEI, 4 Ex., in Coll. GIRARD.  
DEI: 4 Paratypen, Benguella, leg. WELLMAN.

***gaertneri*** SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 16

♂ Holotypus, Thüringen, Manebach, 1890, leg. GÄRTNER, im DEI.

***ganglbaueri*** SCHWARZ, 1894 (*Adelocera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 38, 145–146

♂, ♀, Syntypen, Syrien, Beirut, 1878, leg. APPL.

DEI: 1 Syntypus, Beirut, 1878, leg. APPL.

***ganglbaueri*** SCHWARZ, 1891 (*Agriontes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 35, 86; Taf. 1, Fig. 5

♂, ♀ Syntypen, Syrien, Beirut.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Beirut, 1. 1878.

***ganglbaueri*** SCHWARZ, 1897 (*Athous*)

Wien. ent. Ztg. 16, 133–134

♂, ♀ Syntypen, Kroat., Nanos, leg. GANGLBAUER.

DEI: 5 Syntypen, Nanos, 1894, leg. GANGLBAUER.

***geminatus*** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 329–330

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Kina-Balu.

***getschmanni*** CANDEZE, 1880 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 24, 297–298

Syntypen, Asturie.

DEI: 1 Syntypus, Asturie, 1879, leg. GETSCHMANN, in Coll. HEYDEN.

***gibberosus*** SCHWARZ, 1898 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 412–413

Syntypen; Gabon; Kamerun.

DEI: 2 Syntypen, Gabon.

***gibbosus*** SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 379–380

Syntypen, Nord-Queensland.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, N. Queensland, leg. WEISKE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 219; 1979) festgelegt.

***girardi*** GIRARD, 1971 (*Propsephus*)

Bull. I. F. A. N. 33 (Sér. A), 599–600, Fig. 42, 44

♂ Holotypus, Afrika, Côte d'Ivoire, Lamto, 20.–30. 3. 1969; 12 Paratypen, vom selben Fundort, 2. 1968–3. 1969; alle leg. GIRARD.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 9. 3. 1969.

***goyasiensis*** SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 317–318

Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

***goyaziensis*** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 116–117

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Brasilien, Jatahy Goyaz, im DEI.

***gracilentus*** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 306

♂ Syntypen, Salomo-Inseln, Tulagi, leg. BENNIGSEN.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Salomons-Insel, Tulagi, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 220; 1979) festgelegt.

***gracilipes*** SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)

Stett. ent. Ztg. 63, 282–283

♂, ♀ Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

***gracilis*** SCHWARZ, 1901 (*Adiaphorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 22–23

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Nalanda.

***grandiusculus*** SCHWARZ, 1906 (*Esthesopus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 147

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

***gratiosus*** FLEUTIAUX, 1925 (*Agriontes*)

Bull. Soc. ent. France 1925, 278, Fig. 1, 2

♂ Syntypen, Tonkin, Lac Thô und Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**gregarius** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 159

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

**gregarius** SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 334

Syntypen, Sumatra: Liangagas, Soekaranda, Indrapoera; leg. DOHRN & WEYERS.  
DEI: 9 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

**grisea** SCHWARZ, 1900 (*Adelocera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 98

Holotypus, Buchara, im DEI.

**griseofasciatus** SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 207—208

Syntypen, Borneo, Pontianak.  
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Pontianak, leg. HOLL.

**haemorrhoidalis** SCHWARZ, 1899 (*Campylolopsephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+69—70

♂♀ Syntypen, Usambara, leg. WEISE.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

**hamatus** SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 360—361

Syntypen, Madagaskar.  
DEI: 1 Syntypus, Madagaskar.

**hamatus** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 339

Syntypen, Rio Grande do Sul.  
DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

**hauseri** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 100

Syntypen; Sefir-kuh; Issyk-kul; Thian-schan; Kuldscha; oberer Ili; leg. HAUSER.  
DEI: 1 Syntypus, Sefir-Kuh, Kuschke; 1 Syntypus, Issyk-Kul, Ion Fluss; 1 Syntypus, Thian-S., Mussart.

**heydeni** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 85; Taf. 1, Fig. 1

♂♂ Syntypen, Kleinasien: Smyrna, Magnesia.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Smyrna; 1 Syntypus, Magnesia, in Coll. HEYDEN.

**heydeni** BUYSSON, 1915 (*Cardiophorus*)  
Misc. Ent. 23, 9

♀ Holotypus, Ussuri, Amur, leg. KOLTZE, in Coll. HEYDEN Nr. 35.

**heydeni** SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 365

Syntypen, Margellan, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Margelan, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

**hieroglyphicus** SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 269—270

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 2 Syntypen, Peru, Callanga.

**hilfi** REITTER, 1912 (*Athous*)  
Wien. ent. Ztg. 31, 317

♂♀ Syntypen, Bulgarien, Tschamkorija, leg. HILF.  
DEI: 1 Syntypus, Bulg. Tschamkorija, 25. 6. 1911, leg. HILF.

**hipponensis** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 111; Taf. 2, Fig. 44

♂♂ Syntypen, Algerien.  
DEI: 2 Syntypen, Algerien.

**hipponensis** DESBROCHERS, 1870 (*Cardiophorus*)  
Abeille 7, 102—103

Syntypen, Algerien, Bône, in Coll. DESBROCHERS.  
DEI: 1 Syntypus, Bône.

**hirsutulus** SCHWARZ, 1903 (*Crepidomenus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 392

Syntypen, Australien.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Australien, von NEBOISS festgelegt.

**holzzi** SCHWARZ, 1902 (*Ladius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 289

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bulghar Dagh, 3100 m, durch HOLTZ, im DEI.

**holzzi** SCHWARZ, 1896 (*Pseudagriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 104

Syntypen, Amasia, Gözna, 1000 m, leg. HOLTZ.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Taurus Cilic., Gözna, Amasia, 1000 m, 1895, leg. HOLTZ.

**horni** SCHWARZ, 1901 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 19–20

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Nalanda.

**horni** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 155; nom. nov. pro *lineatus* SCHWARZ, 1901,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 18–19

Syntypen, Ceylon: Matala, Kandy, Paradna, leg. HORN.

DEI: 3 Syntypen, Matala, 1899, leg. HORN; 2 Syntypen, Kandy, 1899, leg. HORN.

**horni** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 26–27

Syntypen, Ceylon, Horrovapotham, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Horrovapotham.

**humeralis** SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 219–220

Syntypen, Kamerun.

DEI: 3 Lectotypus, D. West Afrika (KRAATZ), von GIRARD festgelegt.

**humeralis** SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 150

Syntypen, Usambara.

DEI: 2 Syntypen, Usambara, Nguelo.

**ikuthaensis** SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 372

Syntypen, Afrika or., Ikutha, Luitpoldkette.

DEI: 1 Syntypus, Afr. or., Luitpoldkette; 1 Syntypus, Afr. or., Ikutha.

**illinitus** SCHWARZ, 1902 (*Crepidomenus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 293–295

♂♀ Syntypen, Neu Süd Wales, Richmond.

DEI: 3 Lectotypus, 1 Paralectotypus, N. S. W., Richmond, von NEBOISS festgelegt.

**immaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 115–116

♂♂ Syntypen, N.-Queensland.

DEI: 1 Syntypus, N. Queensland, leg. WEISKE.

**imperialis** SCHWARZ, 1901 (*Lucoreus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 302–304

♂♀ Syntypen, Madagascar, Andrahomana.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Andrahomana, leg. SIKORA.

**impressicollis** SCHWARZ, 1902 (*Dilobitarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 129

Syntypen, Peru, Chanchamayo.

DEI: ♀ Lectotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 203; 1979) festgelegt.

**impressicollis** SCHWARZ, 1899 (*Psephlus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 67+71–72

♀♀ Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, Victoria, von GIRARD festgelegt.

**impressifrons** SCHWARZ, 1909 (*Dorygonus*)  
Soc. ent. 24, 118

Syntypen, Madagascari, Mont. d'Ambre.

DEI: 1 Syntypus, Amber-Geb.

**impressiventris** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 102–103

♂♀ Syntypen, Asia minor.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Asia minor, durch VON HAYEK festgelegt.

*incertus* SCHWARZ, 1901 (*Parapomachilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 339—340

Syntypen, Brasilia.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilia.

*incognitus* SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 110; Taf. 2, Fig. 42

♂♂ Syntypen, Spanien, Arragonien.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Arragonien.

*incompta* KRAATZ, 1882 (*Adelocera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 319

Syntypen, Samarkand.  
DEI: 1 Syntypus, Samarkand, STDGR. 81.

*inconditus* SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)

siehe *mutatus* FLEUTIAUX, 1910.

*inconditus* SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 335—336

Syntypen, Brasilien, Minas Geraes.  
DEI: 1 Syntypus, Brasil; 1 Syntypus, Prv. Rio de Janeiro, Grz. m. Minas Geraes, leg. WIENGREEN.

*inconditus* SCHWARZ, 1902 (*Hemolimerus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 330

Syntypen; Sumatra, Tungi-Tebi; Borneo, Kina Balu.  
DEI: 1 Syntypus, Borneo; 1 Syntypus, Borneo, Kina Balu; 1 Syntypus, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

*indicus* SCHWARZ, 1902 (*Elater*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 247—248

Holotypus, Madras, Kodaikanal.  
DEI: Holotypus, Kodikanal.

*indistinctus* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 122—123

Syntypen, Brasilia, Padamo.  
DEI: 1 Syntypus, Padamo.

*inermis* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 101—102

Syntypen, Samarkand, Buchara, Taschkent.  
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Samarkand, leg. REITTER, durch VON HAYEK festgelegt.

*infernus* SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 65—66

Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.  
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo.

*inflatus* SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 135

Syntypen, Kamerun, leg. CONRAD, im DEI.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

*informis* SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 93—94; Taf. 1, Fig. 17

♂♂ Syntypen, ohne Fundortangaben.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Sartorius, 1870.

*informis* KRAATZ, 1879 (*Corymbites*)  
Berl. ent. Ztschr. 23, 287

Syntypen, Ala-Tau, Songarei.  
DEI: 1 Syntypus, Ala Tau, KRAATZ; 2 Syntypen, Songarei.

*inornatus* SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 147—148

Syntypen; Dar-es-Salaam; Tanga; Usambara.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Dar-es-Salaam; 1 ♀, Paralectotypus, Usambara; 1 ♀, Paralectotypus, Tanga; von GIRARD festgelegt.

*inguinalis* SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)  
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 64

♀ Holotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, untere Kulturzone, 4. 1906, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300 m, 5., leg. SJÖSTEDT.

*inscriptus* SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 353

Syntypen, Santos, Brasilien, leg. METZ.  
DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. METZ.

*intermedius* KRAATZ, 1898 (*Alaus*)siehe *rotundimaculatus* SCHWARZ.*intermedius* SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 63—64

♂♂ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 3 Syntypen, Brasilien.

*intermedius* SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)

Stett. ent. Ztg. 63, 199—200

Syntypen; Borneo, Kina Balu; Sumatra.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, N. Borneo; 1 Paralectotypus, Borneo, Kina Balu, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 170; 1973) festgelegt. 2 Syntypen, Borneo, Kina Balu, gehören nach VON HAYEK (l. c.) nicht zu *intermedius*.*intermedius* SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 70—71

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, St. Catharina.

*interruptus* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 120

Syntypen, Brasilia, St. Thomas.

DEI: 1 Syntypus, Brasil, St. Thoma.

*interruptus* SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 255—256

10 Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. Ambovombe.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*jocosus* CANDÉZE, 1881 (*Athous*)

Elateridae nouveaux 3, 90

Syntypen, Amur.

DEI: 1 Syntypus, Amur, I. Askold, in Coll. HEYDEN.

*juvenilis* SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)

Stett. ent. Ztg. 63, 244—245

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

*kankau* MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)

Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 206—207

Holotypus, Formosa, Kankau, 7. 1912, leg. SAUTER; Paratypen, Koshun, 7. 1926, leg. MIWA.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*koenigi* SCHWARZ, 1897 (*Athous*)

Wien. ent. Ztg. 16, 132—133

♂♂ Syntypen, Russisch Armenien, Kasikoporan, leg. KOENIG.

DEI: 2 Syntypen, Russisch Kurdist., Kasikoporan, leg. KÖNIG.

*kolbei* SCHWARZ, 1899 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 73

Syntypen, Usambara, Nguelo.

DEI: 2 Syntypen, Usambara, Nguelo.

*kraatzii* SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 35, 85; Taf. 1, Fig. 2

♂♂ Syntypen, Klein Asien.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Külek, ex Coll. KRAATZ; 1 Syntypus, Asia minor, Gülek, Taur. Cilic., ex Coll. SCHWARZ.

*kraatzii* SCHWARZ, 1892 (*Melanctus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 36, 155

♂♂ Syntypen, Griechenland, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Graec.

*krugi* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 125—126

2 Syntypen, Brasilien, Apiahy, leg. KRUG, im DEI.

*krugi* SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 78

Holotypus, Brasilien, Apiahy, leg. KRUG.

DEI: Holotypus, D. KRUG.

*lacer* SCHWARZ, 1900 (*Megapenthes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 91—92

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS.

*lacerosus* SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 113—114

♂♀ Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga.

*laesus* SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 304—305

Syntypen, Borneo, Kina Balu.  
DEI: 1 Syntypus, Kina Balu.

*lamellicornis* SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 140—141

Syntypen, Peru, Marcapata.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Marcapata.

*lamottei* GIRARD, 1971 (*Propsephus*)  
Bull. I. F. A. N. 33 (Sér. A), 610—612, Fig. 53, 54

♂ Holotypus, Afrika, Côte d'Ivoire, Lamto, 10.—25. 4. 1969; 5 Paratypen, vom selben Fundort., 10.—29. 2. 1968; alle leg. GIRARD.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*tangei* SCHWARZ, 1902 (*Semiotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 132—133

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

*langsdoerffi* STIERLIN, 1880 (*Athous*)  
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 590—591

♂♀ Syntypen, Riviera, leg. CLAIR.  
DEI: 4 Syntypen, Riviera.

*lateralis* SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 273—274

Syntypen, Celebes.  
DEI: 1 Syntypus, Celebes.

*lateralis* SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 381—382

Syntypen, Australien, leg. PLASON.  
DEI: 4 Syntypen, Australien.

*lateralis* SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
siehe *liturus* SCHENKLING, 1925

*lateralis* SCHWARZ, 1906 (*Parapomachilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 141—142

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, St. Catharina.

*lateralis* SCHWARZ, 1905 (*Penia*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 261—262

Syntypen, Himalaya.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Himalaya.

*laterarius* SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 231—232

♂♀ Syntypen, Ecuador, Baños.  
DEI: 4 Syntypen, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH.

*laterovittatus* SCHWARZ, 1901 (*Agonischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 37—38

Syntypen, Ceylon, Kandy, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Kandy.

*laterus* SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 55—56

Syntypen, Peru, Vilcanota.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Vilcanota.

*laticollis* SCHWARZ, 1902 (*Glypochilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 320—321

Holotypus, Australia merid., in Coll. SCHWARZ, im DEI.

*laticollis* SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+70

♀♀ Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Lolodorf; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun; von GIRARD festgelegt.

*taticornis* REITTER, 1900 (*Pleonomus*)  
Ent. Nachr. 26, 88–89

♂♀ Syntypen, Buchara, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Buchara, Karaták, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

*taticornis* SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 137–138

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

*latifasciatus* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 124

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.  
DEI: 5 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

*latiusculus* SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 344–345

Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

*latiusculus* SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
Di: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 60–61

Syntypus, Mern-Niederung, Ngare na nyuki, 11. 1905, leg. SJÖSTEDT; 5 Syntypen, Usambara, in Coll. SCHWARZ.  
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost Afrika, Ukarimi Berge, von GIRARD festgelegt.

*tatus* SCHWARZ, 1900 (*Anchastus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 150–151

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: ♀ Lectotypus, Dar-es-Salaam, von GIRARD festgelegt.

*tatus* SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 357

Holotypus, Queensland, im DEI.  
zahlreiche Syntypen, Queensland.  
DEI: 4 Syntypen, Queensland.

*leonhardi* REITTER, 1905 (*Athous*)  
Best. Tab. europ. Col. 56, 81

♂♂ Syntypen; Herzegovina, Vran-Planina; Matorac und Matorog (vielleicht identisch), im Mus. Sarajevo.  
DEI: 1 Syntypus, Herzegovina, Vran Planina, 6. 8. 1902, Coll. LEONHARD.

*lepidulus* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 121–122

Syntypen, Brasilia?  
DEI: 1 Syntypus, Patria?

*leponitus* SCHWARZ, 1900 (*Athous*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 106–107

Holotypus, Piemont, lepontische Alpen, Val di Cervo.  
DEI: Holotypus, V. di Cevo Str. 94.

*limbatus* SCHWARZ, 1909 (*Campylopsephus*)  
Soc. ent. 24, 117–118

♂♂ Syntypen, Kamerun, Barombi.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

*limbatus* SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 127–128

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

*linearis* SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 219

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

*linearis* SCHWARZ, 1903 (*Metabrax*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 395

Syntypen, Australien.  
DEI: ♂ Lectotypus, Austr., durch NEBOISS festgelegt.

*lineatocollis* SCHWARZ, 1898 (*Ludius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 410–411

♂♂ Syntypen, West-Afrika, Congo portug.  
DEI: ? Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Congo portug., leg. DONCKIER, von GIRARD festgelegt.

*lineatocollis* SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 153

♂♀ Syntypen, Brasilien?  
DEI: 3 Syntypen, ohne Fundortangaben.

*lineatus* SCHWARZ, 1902 (*Dicteniophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 308—309

♂ Holotypus (teste NEBOISS), Australien, N. Galles süd., im DEI.

*lineatus* SCHWARZ, 1901 (*Lacon*)

siehe *horni* SCHWARZ, 1902

*lineatus* SCHWARZ, 1903 (*Megapenthes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 367—368

Syntypen, D. O.-Afrika.  
DEI: 1 Syntypus, D. O.-Afrika.

*lineolus* SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 359

Syntypen, Kinshassa.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kinshassa, Waelbroeck, 24. 11. 1896, von GIRARD festgelegt.

*lituratus* SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 315

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

*liturus* SCHENKLING, 1925 (*Conoderus*)  
Coleopterorum Catalogus Pars 80, 115; nom. nov. pro *Monocrepidius lateralis* SCHWARZ, 1906,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 115—116

Syntypen, Brasilia, Jatahy-Goyaz.  
DEI: 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

*livida* FLEUTIAUX, 1907 (*Medonia*)  
Rev. Chil. Hist. Nat. 11, 185

Syntypen, Chile, Wald der warmen Quellen bei Chillan, leg. GERMAIN, im Mus. Santiago.  
DEI: 1 Syntypus, Chili, GERMAIN.

*lolodorfensis* HAYEK, 1973 (*Agrypnus*)  
Bull. Brit. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 177; nom. nov. pro *decoratus* SCHWARZ, 1898,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 131

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kaunerun, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 177; 1973) festgelegt.

*longicollis* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 134—135

♂♀ Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.  
DEI: 3 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

*longicollis* SCHWARZ, 1902 (*Eschatroxus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 325

Syntypen, Patria ?, wahrscheinlich von den Molukken oder Neu Guinea.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

*longicollis* SCHWARZ, 1905 (*Hemicleus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 277

Syntypen, Somali.  
DEI: 1 Syntypus, Galla, leg. v. ERLANGER.

*longicollis* SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 147—148

Syntypen, Peru, Marcapata.  
DEI: 4 Syntypen, Peru, Marcapata.

*longicornis* SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 318—319

Syntypen, Surinam.  
DEI: 2 Syntypen, Surinam.

*longicornis* SCHWARZ, 1906 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 137—138

Syntypen, Brasilien, São Paulo.  
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

♂ *longipennis* SCHWARZ, 1900 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 145—146

Syntypen, Usambara.  
DEI: 1 Syntypus, Usambara.

***longipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Cardiotarsus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 261–262

Syntypen, Hymalaya.  
DEI: 1 Syntypus, Hymalaya.

***longipennis*** SCHWARZ, 1898 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 130

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar.  
DEI: 2 Syntypen, Madagascar.

***longipennis*** SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 154

♀♀ Syntypen, Cuba.  
DEI: 1 Syntypus, Cuba, Busticua.

***longipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Silesis*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 347–348

Holotypus, Darjeeling.  
DEI: Holotypus, Darjeeling, 5., leg. FRUHSTORFER.

***luteipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Silesis*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 348–349

Syntypen, Pondicherry.  
DEI: 1 Syntypus, Pondicherry.

***luteipes*** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 349

Syntypen, Brasilien.  
DEI: 1 Syntypus, Brazil.

***luteus*** SCHWARZ, 1906 (*Horistonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 145–146

Syntypen, Mendoza.  
DEI: 5 Syntypen, Mendoza.

***macer*** SCHWARZ, 1905 (*Nomopleurus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 292

Syntypen, D. O. Afrika.  
DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost Afrika, von GIRARD festgelegt.

***maculatus*** SCHWARZ, 1905 (*Lobotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 280–281

Syntypen, Madagaskar, Diego-Suarez.  
DEI: 2 Syntypen, Diego-Suarez.

***maculatus*** SCHWARZ, 1909 (*Phedomenus*)  
Soc. ent. 24, 122

Syntypen, Madagaskar, Diego-Suarez.  
DEI: 1 Syntypus, Diego Suarez.

***maculatus*** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 62

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Regenwald, 2000–2500 m, 10. 1905, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 1 ♂, Paraclectotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 2000–3000 m, 11, 12. 1905–6, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

***maculicollis*** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 96; nom. nov. pro *vitticollis* SCHWARZ, 1903,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 64

Holotypus, Brasilien, im DEI.

***maculifrons*** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 331–332

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

***maculipennis*** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 350–351

Syntypen, Espírito Santo.  
DEI: 3 Syntypen, Espírito Santo.

***maculipennis*** SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 361–362

Syntypen, Madagaskar.  
DEI: 2 Syntypen, Madagaskar.

***maculipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 289–291

♂♀ Syntypen; China, Kwangtung; Tonkin.  
DEI: 3 Syntypen, Kwangtung.

**maculipennis** SCHWARZ, 1898 (*Lycorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 134–135

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

**malcheri** HELLER, 1935 (*Dioxypterus*)  
Arb. morph. Ent. 2, 265, Fig. 1

♂♀ Syntypen, Insel Santa Cruz, Vanikoro, im Mus. Dresden und im DEI  
DEI: 1 Syntypus, Vanikora, leg. MALCHER.

**margelanicus** HEYDEN, 1881 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 25, 325

Holotypus, Margelan.

DEI: Holotypus, Turkestan, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

**marginatus** (recte *marginalis*) SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 332–333

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 4 Syntypen, Peru, Callanga; 1 Syntypus, Peru.

**marginatus** SCHWARZ, 1907 (*Crepidomenus*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 83–85

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: Lectotypus, Victoria, von NEBOISS festgelegt.

**marginicollis** SCHWARZ, 1906 (*Aeroniopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 369

Syntypen, Australien.

DEI: Lectotypus, ohne Fundortangaben, von NEBOISS festgelegt.

**marginicollis** SCHWARZ, 1902 (*Anchastus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 252–253

Syntypen, Guayana.

DEI: 1 Syntypus, Guiana.

**marginicollis** SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 72

Syntypen, Ecuador, Papallacta.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Papallacta, leg. HAENSCH.

**marginipennis** SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 380–381

Syntypen, Süd-Australien.

DEI: 1 Syntypus, Victoria.

**marginipennis** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 321

Syn(typen, Key-Insel.

DEI: 1 Syntypus, Key-Ins.

**marmorata** SCHWARZ, 1905 (*Penia*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 262

Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

**medianus** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 120–121

Syntypen, Brasilia, São Paulo.

DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

**mediofasciatus** SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 67–68

Syntypen, Mexico, Durango.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Durango.

**mediofasciatus** SCHWARZ, 1906 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 152

Syntypen, São Paulo.

DEI: 2 Syntypen, S. Paulo.

**melanocephalus** SCHWARZ, 1902 (*Scmiotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 131

♀? Holotypus, Peru, Chanchamayo.

DEI: Der Holotypus ist wahrscheinlich verloren gegangen. Es befinden sich aber 4 Ex. aus Peru und Ecuador aus der Coll SCHWARZ in unserer Sammlung.

**melanoanthoides** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 300–301

2 ♂♂, Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

***melanurus*** FLEUTIAUX, 1925 (*Ayriotes*)  
Bull. Soc. ent. France 1925, 280, Fig. 3

Zahlreiche Syntypen, Lac Thô, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***melanurus*** SCHWARZ, 1902 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 134

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

***melanurus*** SCHWARZ, 1896 (*Aphanobius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 102

Syntypen, Himalaya.  
DEI: 1 Syntypus, Himalaya.

***melanurus*** FLEUTIAUX, 1907 (*Deromecus*)  
Rev. Chil. Hist. Nat. 11, 193

Syntypen, Chile, Wald der warmen Quellen, leg. GERMAIN, im Mus. Santiago.  
DEI: 1 Syntypus, Chili, leg. GERMAIN.

***melanurus*** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilioides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 346–347

Syntypen, Peru.  
DEI: 1 Syntypus, Peru.

***mellifluus*** COSTA, 1972 (*Pyrophorus*)  
Papeis Arullos Zool. S. Paulo 25, 200, 211–213, Fig. 1, 1a, 17, 24

♂ Holotypus, Haiti, Diquini, leg. MANN, im Mus. Cambridge; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 3 Paratypen, Haiti; 4 Paratypen, Cuba, Holguin; 1 Paratypus, Cuba, KLGR.; 3 Paratypen, S. Domingo; 1 Paratypus, Brasilien, Germania; 2 Paratypen, Brasilien.

***mesosternalis*** SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 222

♂ Syntypen, Njam-Njam.  
DEI: ♂ Lectotypus, Njam-Njam, von GIRARD festgelegt.

***miliaris*** SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)  
Arkiv Zoologi 1, 50–51

2 Syntypen, Fernando Po, Sa. Isabel, 1 Ex., leg. SJÖSTEDT, 1 Ex., durch MOSER.  
DEI: ♂ Lectotypus, Fernando Po, Sa. Isabel, 17. 3. 1900, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

***minor*** SCHWARZ, 1904 (*Grammophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 72

♂ Syntypen, Chile.  
DEI: 1 Syntypus, Chile.

***minor*** SCHWARZ, 1906 (*Heterocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 100

Syntypen, Brasilia, Rio Grande do Sul.  
DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

***minor*** SCHWARZ, 1902 (*Sephilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 319

1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, im Mus. Brüssel-WEYERS; 1 Syntypus, Banguey, in Coll. SCHWARZ.  
DEI: 1 Syntypus, Banguey, Ins. nördl. Borneo, leg. KEDENBURG.

***minusculus*** SCHWARZ, 1904 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 80

Syntypen, Chile.  
DEI: 1 Syntypus, Chile.

***minusculus*** SCHWARZ, 1900 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 90–91

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

***minusculus*** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 61

1♂ Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Obstgartensteppe-Kulturzone, 9.–11. 1905, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 2 Paractotypen, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300–1900 m, 15. 11. 1905–6, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

***minutissimus*** SCHWARZ, 1898 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 150–151

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kamerun.

***minutus*** SCHWARZ, 1902 (*Anchastomorphus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 254–255

Syntypen, Mexico, Motzerongo.  
DEI: 2 Syntypen, Motzerongo.

**minutus** SCHWARZ, 1903 (*Hapatesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 395–396

Syntypen, Australien.  
DEI: 1 Syntypus, Australien; 1 Syntypus, S. Australien.

**minutus** SCHWARZ, 1903 (*Hemicleucus*)

siehe *Adelocera tanganicus* HAYEK, 1973

**minutus** SCHWARZ, 1898 (*Lobolargus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 133–134

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**minutus** SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 336–337

♂♀ Syntypen, Sumatra, Soekaranda.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

**minutus** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 388–389

Syntypen, Australien.  
DEI: 2 Syntypen, Austral.

**minutus** SCHWARZ, 1908 (*Olophocetus*)  
Soc. ent. 23, 110

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt. 1 ♀, Syntypus, Kamerun, nach GIRARD „*minutus* ???“.

**miser** SCHWARZ, 1903 (*Lobolarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 281

Syntypen, Gabun.  
DEI: 1 Syntypus, Gabon.

**modestus** SCHWARZ, 1906 (*Heterocepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 99–100

Syntypen, Brasilia.  
DEI: 2 Syntypen, Rio Gr. d. Sul.

**modestus** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+70–71

♂♂ Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun; 1 Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

**monilicornis** SCHWARZ, 1897 (*Athous*)  
Wien. ent. Ztg. 16, 134–135

Syntypen, Balkan, Bulgarien.  
DEI: 5 Syntypen, Balkan.

**monticola** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 28

Syntypen, Ceylon, Bandarawella, 4000 Fuß, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Bandarawella.

**moseri** SCHWARZ, 1903 (*Agrypnus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 357

2 Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika.  
DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, Lukuled ?, von GIRARD festgelegt.

**moseri** SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 125

♀♀ Syntypen, Australia mer., Victoria.  
DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

**moseri** SCHWARZ, 1902 (*Physorrhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 146

Holotypus, Peru, Rio Toro, im DEI.

**multimaculatus** SCHWARZ, 1898 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 189–190

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.  
DEI: 1 Syntypus, Usambara; 2 Syntypen, Usambara, Nguela.

**multimaculatus** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 75–76

♂♀ Syntypen, Sao Paulo.  
DEI: 4 Syntypen, S. Paulo.

*murinus* REITTER, 1895 (*Hypnoidus*)

Ent. Nachr. 21, 91

Syntypen; Lenkoran am Caspischen Meer; Araxesthal bei Ordubad.  
DEI: 1 Syntypus, Lenkoran, leg. LEDER, in Coll. HEYDEN.

*mutabilis* SCHWARZ, 1898 (*Agonischius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 153–154

Syntypen, Assam.  
DEI: 6 Syntypen, Assam.

*mutabilis* SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 51–52

2 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Süd-Amerika.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

*mutatus* FLEUTIAUX, 1919 (*Cardiophorus*)

Voy. ALLUAUD & JEANNEL Afrique Orientale Col. 13, 96; nom. nov. pro *inconditus* SCHWARZ, 1908, In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 63–64

8 ♂♂, Syntypen, Meru, Ngare na nyuki, 11. 1905, 1. 1906, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: Meru Niederung, Ngare na nyuki, leg. SJÖSTEDT, 1 Syntypus, 29. 11. 1905, 2 Syntypen, 1. 1906.

*mutatus* FLEUTIAUX, 1919 (*Psephus*)

Voy. ALLUAUD & JEANNEL Afrique Orientale Col. 13, 47; nom. nov. pro *rufipennis* SCHWARZ, 1908. In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 59–60

Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Obstgartensteppe, 22. 3. 1906, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 1 Paralectotypus, Kilimandj., Kibonoto, Kulturm., 1. 3., leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

*natalensis* SCHWARZ, 1907 (*Beliophorus*)

In: WYTSMA, Gen. Ins. 46, 247 nota; Taf. 6, Fig. 3

Syntypen, Natal.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Natal, von GIRARD festgelegt.

*nebulosus* SCHWARZ, 1905 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 278

Syntypen, Madagaskar, Cap d'Ambre.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Cap d'Ambre, ex Coll. F. SCHNEIDER.

*niger* SCHWARZ, 1897 (*Elathous*)

Wien. ent. Ztg. 16, 130–131

Syntypen, Griechenland, Parnass.  
DEI: 1 Syntypus, Parnass.

*niger* SCHWARZ, 1901 (*Deromecus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 329–330

Syntypen, Süd-Chile, Osorno.  
DEI: 1 Syntypus, Süd-Chile, Osorno.

*niger* SCHWARZ, 1905 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 258–259

Syntypen, Darjeeling.  
DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Darjeeling, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 190; 1973) festgelegt.

*niger* SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 324–325

Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEXERS, im Mus. Brüssel.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

*niger* SCHWARZ, 1900 (*Melanthoides*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 146

Syntypen, Deutsch-Ostafrika.  
DEI: 4 Syntypen, D. O. Afrika.

*niger* SCHWARZ, 1905 (*Odontonychus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 281–282

Syntypen, Kamerun, Lolodorf.  
DEI: 1 Syntypus, Lolodorf.

*niger* SCHWARZ, 1902 (*Pericus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 306–307

Syntypen, Rangoon.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Rangoon, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 41; 1973) festgelegt.

*niger* SCHWARZ, 1898 (*Phedomenus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 143–144

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: 1 Syntypus, Kamerun.

**niger** SCHWARZ, 1902 (*Spheniscosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 276—277

♀ Syntypen, Java.  
DEI: 2 Syntypen, Java.

**nigerimus** SCHWARZ, 1901 (*Atractosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 312—313

Syntypen, Mexico, Colonia.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Colonia; 1 Syntypus, Colonia 16.

**nigerimus** SCHWARZ, 1902 (*Cosmesus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 297—298

♂ Syntypen, Ecuador, Santa Inéz und Baños.  
DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH; 1 Syntypus, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH.

**nigra** SCHWARZ, 1905 (*Penia*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 263

Syntypen, Darjeeling.  
DEI: 1 Syntypus, Darjeeling.

**nigriceps** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 130—131

Syntypen, Bolivien, La Paz.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, La Paz.

**nigriceps** SCHWARZ, 1900 (*Diploconus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 95—96

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra; 2 Syntypen, N. O. Sumatra.

**nigriceps** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 142—143

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, St. Catharina.

**nigricollis** SCHWARZ, 1901 (*Cremonostethus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 197—198

♀ Holotypus, Assam, im DEI.

**nigricollis** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 265—266

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga.

**nigricollis** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 109—110

Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.  
DEI: ♂ Lectotypus, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

**nigricornis** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 384—385

Syntypen, Australien.  
DEI: 1 Syntypus, Austr.

**nigricornis** SCHWARZ, 1902 (*Sphaenelater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 365—366

Holotypus, Neu Seeland, im DEI.

**nigrifrons** SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 272—273

Holotypus, Insel Gardener bei Neu-Mecklenburg, im DEI.

**nigrifrons** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 246—247

Syntypen, Madagaskar.  
DEI: 4 Syntypen, Madagaskar, leg. SIKORA.

**nigrifrons** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 75—76

Syntypen, Australien, Victoria occ., 1 Ex., durch PLASON, mehrere durch ROLLE.  
DEI: 1 Syntypus, Victoria occ.; 2 Syntypen, Austr. occ.

**nigrifrons** SCHWARZ, 1909 (*Rhincopsephus*)  
Soc. ent. 24, 118

Syntypen, Central-Afrika.  
DEI: Lectotypus, Central-Afrika, von GIRARD festgelegt.

**nigripennis** SCHWARZ, 1906 (*Asaphoides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 366–367

♂♀ Syntypen, N. S. Wales.

DEI: ♀ Lectotypus, 4 Paralectotypen, N. S. W., von NEBOISS festgelegt.

**nigripennis** SCHWARZ, 1901 (*Ctenoplus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 356

Syntypen, N. Borneo.

DEI: 2 Syntypen, Borneo.

**nigritarsis** SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 331–332

Syntypen, Java, Preanger.

DEI: 1 Syntypus, Java, Preanger, 4–6000 Fuß, leg. WARBURG.

**nigriventris** SCHWARZ, 1902 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 105–106

Syntypen, Bolivia, La Paz.

DEI: 1 Syntypus, Bolivia, La-Paz.

**nigrofasciatus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 233–234

Syntypen, Surinam.

DEI: 2 Syntypen, Surinam.

**nigrofasciatus** SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 146–147

Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

**nigrolateralis** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 324–325

♂? Syntypen, N. Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Borneo; 9 Syntypen, Kina-Balu.

**nigrolaterus** SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 55

Syntypen, Venezuela.

DEI: 2 Syntypen, Venezuela.

**nigrolaterus** SCHWARZ, 1901 (*Metriaulacus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 198–199

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Borneo.

**nigrolaterus** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 385–386

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Austr.

**nigrolimbatus** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 140–141

Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: ♀ Lectotypus, Dar-es-Salaam, von GIRARD festgelegt.

**nigrolineatus** SCHWARZ, 1901 (*Semiotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 306

2 Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.–11. 1897; 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

**nigromaculatus** SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 285–286

Syntypen, Togo, Congo Franç., Benito.

DEI: 1 Syntypus, Togo; 1 ♀, Syntypus, Congo Franç., Benito.

**nigromarginatus** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+68–69

♂♂ Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

DEI: ♂ Lectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

**nigropilosus** SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 288–289

♂♂ Syntypen, Caucasus.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus.

**nigrovittatus** SCHWARZ, 1902 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 137

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

***nitidicollis*** SCHWARZ, 1901 (*Diploconus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 341—342

Holotypus, Ost-Celebes, Tombugu.  
DEI: Holotypus, Ost-Celebes, Tombugu, 1885, leg. KÜHN.

***nitidicollis*** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 387—388

Syntypen; Neu-Süd-Wales; Victoria, Melbourne.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, New-South-Wales, leg. SCHRADER; 2 Syntypen, N. S. Wales; 3 Syntypen, Australia, Victoria; 1 ♀, Syntypus, Melb.

***nitidipennis*** SCHWARZ, 1901 (*Ctenoplus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 355

Syntypen, Borneo, Kina Balu.  
DEI: 1 Syntypus, Kina Balu.

***nitidissimus*** SCHWARZ, 1905 (*Cardiotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 290—291

Syntypen, Madagaskar, Diego Suarez.  
DEI: 2 Syntypen, Diego Suarez.

***nitidus*** SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 274—275

Syntypen; Nusa; Nordspitze von Neu Mecklenburg; Neu Pommern.  
DEI: 2 Syntypen, Insel Nusa; 1 Syntypus, Neu Pommern, leg. RIBBE; 1 Syntypus, Herbertshöhe.

***oberndorfferi*** SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 66—67

Holotypus, Argentinien, im DEI.

***oberndorfferi*** SCHWARZ, 1903 (*Elathous*)  
Wien. ent. Ztg. 22, 207

♀♂ Syntypen, N. Amerika, N.Y., Buffalo.  
DEI: ♀ Lectotypus, N.Y., Buffalo, von BECKER (Can. Ent. 43, 166—167; 1961) festgelegt.

***oberndorfferi*** SCHWARZ, 1902 (*Pericus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 202—203

Syntypen, Madras.  
DEI: ♂ Lectotypus, Madras, durch von HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 42; 1973) festgelegt.

***obliquemaculatus*** SCHWARZ, 1905 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 290

Syntypen, Weenen, Natal.  
DEI: 1 Syntypus, Weenen, Natal.

***oblongicollis*** FLEUTIAUX, 1931 (*Cardiophorus*)  
Bull. Soc. zool. Fr. 56, 313, Fig. 2

Syntypen, Tonkin, Lac-Thô, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***obscuripes*** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 160

Syntypen, Tanga.  
DEI: 1 Syntypus, Tanga.

***obscurus*** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 64—65

Syntypen, Paraguay.  
DEI: 1 Syntypus, Paraguay.

***octomaculatus*** SCHWARZ, 1898 (*Megapenthes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 144—145

Syntypen, Assam.  
DEI: 1 Syntypus, Assam.

***oertzeni*** SCHWARZ, 1902 (*Atractosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 226—227

♀♂ Syntypen, Ecuador, Santa Inéz.  
DEI: 4 Syntypen, Ecuador, Santa Inéz., leg. HAENSCH.

***oertzeni*** SCHWARZ, 1897 (*Silesis*)  
Wien. ent. Ztg. 16, 136

Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.  
DEI: 2 Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

***opaculus*** SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 321—322

Syntypen, West-Australien, Swan-River, im Mus. Hamburg.  
DEI: 1 Syntypus, Swanriver, Alte Sammlung.

**opaculus** SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 148

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Lolodorf, von GIRARD festgelegt.

**opacus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 143–144

♂♀ Syntypen, Ecuador, Balzapamba.  
DEI: 2 Syntypen, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

**orbiculatus** SCHWARZ, 1902 (*Lycoreus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 314

♂♀ Syntypen, Madagaskar, Plateau d l'Androy, Reg. d'Ambovombe.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**ovatus** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 87

♂♂ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.  
DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**pachyderoides** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 251–252

Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika.  
DEI: 1 Syntypus, D. Ost-Afrika.

**parallelus** SCHWARZ, 1901 (*Adiaphorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 22

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Weligama.

**parallelus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 238

Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

**parallelus** SCHWARZ, 1906 (*Chalcolepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 98–99

Syntypen, Arizona.  
DEI: 2 Syntypen, Arizona.

**parallelus** SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 218

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**parallelus** SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)

siehe *schwarzii* BECKER, 1961

**parallelus** SCHWARZ, 1902 (*Tetralobus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 315

Syntypen, Nossi-Bé.  
DEI: 1 Syntypus, Nossi-Bé, leg. FREY.

**parcus** SCHWARZ, 1903 (*Tilotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 358–359

Syntypen, Madagaskar.  
DEI: 4 Syntypen, Madagaskar.

**parvicollis** SCHWARZ, 1902 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 150–151

Syntypen, Peru, Marcapata.  
DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata.

**parvulus** SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 68

Syntypen, Cayenne.  
DEI: 1 Syntypus, Cayenne.

**parvulus** FLEUTIAUX, 1903 (*Cryptohypnus*)  
Ann. Soc. ent. France 71 (1902), 575

Syntypen, Annam oder Tonkin.  
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Tho, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.

**parvulus** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 77–78

♂♂ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.  
DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**parvus** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 389—390

Syntypen, Australien.  
DEI: 1 Syntypus, Austr.

**patruus** HEYDEN, 1884 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 28, 294

Holotypus, Vladivostok, Coll. KOLTZE, im DEI, in Coll. HEYDEN. Ein weiteres Exemplar in Coll. KOLTZE.

**pauper** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 76—77

Syntypen, Fidji-Inseln.  
DEI: 1 Syntypus, Ins. Fiji.

**pauxillus** SCHWARZ, 1901 (*Hypnooides*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 31

Syntypen, Ceylon, Bandarawella, leg. HORN.  
DEI: 6 Syntypen, Bandarawella.

**pectinicornis** SCHWARZ, 1908 (*Alaus*)  
Soc. ent. 23, 101—102

2 ♂♂, Syntypen, Kamerun, Old Calabar.  
DEI: 2 Syntypen, Kamerun, Old Calabar.

**pectinicornis** SCHWARZ, 1909 (*Aphanobius*)  
Soc. ent. 24, 131

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.  
DEI: 1 Syntypus, Amber Geb.

**pectinicornis** GIRARD, 1980 (*Propsephus*)  
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 16, 216—217, Fig. 23

♂ Holotypus, Tanzanie, Usambara, Neu Bethel, 7. 10. 1903, im Mus. Berlin; 5 ♂♂, Paratypen, vom selben Fundort und 10. 1904; Dar-es-salam, Coll. SCHWARZ; im Mus. Berlin, im DEI, in Coll. GIRARD und im Mus. Paris.  
DEI: 1 Paratypus, Daressal.

**pectoralis** SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 90

Syntypen, Dar-es-Salaam, leg. BENNIGSEN.  
DEI: ♀ Lectotypus, Usaramo, Coll. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

**pedestris** SCHWARZ, 1904 (*Atractoscmus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 60—61

Syntypen, Brasilien, Espírito Santo.  
DEI: 1 Syntypus, Espírito Santo; 2 Syntypen, Brasil.

**pellitus** SCHWARZ, 1892 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 36, 383—384

Syntypen; Turkmenien, leg. REITTER; Turkestan, leg. STAUDINGER.  
DEI: ♀ Lectotypus, Turkmenien, REITTER, LIEDER, durch VON HAYEK festgelegt.

**pellitus** SCHWARZ, 1898 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 151—152

Syntypen, Borneo mer.-orient.  
DEI: 1 Syntypus, Sd. Ost-Borneo.

**pellitus** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 383—384

♂ Syntypen, Nord-Queensland.  
DEI: 2 Syntypen, N. Queensland, leg. WEISKE.

**permucronatus** SCHWARZ, 1902 (*Agrypnus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 194

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.  
DEI: Lectotypus, Borneo, Kina-Balu; 1 Paralectotypus, Borneo; durch VON HAYEK festgelegt.

**perterminatus** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 74

Syntypen, Brasilien, Lages.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Lages, 1.—3. 1887, leg. FRUHSTORFER.

**peruanus** SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 314—315

Syntypen, Peru, Callanga.  
DEI: 7 Syntypen, Peru, Callanga.

**picescens** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 71

Syntypen, Australia merid.  
DEI: 2 Syntypen, Australien merid.

**piceus** SCHWARZ, 1906 (*Horistonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 146–147

2 Syntypen, Argentinien, Buenos-Aires, leg. BRUCH.  
DEI: Argentina, Prov. Buenos Aires, leg. BRUCH, 1 Syntypus, 12. 1. 1898, 1 Syntypus, 19. 3. 1903.

**piceus** SCHWARZ, 1902 (*Pyrophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 285–287

Syntypen, Ecuador, Santa-Inéz.  
DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH.

**pictilis** SCHWARZ, 1899 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 76–77

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost Afrika, leg. v. BENNIGSEN; 2 ♂♂, Paralectotypen, Ost Afrika; durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 231; 1979) festgelegt.

**pictipennis** SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 333–334

Syntypen, Pondicherry.  
DEI: 4 Syntypen, Pondicherry.

**pictipennis** SCHWARZ, 1906 (*Hypnoidus*)  
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 156; Taf. 5, Fig. 10; nom. nov. pro *variegatus* SCHWARZ, 1902,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 253

Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.  
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**plagiatus** SCHWARZ, 1906 (*Cylindroderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 157–158

Syntypen, Bolivia, La-Paz.  
DEI: 2 Syntypen, Bolivia, La Paz.

**plagiellus** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 326

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.  
DEI: 4 Syntypen, Kina Balu.

**planatus** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 326; nom. nov. pro *depressus* SCHWARZ, 1902, l. c. 1902, 359–360

Syntypen, Neu-Seeland.  
DEI: 1 Syntypus, Neu-Seeland.

**plasoni** SCHWARZ, 1903 (*Metabrax*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 393–394

Syntypen, Australien.  
DEI: 1 Syntypus, Australien.

**plasoni** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 361–362

Syntypen, Australia merid.  
DEI: 4 Syntypen, Australia. merid.

**plumbeus** SCHWARZ, 1902 (*Arrhaphes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 257–258

Syntypen; Sumatra, Soekaranda, Liangagas, leg. DOHRN; Indrapoera, leg. WEYERS.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN; 3 Syntypen, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN; 3 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

**pogonodes** NEBOISS, 1967 (*Austrocala*)  
Proc. R. Soc. Vict. 80, 283–284, Fig. 41–46; Taf. 46, Fig. 22

♀ Holotypus, Coen, Q'ld., ex. Coll. WILSON, im Mus. Melbourne; Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER.

**polygrammus** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 78–79

Holotypus, Brasilien, Apiahy, im DEI.

**posticinus** SCHWARZ, 1906 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 151

Holotypus, Brasilien, San Leopoldo, im DEI.

**praeclarus** SCHWARZ, 1906 (*Esthesopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 148–149

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.  
DEI: 6 Syntypen, Jatahy-Goyaz.

**praetermissus** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 87; Taf. 1, Fig. 6

♂♂ Syntypen, Syrien, Beirut.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Beirut, 1. 1878, APPL.

**principatus** SCHWARZ, 1905 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 259

Syntypen, Ceylon, Kandy.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kandy, durch von HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 233; 1979) festgelegt.

**prominenſ** SCHWARZ, 1896 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 97

Syntypen, Brasilia?  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

**propinquus** SCHWARZ, 1898 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 412

Syntypen; Deutsch-Ost-Afrika; Zanzibar; Kamerun; Gabon und Benguela.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost-Afrika, leg. V. BENNIGSEN; 1 ♂, Paralectotypus, Mpuapua; von GIRARD festgelegt.

**prosternalis** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)  
Soc. ent. 23, 114

Syntypen, Njam-Njam.  
DEI: ♂ Lectotypus, Njam-Njam, von GIRARD festgelegt.

**pseudoscalaris** SCHWARZ, 1896 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 98

Syntypen, Paraguay.  
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

**pubescens** SCHWARZ, 1902 (*Campsosternus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 318—319

Syntypen; Malacca; Borneo.  
DEI: 1 Syntypus, Malakka; 1 Syntypus, Borneo.

**puerilis** SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 318—319

Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.  
DEI: 3 Paralectotypen, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

**pulchellus** SCHWARZ, 1905 (*Elasmosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 274—275

Syntypen, Togo.  
DEI: ♀ Lectotypus, Togo, leg. RAFFRAY, von GIRARD festgelegt.

**pulcher** SCHWARZ, 1905 (*Elasmosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 275—276

Syntypen, Kamerun, Balanga.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Balanga, von GIRARD festgelegt.

**pulcher** SCHWARZ, 1906 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 138—139

Syntypen, Brasilien, São Paulo.  
DEI: 4 Syntypen, São Paulo.

**pulchratis** SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 72—73

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, St. Catharina, LÜDERWALDT.

**pullus** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 336—337

Syntypen, Ecuador, Cachabé, leg. ROSENBERG.  
DEI: 4 Syntypen, Cachabé, 1. 1897, leg. ROSENBERG.

**punctatissimus** SCHWARZ, 1904 (*Anoplischilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 54

Syntypen, Brasilien, B. Retiro.  
DEI: 1 Syntypus, B. Retiro.

**punctatostriatus** SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 365—366

4 ♂♂, Syntypen, Syrien, in Coll. SCHWARZ.  
DEI: 3 ♂♂, Syntypen, ohne Fundortangabe (wohl Syrien).

**punctatus** SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 271—272

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.  
DEI: 3 Syntypen, Kina-Balu.

**punctatus** SCHWARZ, 1893 (*Elater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 37, 192

Mehrere Syntypen, Hoch-Armenien.  
DEI: 2 historische Exemplare, vielleicht Typen, ohne Fundortangaben.

***purpureus lederi*** HEYDEN, 1877 (*Corymbites*)

Verh. Naturf. Ver. Brünn 16, 204

1 ♀, Syntypus, Elisabetpol, Caucasus; 1 ♀, Syntypus, Taurus, leg. HABERHAUER, in Coll. HEYDEN; 1 ♂, Syntypus, Ungarn, durch SPENTZ.

DEI: 1 Syntypus, Taurus, leg. HABERHAUER; 1 Syntypus, Hung., STZ.; in Coll. HEYDEN.

***purpureus*** SCHWARZ, 1899 (*Pantolamprus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 78–79

2 Syntypen (davon 1 nur mit einer Flügeldecke), Deutsch-Ost-Afrika.

DEI: ? Lectotypus, D. O. Afrika, von GIRARD festgelegt.

***pusillus*** SCHWARZ, 1898 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 186–187

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 3 ♀, Paralectotypen, Usambara, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 50; 1973) festgelegt.

***pusillus*** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 337–338

Syntypen, Ecuador, Cachabé, leg. ROSENBERG.

DEI: 4 Syntypen, Cachabé, 1. 1897, leg. ROSENBERG.

***pustulatus*** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 126

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

***quadraticollis*** SCHWARZ, 1903 (*Crepidomenus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 392–393

Syntypen, Australien.

DEI: Lectotypus, Australien, von NEBOISS festgelegt.

***quadraticollis*** SCHWARZ, 1906 (*Psephus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 353

Syntypen, Australien merid.

DEI: 1 Syntypus, Austr. mer.

***quadriguttatus*** SCHWARZ, 1898 (*Hemirraphus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 148

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun.

***quadrilineatus*** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)

Stett. ent. Ztg. 63, 249–250

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 3 Syntypen, Kina Balu.

***quadrilineatus*** SCHWARZ, 1901 (*Psiloniscus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 328–329

Syntypen, Mexico, Durango (Colonia).

DEI: 1 Syntypus, Colonia 16.

***quadrinaculatus*** FLEUTIAUX, 1933 (*Melanotus*)

Ann. Soc. ent. France 102, 230

Syntypen, Tonkin, Hoa-Binh, Lac-Thô, leg. DR COOMAN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***quadrinaculatus*** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 334–335

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***quadrinotatus*** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)

Soc. ent. 23, 73

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

***quadripicturatus*** SCHWARZ, 1891 (*Lacon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 35, 151

Holotypus, Madagascar, im DEI.

***quadristrigatus*** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 156–157

Syntypen, Afrika, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 1 Syntypus, Tanga.

***quadrivittatus*** CANDÈZE, 1896 (*Alaus*)

Elaterides nouveaux 6, 14–15

Syntypen, Molukken, Bangkey, in Coll. SCHWARZ.

DEI: 1 Syntypus, Bangkel, 1885, leg. KÜHN.

**raffrayi** SCHWARZ, 1896 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 92—93

Syntypen; Dar-es-Salaam; Tanga, leg. BENNIGSEN.

DEI: Lectotypus, 7 Paralectotypen, Dar-es-Salaam; 2 Paralectotypen, Tanga, Coll. BENNIGSEN; durch VON HAYEK festgelegt.

**rectangularis** SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 311—312

♀ Syntypen, Insel Larat (Tenimber Inseln).

DEI: 1 Syntypus, Larat-Ins. (Tenimber Inseln).

**rectangulus** SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 378—379

Syntypen, Deutsch Neu-Guinea.

DEI: ♀ Lectotypus, D. N. Guinea, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 234; 1979) festgelegt.

**recticollis** SCHWARZ, 1903 (*Tetralobus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 363

♂ Syntypen, Franz. Congo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Congo Français; 1 ♀, Paralectotypus, Congo Français, Donetzia ?, von GIRARD festgelegt.

**reitteri** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 101; Taf. 1, Fig. 28

♂♂ Syntypen, West-Caucasus.

DEI: 1 Syntypus, Cauc., leg. ROST.

**reitteri** SCHWARZ, 1891 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 151—152

♂♂, Syntypen, Syrien.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Syrien, Haifa, leg. REITTER (ohne Aedeagus).

**restinctus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 229—230

Syntypen, Guatemala.

DEI: 1 Syntypus, Guatemala, leg. PEHLKE.

**robustus** STIERLIN, 1863 (*Athous*)  
Mitt. Schweiz. ent. Ges. I Heft 4, 91—92

♂♂, 1 ♀, Syntypen, Sicilien, Coll. STIERLIN.

DEI: 2 Syntypen, Sicilia, Coll. STIERLIN.

**robustus** SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 349—350

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

**robustus** SCHWARZ, 1902 (*Dicteioniophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 307—308

♀ Holotypus, Australien, Neu-Süd-Wales, im DEI.

**robustus** SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 377

Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Simbang.

DEI: ♀ Lectotypus, D. N. Guinea, Simbang, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 234; 1979) festgelegt.

**rosti** SCHWARZ, 1897 (*Anchastus*)  
Wien. ent. Ztg. 16, 128—129

♂ Syntypen, Kaukasus occ., leg. ROST.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus.

**rosti** SCHWARZ, 1897 (*Athous*)  
Wien. ent. Ztg. 16, 131—132

♂ Syntypen, Circassien, leg. ROST.

DEI: 1 Syntypus, Circassia, leg. ROST.

**rotundicollis** SCHWARZ, 1901 (*Amychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 196

Holotypus, Chatam Inseln, im DEI.

**rotundifrons** SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 346—347

Syntypen, Pondicherry.

DEI: 1 Syntypus, Pondicherry.

**rotundimaculatus** SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 284; nom. nov. pro *intermedius* KRAATZ, l. c. 1898, 414; 1898

5 Syntypen, Togo, in Coll. KRAATZ (Typenserie von *intermedius* KRAATZ). Syntypen, Dahomey, Kamerun, Togo (Typenserie von *rotundimaculatus* SCHWARZ).

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Togo, leg. CONRADT; 1 ♀, Paralectotypus, Dahomey; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

***rubida*** SCHWARZ, 1902 (*Adelocera*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 195

Syntypen, Insula Mona.  
DEI: 1 Syntypus, Ins. Mona, leg. BOCK.

***rubiginosus*** SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 107

♂♂ Syntypen, Argentina, Cordoba.  
DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Cordoba, leg. FRENZEL.

***rubripennis*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 322

Syntypen, N. Borneo.  
DEI: 1 Syntypus, N. Borneo; 2 Syntypen, Kina-Balu.

***rubripennis*** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 136

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

***rubripennis*** SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)

siehe *mutatus* FLEUTIAUX, 1919

***rubripennis*** SCHWARZ, 1901 (*Stenopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 309–310

4 Syntypen, Süd-Amerika, Caucathal.  
DEI: 3 Syntypen, S. Amerika, Caucathal.

***rufangulus*** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 303–304

Syntypen, Nord-Borneo, Kina Balu.  
DEI: 2 Syntypen, N. Borneo; 5 Syntypen, Kina Balu.

***rufescens*** SCHWARZ, 1901 (*Sphenomerus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 20–21

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Nalanda.

***ruficollis*** SCHWARZ, 1900 (*Agonischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 96

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULPHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra; 1 Syntypus, Sumatra.

***ruficollis*** SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 64–65

♂♂ Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.  
DEI: 2 Syntypen, Espirito Santo.

***ruficollis*** SCHWARZ, 1901 (*Diploconus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 343–344

Syntypen, Neu Guinea.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Neu Guinea.

***ruficollis*** SCHWARZ, 1902 (*Elater*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 323–324

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.  
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

***ruficollis*** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 121

3 Syntypen, Australia mer., Victoria, 2 Ex., leg. DONCKIER, 1 Ex., leg. MOSER.  
DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria; 1 Syntypus, Australia, leg. DONCKIER.

***rufitornis*** SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 114–115

Syntypen, Mendoza.  
DEI: 1 Syntypus, Mendoza.

***rufipennis*** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 144–145

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

***rufipennis*** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 80; als var. zu *discolor* SCHWARZ beschrieben

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Ostafrika, von GIRARD festgelegt. Ein weiteres Tier [Bradshaw, Zambesi, 1878], von GIRARD als Paralectotypus ausgezeichnet, kann nicht zu der Typenserie gehören, da der Fundort nicht in der Originalbeschreibung erwähnt wird.

**rufipes** SCHWARZ, 1903 (*Crepidomenus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 391

Syntypen, Australien.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Australien, von NEBOISS festgelegt.

**rufipes** SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 351—352

Syntypen, Tonga-talbu, im Mus. GODEFFROY.  
DEI: ♀ „Neotypus“ (Pac. Insects 1, 367; 1959) Tonga, Mus. GODEFFROY, hiermit als Lectotypus festgelegt. Begründung für diese Änderung siehe bei *Psephus evaensis* SCHWARZ.

**rufithorax** MIWA, 1930 (*Athous*)  
Wien. ent. Ztg. 47, 92—93

Holotypus, Formosa, Taiborin, 7. 6. 1911, leg. SAUTER; Paratypen, Horisha, 7. 1926, leg. MIWA.  
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**rufiventris** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 153—154

♂ Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: 3 Syntypen, Dar-es-Salaam.

**rufiventris** SCHWARZ, 1902 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 337—338

♀ Syntypen, Assam.  
DEI: 1 Syntypus, Assam.

**rufiventris** SCHWARZ, 1898 (*Craspedonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 148—149

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, KRAATZ; durch VON HAYEK festgelegt.

**rufiventris** SCHWARZ, 1903 (*Esthesopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 75

Syntypen, Venezuela.  
DEI: 1 Syntypus, Venezuela.

**rufolaterus** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 299—300

Syntypen, Borneo, Kina Balu.  
DEI: 2 Syntypen, Kina Balu.

**rufopilosus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 118—119

Holotypus, Australia mer., Victoria, im DEI.

**rufus** SCHWARZ, 1902 (*Elius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 223

Syntypen, Pondichery.  
DEI: 1 Syntypus, Pondichery.

**rugifrons** SCHWARZ, 1906 (*Cosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 152—153

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 2 Syntypen, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

**rugipennis** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1891, 113; Taf. 2, Fig. 48

Syntypen, Pecking.  
DEI: 1 Syntypus, Pecking, DEYROLL, in Coll. HEYDEN.

**rugosipennis** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 14

Syntypen, Franz. Kongo, Benito.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**rugosus** SCHWARZ, 1899 (*Olophoeus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 67+72—73

♂ Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, D. Afrika, Ngombo.

**rugulosus** SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 149—150

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, von GIRARD festgelegt.

**russoui** HEYDEN, 1889 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 33, 328

Holotypus, Turkestan, Farab, leg. RUSSOW, durch SEIDLITZ erhalten, in Coll. HEYDEN, im DEI.

*sahlbergi* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 104–105

♂♂ Syntypen, Anu-Darja.

DEI: 2 Syntypen, Anu Daria, leg. SAHLBERG.

*sambesianus* SCHWARZ, 1903 (*Odontonychus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 366–367

Syntypen, Sumbo.

DEI: ♂ Lectotypus, Sumbu, leg. DUVIVIER, von GIRARD festgelegt.

*sanguinea* FLEUTIAUX, 1908 (*Adelocera*)

Bull. Soc. ent. France 1908, 164

Syntypen, Tonkin, Mts. Mauson, 2000–3000 m, 4.–5., leg. FRUHSTORFER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*sanguinicollis* SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 325

Syntypen, Pondicherry.

DEI: 4 Syntypen, Pondicherry.

*sauteri* MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)

Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 207

Syntypen, Formosa: Taihorin, 7. 8. 1911; Taihorinsho, 8. 1909; alle leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

*sauteri* MIWA, 1930 (*Silesis*)

Wien. ent. Ztg. 47, 95–96

Syntypen, Formosa: Fuhosho, 8. 1909; Kosempo, 22. 5. 1912; Taihorin, 7. 8. 1911; Taihorinsho, 8. 1909; alle leg. SAUTER; Horisha, 7. 1926, leg. MIWA; Musha, 5. 1919, leg. OKUNI; Mt. Arisan, 10. 1918, leg. SONAN; Tabo, 8. 1923, leg. SHIRAKI; Shinchiku, 7. 1918, leg. SONAN.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 8. 1909; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911; 4 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909 und 7. 9.; alle leg. SAUTER.

*schauinslandi* SCHWARZ, 1901 (*Amychus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 194–196

2 Syntypen, Chatam-Inseln, leg. SCHAUINSLAND.

DEI: 1 Syntypus, Chatam-Inseln.

*schniederi* SCHWARZ, 1908 (*Alaus*)

Soc. ent. 23, 110

Syntypen, Kamerun, Edea.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Edea, ex Coll. SCHNEIDER.

*schniederi* KIESENWETTER, 1878 (*Athous*)

Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 16 (1877), 203

Syntypen; Schambobell, 8. 1875, leg. SCHNEIDER; Kor-oglu, 5., leg. LEDER.

DEI: 2 Syntypen, Schambobell, leg. SCHNEIDER.

*schniederi* SCHWARZ, 1902 (*Gastrimargus*)

Stett. ent. Ztg. 63, 310–311

2 Syntypen, Afrika orient., Micindani, durch SCHNEIDER.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Afrika or., Micindani, ex Coll. SCHNEIDER, durch GIRARD festgelegt.

*schniederi* SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 155–156

Holotypus, Brasilien, San Leopoldo, leg. SCHNEIDER, im DEI.

*schusteri* SCHWARZ, 1897 (*Paracardiophorus*)

Wien. ent. Ztg. 16, 129–130

Syntypen, Bagdad.

DEI: 1 Syntypus, Bagdad.

*schwarzi* REITTER, 1898 (*Elathous*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 346

Syntypen, Kleinasien, Mardin.

DEI: 1 Syntypus, Asia min., Mardin.

*schwarzi* BECKER, 1961 (*Ischiodontus*)Canad. Ent. 43, 169–170, Fig. 5; nom. nov. pro *parallelus* SCHWARZ, 1906,

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 104–105

Syntypen, America borealis, Alabama.

DEI: ♂ Lectotypus, Alabama, leg. SPEYER, von BECKER (Canad. Ent. 43, 169–170; 1961) festgelegt.

*scitulus* SCHWARZ, 1909 (*Campylopsephus*)

Soc. ent. 24, 117

♂♂ Syntypen, San-Thomé.

DEI: ♂ Lectotypus, San Thome, von GIRARD festgelegt.

**scopus** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 200—202

Syntypen, Deutsch-Neu-Guinea, Stephansort.  
DEI: ♂ Lectotypus, N. Guinea, Stephansort, durch von HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 208; 1973) festgelegt.

**scriptus** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 74—75

Syntypen, Brasilien, Pernambuco.  
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Pernambuco.

**scutellaris** SCHWARZ, 1903 (*Esthesopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 76—77

Syntypen, Brasilien.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

**scutellaris** SCHWARZ, 1902 (*Tetralobus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 200—210

2 ♂♂, Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, Tanga, leg. HINTZ.  
DEI: ♂ Lectotypus, Tanga, von GIRARD festgelegt.

**semiferrugineus** SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 95—96

Syntypen, Afrika, Delagoa-Bai.  
DEI: ♂ Lectotypus, Delagoa-B., von GIRARD festgelegt.

**semifuscus** SCHWARZ, 1900 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 4

Syntypen, Kamerun, Victoria.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Victoria, von GIRARD festgelegt.

**seminiger** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 77

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Camerun, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

**semiotoides** SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 154—155

♀ Holotypus, Argentinien, Gob. Neuquen, leg. BRUCH, im DEI.

**semipunctatus** SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 316—317

♂♀ Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.  
DEI: 1 Paralectotypus, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

**semirufus** SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 80; als var. zu *discolor* SCHWARZ beschrieben

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, D. Ost Afrika, von GIRARD festgelegt.

**semirugulosus** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 138—139

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt. Ein dritter Syntypus ist verlorengegangen.

**semistriatus** SCHWARZ, 1899 (*Agrypnus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 74—75

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.  
DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, leg. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

**semistriatus** SCHWARZ, 1900 (*Anchastus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 151—152

Syntypen, Kamerun.  
DEI: 2 Syntypen, Kamerun.

**senilis** SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)  
Arkiv Zoologi 1, 51

♂♀ Syntypen: zahlreiche Syntypen, Kamerun, Umgebung von Barombi, leg. CONRADT, im Mus. Stettin und Coll. SCHWARZ;  
3 Syntypen, Kamerun, leg. SJÖSTEDT, im Mus. Stockholm; 2 Syntypen, Franz. Kongo, Benito, in Coll. SCHWARZ.  
DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀, Paralectotypen, Kamerun, Victoria; 1 ♂, Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT;  
1 ♀, Paralectotypus, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 96, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt. 2 Syntypen (*senilis*?),  
Congo Franç., Benito.

**seriatus** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 4

♀♀ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

**sericatus** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1891, 113; Taf. 2, Fig. 47

Syntypen, Pecking.

DEI: 1 Syntypus, Pecking, DEYROLLE, in Coll. HEYDEN.

**serratipennis** SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 139–140

♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀, Paralectotypen, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

**setosulus** SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 378

Syntypen, Deutsch Neu-Guinea.

DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Stephansort; 1 Syntypus, N. Guinea, Fumack.

**setosus** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 311–312

Syntypen, Madagascar, Antongil-Bai.

DEI: 1 Syntypus, S. de la baie d'Antongil.

**sexmaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 236–237

Syntypen, Columbia.

DEI: 1 Syntypus, Columbia.

**sexmaculatus** SCHWARZ, 1901 (*Anchastomorphus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 328

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyaz.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.–11. 1897; 2 Syntypen, Jatahy, Prov. Goyaz.

**sexmaculatus** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 335–336

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

DEI: 3 Syntypen, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy, 9.–11. 1897; 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

**sexplagiatus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 235–236

Syntypen, Brasilien, Itaituba.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Grav. Para, Itaituba.

**sexpustulatus** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 124–125

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 3 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

**sexpustulatus** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 327–328

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo; 3 Syntypen, Kina Balu.

**sexvittatus** SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 316

Syntypen, Columbia.

DEI: 2 Syntypen, Columbien.

**signatus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 239–240

Syntypen, Caucathal.

DEI: 1 Syntypus, Caucathal.

**sikorae** SCHWARZ, 1896 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 96

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madag.

**similatus** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 331

Syntypen; Sumatra; Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera; 2 Syntypen, N. Borneo; 1 Syntypus, Kina Balu.

**simoni** STIERLIN, 1879 (*Ectinus*)  
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 511–512

Syntypen, Syrien.

DEI: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Syrien.

**sjoestedti** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 57–58

2 Syntypen, Usambara, Mombo, 6., leg. SJÖSTEDT.

DEI: ♀ Lectotypus, Usambara, Mombo, Juni, leg. SJÖSTEDT, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 213; 1973) festgelegt.

**smyrnensis** SCHWARZ, 1903 (*Elathous*)  
Wien. ent. Ztg. 22, 207–208

♀♀ Syntypen, Asia minor, Smyrna.  
DEI: 1 Syntypus, Smyrna, 14. 8. 1871.

**solitus** SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 240

Syntypen, Madras.  
DEI: 2 Syntypen, Madras.

**somcheticus** SCHWARZ, 1896 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 148

Syntypen, Somchetien, leg. CONRADT.  
DEI: 2 Syntypen, Somchetien, 1892, leg. CONRADT.

**songoricus** KRAATZ, 1879 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 283

5 Syntypen, Targabatui.  
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Tarbagat, von GURJEVA festgelegt.

**sordidulus** SCHWARZ, 1909 (*Cardiophorus*)  
Soc. ent. 24, 130

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.  
DEI: 1 Syntypus, Amber-Geb.

**sordidulus** SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)  
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 316; nom. nov. pro *sordidus* SCHWARZ, 1902,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 120

2 Syntypen, Australia mer., Victoria, im DEI.

**sordidulus** SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 94–95

Syntypen, Afrika, Niam-Niam.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Njam-Njam, von GIRARD festgelegt.

**sordidus** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 133–134

Holotypus, Argentinien, Gob, Caco, 12. 1894, leg. BRUCH, im DEI.

**sordidus** SCHWARZ, 1909 (*Dorygonus*)  
Soc. ent. 24, 122

Syntypen, Madagascar.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

**sordidulus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
siche *sordidulus* SCHWARZ, 1907

**sororius** SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 371

♂♀ Syntypen, Afr. or., Ikutha, Micindani.  
DEI: 3 Syntypen, Afr. or., Micindani.

**spinicollis** SCHWARZ, 1894 (*Odontoderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 149–150

♂♂ Syntypen, Syrien, Beirut.  
DEI: 1 Syntypus, Beirut, APPL., 1878, B. M.

**spinipennis** SCHWARZ, 1902 (*Anaissus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 150

Syntypen, Peru, Chanchamayo.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE.

**spinipennis** SCHWARZ, 1902 (*Cyathodera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 133–134

Syntypen, Peru, Tarapota.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Tarapota.

**spinipennis** SCHWARZ, 1900 (*Megapenthes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 91

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

**spinosulus** SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 25–26

Syntypen, Ceylon, Trincomalee, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Trincomali.

**spinosus** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 333

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

**splendens** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 23 (1908–1909), 181–182

Syntypen, Goldküste.

DEI: ♀ Lectotypus, Goldküste, von GIRARD festgelegt.

**splendidus** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 109

Syntypen, Congo.

DEI: ♀ Lectotypus, Congo, von GIRARD festgelegt.

**squalidus** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 104; Taf. 2, Fig. 33

♂♂ Syntypen, Sibirien, Tarbagatai.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Sibirien, Tarbagatai, 1877, leg. HABERHAUER.

**starcki** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 94; Taf. 1, Fig. 18

♂♂ Syntypen, West-Caucasus.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Caucas occid., Medovej, leg. STARCK; 1 Syntypus, Caucas occid., Utsch Dere, leg. STARCK; 1 Syntypus, West-Caucasus, Utsch Dere, leg. KÖNIG.

**stephanus** SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 345–346

Syntypen, Pondicherry.

DEI: 3 Syntypen, Pondicherry.

**sternalis** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 92–93

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**striatus** SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 343–344

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: 3 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß.

**subaeneus** SCHWARZ, 1905 (*Agonischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 263–264

2 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON.

DEI: 1 Syntypus, Assam, Kohima.

**subangulatus** SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 270–271

Syntypen, Sumatra, Soekaranda.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra; 2 Syntypen, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

**subaurata** SCHWARZ, 1904 (*Adelocera*)  
Spolia Zeylanica 2, Part 5, 46

Syntypen, Ceylon, im Mus. Colombo.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon.

**subcarinulatus** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
Soc. ent. 23, 82

Syntypen, Madagascar, Mont. d'Ambre.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Amberggebirge.

**subcytindricus** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
Soc. ent. 23, 93

Syntypen, Madagascar, Mont. d'Ambre.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Mont d'Ambre.

**subdentatus** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 158–159

Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

DEI: 4 Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

**subhumeralis** SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 33–34

Syntypen, Ceylon, Kanthalay, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Kanthalay.

**subhumeralis** SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 329

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera.

**submaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 230—231

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

**submaculatus** SCHWARZ, 1902 (*Pyrophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 287—288

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

**submarmoratus** SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)  
Arkiv Zoologi 1, 49—50

3 Syntypen, Kamerun, 2 Ex. von SJÖSTEDT, 1 Ex. von KRAATZ.

DEI: 1 Paralectotypus, Kamerun, SJÖSTEDT; 1 Paralectotypus, Kamerun; von GIRARD festgelegt.

**subopacus** SCHWARZ, 1902 (*Campsosternus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 319

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

**subpectinatus** SCHWARZ, 1902 (*Alaotrypus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 308—309

2♂♂, Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Montes Mauson, 2—3000 Fuß, 4.—5., leg. FRUHSTORFER.

**subpectinatus** SCHWARZ, 1902 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 361—362

Syntypen, Nord-Queensland.

DEI: 1 Syntypus, N. Queensland, leg. WEISKE.

**subpectinatus** SCHWARZ, 1902 (*Hemicrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 339—340

Holotypus (an den Fühlern und Beinen sehr defekt), Tonkin, Montes Mauson.

DEI: Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

**subsericeus** SCHWARZ, 1902 (*Altalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 115

♀ Holotypus, Neu-Süd-Wales, im DEI.

**substratus** SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 100—101

Syntypen, Brasilia, Jatahy-Goyaz.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Jatahy, Goyaz.

**substratus** SCHWARZ, 1906 (*Chalcolepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 97—98

Syntypen, Arizona.

DEI: Lectotypus, 4 Paralectotypen, Arizona, von BECKER (Can. Ent. 43, 162—163; 1961) festgelegt.

**subtuberculatus** SCHWARZ, 1898 (*Lobotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 132—133

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

**subvirescens** SCHWARZ, 1904 (*Semiotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 49—50

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

**sulcicollis** SCHWARZ, 1902 (*Altalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 313—314

♂♂ Syntypen, Shortland-Insel.

DEI: 1 Syntypus, Shortland-Insel.

**sulcicollis** SCHWARZ, 1902 (*Ischiadontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 137—138

Syntypen, Ecuador, Archidona.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH.

**sulcicollis** SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)  
Soc. ent. 23, 73—74

Syntypen, Madagaskar, Antananarivo.

DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, leg. SIKORA.

**sulcicollis** SCHWARZ, 1896 (*Pantolamprus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 93—94

Holotypus, Afrika, Aschanti, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

**sulcifrons** SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 330–331

Syntypen, Callanga, Peru.

DEI: 2 Syntypen, Callanga, Peru; 2 Syntypen, Peru.

**suturalis** SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 138–139

♂♂ Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Marcapata.

**suturalis** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 264–265

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 6 Syntypen, Peru, Callanga.

**suturalis** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 327

Syntypen, Madagascar.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar.

**suturalis** SCHWARZ, 1906 (*Simodactylus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 354–355

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Queensland.

DEI: 1 Syntypus, Queensland.

**suturalis** SCHWARZ, 1902 (*Spheniscosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 277–278

Syntypen, Ceram.

DEI: 1 Syntypus, Ceram, Illo, 1884, leg. RIBBE.

**suturellus** SCHWARZ, 1902 (*Megapenthes*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 248–249

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

**syriacus** SCHWARZ, 1903 (*Elathous*)  
Wien. ent. Ztg. 22, 208

Syntypen, Syrien, Beirut.

DEI: 1 Syntypus, Syria, Beirut.

**taeniatus** CANDEZE, 1878 (*Melanoxanthus*)  
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 12, 129

Zahlreiche Syntypen, Celebes, Kandari, 3. 1874, leg. BECCARI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**taiwana** MIWA, 1930 (*Csikia*)  
Wien. ent. Ztg. 47, 93

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER. Paratypen, Formosa: Mt. Arisan, 10. 10. 1912, leg. NITOBE; Kwarenko, 7. 1926, leg. MIWA; Baibara, 7. 1926, leg. MIWA.  
DEI: Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

**tangamus** HAYEK, 1973 (*Adelocera*)  
Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 48–49; nom. nov. pro *minutus* SCHWARZ, 1903,  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 358

Syntypen, Tanga.

DEI: ♀ Lectotypus, Tanga, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 48–49; 1973) festgelegt.

**taprobanensis** SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 34–35

Syntypen, Ceylon: Matafa; Kandy, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Matafa.

**tauricus** HEYDEN, 1882 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 155

2 Syntypen, Krim, Theodosia, leg. RETOWSKI.

DEI: 1 Syntypus, Theodosia, leg. RETOWSKI (ohne Kopf und Halsshield).

**tauricus** SCHWARZ, 1897 (*Ludius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1897, 400

Syntypen, Asia minor, Taurus cilic., leg. HOLTZ.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Taurus Cilic., 1895, leg. HOLTZ.

**tenebrosus** SCHWARZ, 1898 (*Ludius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 411

♂♀ Syntypen, Java, Mont Kawie, Paserocean.

DEI: 2 Syntypen, Java, Paserocean, Mt. Kawie.

**tenellus** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 28–29

Syntypen, Ceylon: Nalanda; Trinkomalee, leg. HORN.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Nalanda, 1899, leg. HORN; 1 Syntypus, Ceylon, Trinkomali, 1899, leg. HORN.

***tenuiculus*** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 29–30

Syntypen, Ceylon, Haputale, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Haputale.

***terminatus*** SCHWARZ, 1906 (*Acolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 132

Syntypen, Peru, Chanchamago.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Chanchamago, ex Coll. SCHNEIDER.

***terminatus*** SCHWARZ, 1906 (*Esthesopus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 147–148

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.  
DEI: 1 Syntypus, Colonia, Hansa, St. Catharina.

***terminatus*** SCHWARZ, 1902 (*Paracosmesus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 151–152

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE.  
DEI: Holotypus, Peru, leg. LANGE.

***testaceipennis*** SCHWARZ, 1904 (*Atractosomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 70

Syntypen, Brasilien, leg. BRUCH.  
DEI: 1 Syntypus, Brasil, 21. 10. 1901, leg. BRUCH.

***testaceipennis*** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 159–160

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN.

***testaceus*** SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 128

Syntypen, Brasilien, Yrimaguas.  
DEI: 1 Syntypus, Yrimaguas.

***testaceus*** SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 56–57

Syntypen, Columbien.  
DEI: 1 Syntypus, Columbien.

***testaceus*** SCHWARZ, 1902 (*Stichotomus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 336

Syntypen, Australien (ohne genauere Angaben).  
DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♂, Paralectotypen, Australien, von NEBOISS festgelegt.

***tibialis*** SCHWARZ, 1900 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 111

Syntypen, Altai.  
DEI: 1 Syntypus, Altai.

***tigrinus*** SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 286–287

♂♀ Syntypen, Benguela.  
DEI: 2 Syntypen, Benguela.

***tonkinensis*** SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 341–342

Syntypen, Tonking, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: 3 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, 4.–5., leg. FRUHSTORFER.

***tonkinensis*** SCHWARZ, 1902 (*Hemicrepidius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 338–339

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.  
DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

***trapezicollis*** SCHWARZ, 1903 (*Corymbites*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 59–60

♂♂ Syntypen, America borealis.  
DEI: 1 Syntypus, Am. bor.

***trapezicollis*** SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)  
Soc. ent. 24, 78

Syntypen, Kamerun, Barombi.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

***triangulus*** SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 362

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

**triligatus** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 266–267

Syntypen, Brasilien, Santos.  
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Santos; 2 Syntypen, Santos, leg. METZ.

**trilineatus** SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 227–228

♂♀ Syntypen, Peru, La Merced.  
DEI: 2 Syntypen, Peru, La Merced.

**tristis** SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1891, 105; Taf. 2, Fig. 36

Syntypen, Türkei.  
DEI: 1 Syntypus, Türkei, leg. MERKL, in Coll. HEYDEN.

**trisulcatus** SCHWARZ, 1903 (*Metabrax*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 394–395

Syntypen, Australien.  
DEI: Holotypus (teste NEBOISS), Australien.

**trivittatus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 323

Syntypen, Madagaskar, Plateau d'Androy, Reg. d'Ambovombe.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**trivittatus** SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 53–54

Syntypen, Brasilien, B. Retiro.  
DEI: 1 Syntypus, B. Retiro.

**trivittatus** SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 27

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.  
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, Weligama, 1899, leg. HORN.

**tschukini** REITTER, 1910 (*Athous*)  
Wien. ent. Ztg. 29, 177–178

Mehrere ♂♂ Syntypen, Zentraler Nordabhang des Kaukasus bei Teberda, unweit der Quellen des Kuban, leg. PLIGINSKIY und ZOLOTAREW.  
DEI: 1 Syntypus, Cauc. cent. bor., Teberda, 4200'–5000', leg. ZOLOTAREW.

**tuberculatus** SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 370–371

Syntypen, Afrika or., Micindani.  
DEI: 3 Syntypen, Africa or., Micindani.

**tumidicollis** SCHWARZ, 1906 (*Horistonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 145

3 Syntypen, Mendoza.  
DEI: 3 Syntypen, Mendoza.

**tumidicollis** SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 330–331

Holotypus, Madras, im DEI.

**tumidithorax** SCHWARZ, 1907 (*Cardiophorus*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 80–81

Syntypen, Australien, Queensland.  
DEI: 1 Syntypus, Queensland.

**turkestanicus** SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 198–199

Syntypen, Turkestan, Buchara.  
DEI: 2 Syntypen, Buchara; 1 Syntypus, Turkestan.

**umbriticollis** SCHWARZ, 1909 (*Elastrus*)  
Soc. ent. 24, 122–123

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Amberggeb.

**umbtatus** SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 133

Syntypen, Brasilia merid., Curitiba, Paraná.  
DEI: 1 Syntypus, Süd-Brasilien, Curitiba, Parana, 15. 6. 1887, leg. DÖRING-WANDSBECK.

**undulatus** SCHWARZ, 1902 (*Dioxypterus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 316–317

Syntypen, N. Guinea?  
DEI: 1 Syntypus, Patria ?, Fidschi Insel?

**undulatus** SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 215—217

Syntypen, Kamerun.  
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

**unicolor** SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 148

Syntypen, Peru, Marcapata.  
DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata.

**unifasciatus** SCHWARZ, 1902 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 146—147

Syntypen, Peru, Marcapata.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Marcapata.

**urgensis** SCHWARZ, 1900 (*Athous*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 109

1 Syntypus, Urga; Syntypen, Amur.  
DEI: 1 Syntypus, Urga; 1 Syntypus, Amur.

**ustulatus** SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 322—323

Syntypen, Sydney, im Mus. GODEFFROY.  
DEI: 1 Syntypus, Sidney, Mus. GODEFFROY No. 11242.

**ustulatus** SCHWARZ, 1898 (*Melanoxanthus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 146—147

♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT.

**vadous** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 154

Syntypen, Dar-es-Salaam.  
DEI: 3 Syntypen, Dar-es-Salaam.

**validus** SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 366

3 ♀, Syntypen, Margelan, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

**variabilis** SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 90—91

Syntypen, Dar-es-Salaam, leg. BENNIGSEN.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN; 2 Paralectotypen, Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN; von GIRARD festgelegt.

**variegatus** SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 145—146

Syntypen, Brasilien, Petropolis.  
DEI: 2 Syntypen, Petropolis, leg. SAHLBERG.

**variegatus** SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 114—115

Syntypen, Queensland.  
DEI: 2 Syntypen, Queensland.

**variegatus** SCHWARZ, 1902 (*Hypnoidus*)

Siehe *pictipennis* SCHWARZ, 1906

**variegatus** SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 123—124

Syntypen, Australia mer., Victoria.  
DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

**variegatus** SCHWARZ, 1902 (*Pericus*)  
Stett. ent. Ztg. 63, 203—204

Syntypen, Birma.  
DEI: ♀ Lectotypus, Birma, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 50—51; 1973) festgelegt.

**variegatus** SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 76—77

Syntypen, São Paulo.  
DEI: 4 Syntypen, S. Paulo.

**variipennis** SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 100—101

Syntypen; Buchara; Repetek; Merw; Turkmenien; Issyk-kul.  
DEI: 1 Syntypus, Merw, Anger; 1 Syntypus, Issyk-Kul, Ton-Fluß; 1 Syntypus, Turkmenien, leg. LEDER, REITTER.

*venaticus* CANDÈZE, 1860 (*Cardiophorus*)

Monographie des Elaterides 3, 214; Taf. 3, Fig. 30

Syntypen, Java, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Java, HAENLEIN, in Coll. HEYDEN.

*venustulus* SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 319–320

♂ Syntypen, Sidney, aus dem Mus. GODEFFROY.

DEI: 1 Syntypus, Sidney, Mus. GODEFFROY No. 11233.

*venustus* SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 69–70

♂ Holotypus, Brasilien, St. Catharina, in Mus. Stettin.

DEI: 1 historisches Exemplar, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT, ex Coll. SCHWARZ.

*veriloquus* COSTA, 1972 (*Pyrophorus*)

Papeis Avulsos Zool. S. Paulo 25, 202, 219–221, Fig. 8+8a

♂ Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im Mus. Paris. Paratypen: 1 Ex., Mexico, Chiapas, N. W. Ocosingo, 8. 3. 1953, leg. SCHLINGER; 19 Ex., Guatemala; 1 Ex., Vera Paz, S. Cristobal; 1 Ex., Panama, Veraguas, leg. WARZOWICZ.

DEI: 2 Paratypen, Guatemala, leg. CONRADT.

*versicolor* MULSANT, 1856 (*Cardiophorus*)

Opusc. ent. 7, 95–97

Syntypen, Süd-Frankreich.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, Provence.

*vetustus* SCHWARZ, 1894 (*Melanotus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 38, 147–148

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulab.

DEI: 5 Syntypen, Turkestan, Kulab.

*victoriae* SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 116–117

♂ Holotypus, Australia mer., Victoria, im DEI.

*victoriae* SCHWARZ, 1902 (*Corymbites*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 362

Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Austr.

*villigeroides* REITTER, 1905 (*Athous*)

Best. Tab. 56, 55

1 ♂, Syntypus, Monte-Rosa, in Coll. HEYDEN; 1 ♀, Syntypus, Monte-Rosa, in Coll. REITTER.

DEI: 1 ♂, Syntypus, M. Rosa, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

*virgatus* SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 68–69

♂ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, St. Catharina.

*virgulatus* SCHWARZ, 1896 (*Pomachilus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 101–102

Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 Syntypus, Brasilia.

*viriditarsus* SCHWARZ, 1906 (*Chaleolepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 97

♀ Syntypen, San Salvador.

DEI: 1 Syntypus, S. Salvador.

*vitticollis* SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 342–343

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo.

*vitticollis* SCHWARZ, 1902 (*Crepidomenus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 329

Syntypen, Sidney.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Sidney, Mus. GODEFFROY, durch NEBOISS festgelegt.

*vitticollis* HELLER, 1935 (*Dioxypterus*)

Arb. morph. tax. Ent. 2, 265–267, Fig. 2

Syntypen, Salomo Insel Nova Georgia, Pauru, im Mus. Dresden und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Salomo I. Neu Georgia, Paura, leg. MALCHER.

*vitticollis* SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 117–118

Syntypen; Australia merid., Melbourne; Nord Queensland

DEI: 1 Syntypus, Melbourne.

**vitticollis** SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)  
siehe *maculicollis* SCHWARZ, 1906

**vittiger** HEYDEN, 1887 (*Agonischius*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 267—268  
1 Syntypus, Korea; 1 Syntypus, Pecking, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Pecking, 1885, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

**vuattouxi** GIRARD, 1971 (*Propsephus*)  
Bull. J. F. A. N. 33 (Sér. A), 602—603, Fig. 45, 47  
♂ Holotypus, Afrika, Côte d'Ivoire, Lamto, 1.—6. 3. 1969; 6 Paratypen, vom selben Fundort, 10.—29. 2. 1968, 19. 3. 1969 und 10.—25. 4. 1968; alle leg. GIRARD.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 10.—29. 2. 1968.

**vulneratus** SCHWARZ, 1906 (*Cylindroderus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 156—157  
Syntypen, La Paz.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivia, La Paz.

**vulnératus** SCHWARZ, 1907 (*Megapenthes*)  
Stett. ent. Ztg. 68, 77—78  
Holotypus, Australia mer., im DEI.

**weisei** SCHWARZ, 1898 (*Anchastus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 190—191  
♂ Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.  
DEI: 5 Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

**weisei** SCHWARZ, 1898 (*Hemicleus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 183  
Syntypen, Usambara, Ost-Afrika.  
DEI: 1 Syntypus, Usambara, leg. WEISE.

**weisei** SCHWARZ, 1898 (*Lacon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 185—186  
Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Usambara, leg. WEISE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 51; 1973) festgelegt.

#### Wahrscheinlich nicht beschrieben:

**argentatus** QUELLE (*Elasmosomus*)  
DEI: 1 Ex., Kamerun, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.

**beckeri** PEČIRKA (*Agriotes*)  
DEI: 1 Ex., China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER, als Typus ausgezeichnet.

**kiesenwetteri** STIERLIN (*Agriotes*)  
DEI: 1 Ex., Sarepta, als Typus ausgezeichnet.

**lepidulus** SCHWARZ (*Pomachilius*)  
DEI: 2 Ex., Brasilien, Theresopolis, leg. SCHNEIDER, als Typus ausgezeichnet.

**lepidus** SCHWARZ (*Pomachilius*)  
DEI: 3 Exemplare, Theresop., leg. SCHNEIDER, als Typen ausgezeichnet.  
**nanus** PEČIRKA (*Hypnodus*)  
DEI: 1 Ex., Werchne-Udinsk, Trsbaikal., leg. MANDL, als Typus ausgezeichnet.

**sareptanus** STIERLIN (*Agriotes*)  
DEI: 1 Ex., Sarepta, als Typus ausgezeichnet.

#### Eucnemidae

**africanus** SCHWARZ, 1902 (*Microrhagus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 351—352  
Syntypen, Kamerun.  
DEI: 1 Syntypus, Kamerun.

**ater** SCHWARZ, 1902 (*Lycœon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 353  
Syntypen, Australien.  
DEI: 1 Syntypus, Australien.

**brunneipennis** SCHWARZ, 1902 (*Lycœon*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 353—354  
Syntypen, Borneo.  
DEI: 1 Syntypus, Borneo.

*cephalotes* FLEUTIAUX, 1924 (*Fornax*)

Bull. Soc. ent. France 1924, 156

Syntypen; Tonkin; Cho-Ganh, leg. Duport; Hoa-Binh, leg. COOMAN.  
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Thô, Hoa Binh, leg. DE COOMAN.*chevrolati* STIERLIN, 1864 (*Microrhagus*)

Berl. ent. Ztschr. 8, 148–149

♂♀ Syntypen, Sicilien.  
DEI: 2 Syntypen, Sicilien.*hamatus* SCHWARZ, 1902 (*Scopulifer*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 355–356

Holotypus, Sumatra.  
DEI: Holotypus, Sumatra, Mesogenus.*nigrotimbatus* SCHWARZ, 1902 (*Thylacosternus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 356–357

Syntypen, Brasilien.  
DEI: 1 Syntypus, Rio de Janeiro.*planifrons* SCHWARZ, 1902 (*Hylochares*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 352–353

Syntypen, Deutsch Neu Guinea.  
DEI: 2 Syntypen, D. N. Guinea.*scutellaris* FLEUTIAUX, 1896 (*Fornax*)

Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (Ser. 2) 16, 574–575

Syntypen; Mentawai, Si Oban, 4.–8.; Sipora, Sereinu, 5.; 6. 1894; leg. MODIGLIANI.  
DEI: 4 Syntypen, Mentawai, Si Oban, 4.–8. 1894, leg. MODIGLIANI.

## Throscidae

*atticus* REITTER, 1921 (*Trixagus*)

Wien. ent. Ztg. 38, 69

Syntypen, Griechenland.  
DEI: 1 Syntypus, Attica.*micado* REITTER, 1921 (*Trixagus*)

Wien. ent. Ztg. 38, 68 nota

Syntypen, Japan, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Japan.*schenklingi* REITTER, 1921 (*Trixagus*)

Wien. ent. Ztg. 38, 71

Syntypen, Japan.  
DEI: 1 Syntypus, Japan.

## Chelonariidae

*adstrictum* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 300

Holotypus, Brasilien, Santos, leg. METZ, im DEI.

*dective* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 298

Holotypus, Brasilien, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

*horni* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 298–299

Syntypen; 1 Ex., Brasilien, leg. FRUHSTORFER, in Coll. GROUVELLE; 1 Ex., Brasilien, in Coll. KRAATZ; 1 Ex., Brasilien, Minas Geraes, sierra de Estrella, 1847, leg. LAPORTE DE CASTELNAU, im Mus. Paris.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilia.*inonbratum* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 296–297

4 Syntypen, Mexico, Chiapas, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Chiapas.*modestum* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 297

Holotypus, Guatemala, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

*parallelipenne* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 296

2 Syntypen, Mexico, leg. HOEGE, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOEGE.

*posticum* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)  
Arb. morph. tax. Ent. 1, 299—300

Holotypus, Brasilien, Santa-Catharina, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

*sublampus* MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)  
Arb. morph. tax. Ent. 1, 295—296

2 Syntypen, Mexico, Sierra de Durango; 1 Ex., in Coll. MÉQUIGNON; 1 Ex., in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOEGE.

*vartianae* MANDL, 1967 (*Chelonarium*)  
Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 70, 443—444

Holotypus, 4 Paratypen, Afghanistan, 25 km N von Barikot, 1300 m, 12.—17.7. 1963, leg. KASY & VARTIAN. Holotypus  
2 Paratypen, im Mus. Wien, 2 Paratypen, in Coll. MANDL.  
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, 25 km N. v. Barikot, 1800 m, Nuristan, leg. KASY & VARTIAN.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

*maulazi* MÉQUIGNON (*Chelonarium*)

DEI: 1 Ex., Brasil, Et. de Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2—3—4 1903, leg. GROUVELLE, als Cotyphus ausgezeichnet.

### Buprestidae

*abeillei* OBENBERGER, 1914 (*Acmæodera*)  
Ent. Bl. 10, 251

Syntypen, Algier, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Paralectotypus, Algérie, von VOLKOVITSCH festgelegt.

*acastus* KERREMANNS, 1912 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 114

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

*achilleus* OBENBERGER, 1935 (*Agrilus*)  
Casopis 32, 121; nom. nov. pro *myrmido* KERREMANNS, 1912, Arch. Nat. 78 A 7, 208—209

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. 1909, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 9., leg. SAUTER.

*adenostomae* CAZIER, 1939 (*Acmæodera*)  
Bull. S. Calif. Acad. Sci. 37 (1938), 137—138

♀ Holotypus, Sunset Valley, Santa Barbara County, California, 14. 7. 1938, an *Adenostoma fasciculatum*, leg. CAZIER, in Coll. CAZIER, 106 Paratypen von verschiedenen kalifornischen Fundorten, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben des Holotypus.

*aeneiventris* JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 20, 91—92

Syntypen, Mesopotamien, Malatia, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Mesopotamien. Malata, STAUDIGR. 85.

*aeneocuprea* KERREMANNS, 1914 (*Anthaxia*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 103—104

Syntypen, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Banshoryo-Distr., Sokutsu, 7. 8. 1912, leg. SAUTER.

*aeneomicans* KRAATZ, 1882 (*Sphenoptera*)  
Dtch. ent. Ztschr. 26, 317—318

Holotypus, Samarkand, leg. HABERHAUER, durch STAUDINGER, in Coll. HEYDEN, im DEI.

*aeneus* KERREMANNS, 1900 (*Sambus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 19—20

♂ Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS.

*aerata* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 62—64

♂ ♀ Syntypen, Persien, leg. CHRISTOPH, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Persien.

*aesopus* KERREMANNS, 1912 (*Coraebus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 111

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

*affinis* KERREMANNS, 1900 (*Aphanisticus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 41—42

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS; 14 Syntypen, Sumatra.

*agriloides* KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 38

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DET: 9 Syntypen, Sumatra.

*ajax* KERREMANS, 1912 (*Agriplus*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 207

Syntypen, Formosa: Kosempo, 9. 1909, 8. 1911; Alikang, 10. 1909; leg. SAUTER.  
DET: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 9. 1909/7. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Alikang, 10. 1909, leg. SAUTER.

*akbesiana* OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)  
Arch. Nat. 85 A 3, 120–121

Syntypen; Syria, Akbes, in Coll. WINKLER; Libanon, in Coll. OBENBERGER.  
DET: 1 Syntypus, Libanon.

*amasina* K. DANIEL, 1903 (*Anthaxia*)  
Münch. Kol. Ztschr. 1, 252

Syntypen, Kleinasien.  
DET: 1 Syntypus, Asia minor, Aski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.

*analis* OBENBERGER, 1925 (*Hylaeogena*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 82, 135, 145, Fig. 108

Syntypen, Brasilien, Sao Paulo.  
DET: 2 Syntypen, Brasilia, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

*angelica* OBENBERGER, 1915 (*Sphenoptera*)  
Ent. Bl. 11, 54–55

Syntypen, Araxesufer, leg. VESELY.  
DET: 1 Syntypus, Caucasus.

*anthracina* OBENBERGER, 1926 (*Aemacodera*)  
Arch. Nat. 92 A 9, 88–89+18

Syntypen; Transvaal (HOLUB); S. W. Protectorate: Narebiz (Mus. Capetown); Otjimbumbo, Kunene River, 3. 1923 (Mus. Capetown); Loc. ?, (British Mus.).  
DET: 1 Syntypus, Transvaal, Coll. OBENBERGER.

*antiqua ausonica* OBENBERGER, 1927 (*Sphenoptera*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 5, 95

Syntypen; Sicilia; Rumelia or., Studenec.  
DET: 1 Syntypus, Sicilia.

*araxana* OBENBERGER, 1915 (*Sphenoptera*)  
Ent. Bl. 11, 52–53

Wenige Syntypen, Gebüsch bei Ordubad am Araxes, leg. VESELY.  
DET: 1 Syntypus, Araxes, leg. VESELY.

*araxicola* OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)  
Arch. Nat. 82 A 11, 25+28

Syntypen, Kaukasus, Araxestal.  
DET: 1 Syntypus, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDER, REITTER.

*arcuatus* OBENBERGER, 1925 (*Pachyschelus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 78, 121–122, Fig. 61

Syntypen; Brasilien, Sao Paulo; Paraguay.  
DET: 3 Syntypen, Brasilia, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

*argenteus* KERREMANS, 1914 (*Sambus*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 104

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.  
DET: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

*argentinus* OBENBERGER, 1924 (*Paragrilus*)  
Arch. Nat. 90 A 3, 145

Syntypen; Argentinien, Corrientes; La Merced.  
DET: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Corrientes, leg. BRUCH.

*armeniaca cypria* OBENBERGER, 1917 (*Julodis*)  
Col. Rundsch. 6, 48

Zahlreiche Syntypen, Nicosia, Cyprus.  
DET: 1 Syntypus, Cyprus, Nicosia.

*aspera* KERREMANS, 1892 (*Parataenia*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 36, 54–55

18 Syntypen; Sierra-Leone; Gabun; Camerun und Congo; im Mus. Brüssel, Coll. OBERTHÜR, MEYER-DARCIS und KERREMANS.  
DET: 1 Syntypus, Gabon, MEYER-DARCIS.

*aureonitens* OBENBERGER, 1919 (*Paragrilus*)  
Ent. Mitt. 8, 22–23

Syntypen, Costa Rica, Surrubres, 300', leg. HEYNE; einige Ex. in Coll. OBENBERGER.  
DET: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*europictus* KERREMANNS, 1912 (*Agriulus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 208

Syntypen, Taihorin, 9. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 6. 1911, leg. SAUTER.

*bacchus* KERREMANNS, 1912 (*Agriulus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 114

Syntypen, Formosa, Sokutsu (Banshoryo Distr.), leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7. 6. 1912, leg. SAUTER.

*banfuensis* OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)

Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 18

Syntypen, Südkamerun, Joko, 9., durch HEYNE.

DEI: 2 Syntypen, Südkamerun, Joko, 9.

*baobabil* OBENBERGER, 1913 (*Agriulus*)

Ent. Mitt. 2, 338—339; Taf. 3, Fig. 5

4 Syntypen, Marokko, 3 Ex., in Coll. OBENBERGER, 1 Ex., im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Marocco.*bartoni* OBENBERGER, 1940 (*Acmaeodera*)

Sborn. Nar. Mus. Praze 2B (Zool. 3), 127—128

Syntypen, Creta, Levka Ori, 1938, leg. ŠTĚPÁNEK &amp; TÁBORSKÝ.

DEI: 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, von VOLKOVITSCH festgelegt.

*baudii* OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)

Col. Rundsch. 3, 131

Syntypen, Sardinien, Korsika, in Coll. OBENBERGER, 1 Ex., in Coll. LEONHARDT.  
DEI: 1 Syntypus, Sardinien.*bedoci* BOURGOIN, 1924 (*Lampraria*)

Bull. Soc. ent. France 1924, 138

♂ Syntypen; Tonkin, Cho Gauth, leg. DUPORT; Hoa Binh, durch BÉDOC.  
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Hoa-Binh.*bennigseni* KERREMANNS, 1899 (*Agriulus*)

Ann. Soc. ent. Belg. 43, 281—282

Syntypen, Usagora, leg. v. BENNIGSEN.  
DEI: 1 Syntypus, Westusambara, ex Coll. v. BENNIGSEN.*bennigseni* OBST, 1906 (*Julodis*)

Ann. Soc. ent. Belg. 50, 168—169

Syntypen, Deutsch Südwest-Afrika, Windhoek.  
DEI: 1 Syntypus, D.S.W. A., Windhuk, ex Coll. v. BENNIGSEN.*bennigseni* KRAATZ, 1896 (*Pseudocastalia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 86

1 Syntypus, Zanzibar, Usaramo, in Coll. KRAATZ; 1 Syntypus, Zanzibar, Pare Gebirge, in Coll. v. BENNIGSEN.  
DEI: 1 Ex., Usaramo, von HOLM irrtümlich als Holotypus ausgezeichnet, hiermit als Lectotypus festgelegt.*bicolor* OBST, 1906 (*Julodis*)

Ann. Soc. ent. Belg. 50, 169—170

Syntypen, D. S. W.-Afrika, Omaruru, leg. VOLKMANN, 1 Ex., in Coll. v. BENNIGSEN.  
DEI: 1 Syntypus, D. S. W. A., ex Coll. v. BENNIGSEN.*bilobiceps certulus* OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 18; als var. beschrieben

Syntypen, Afrika, Ukerewe.  
DEI: 1 Syntypus, Ukerewe.*bodemeyeri* JAKOWLEFF, 1900 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 34, 501—503

♀ Syntypen, Kleinasien, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, davon 3 Ex. in Coll. HEYDEN.*bodoani* KERREMANNS, 1911 (*Anthaxia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1911, 634

Syntypen, Kleinasien, Tschakit-Tal.  
DEI: 1 Syntypus, Asia-turquie, Tschakit-Thal, leg. v. BODEMEYER.*breiti* OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)

Arch. Nat. 85 A 3, 117—118

Syntypen, Mesopotamia, Mossul, 5. 1909, leg. HAUSER, in Coll. BREIT, KNIRSCH und OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Mesopotam., Assur, 3. 08.*canadensis* OBENBERGER, 1917 (*Agriulus*)

Ent. Bl. 13, 181

Syntypen, Kanada, mehrere Ex. in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Canada.

**capensis** OBENBERGER, 1926 (*Acmaeodera*)  
Arch. Nat. 92 A 9, 19+86–87

Syntypen, Kap der guten Hoffnung.  
DEI: 1 Syntypus, Südafrika.

**carminea** KERREMANS, 1900 (*Chrysobothris*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 305–306

♂♀ Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy.

**chalcichroa** OBENBERGER, 1914 (*Sphenoptera*)  
Col. Rundsch. 3, 132–133

Syntypen, Ägypten, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Aegypten.

**clarescens** KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 283

Holotypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

**cleopatra** OBENBERGER, 1913 (*Anthaxia*)  
Col. Rundsch. 2, 64–65

6 Syntypen, Tripolis, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Tripolis.

**clymene** OBENBERGER, 1924 (*Psilospera*)  
Arch. Nat. 90 A 3, 58

Syntypen, Usambara.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben; 16 Syntypen, Kwai, Usambara; 1 Syntypus, Usambara; 1 Syntypus, Ost-Afrika.

**coerulea** JAKOWLEFF, 1899 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 32 (1898), 559–561

♀♀ Syntypen, Persien, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER; 2 Syntypen, Sultanabad, leg. v. BODEMEYER; in Coll. HEYDEN.

**coeruleipennis** THÉRY, 1934 (*Aphanisticus*)  
Bull. et Ann. Soc. ent. Belg. 74, 148–149

Syntypen, Sumatra, Buitenzorg, leg. KANNEGIETER, in Coll. THÉRY.  
DEI: 1 Syntypus, Buitenzorg, ± 1000', 2<sup>de</sup> Sem. 90, leg. KANNEGIETER.

**coeruleus** KERREMANS, 1900 (*Endelus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 46

Zahlreiche Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS; 6 Syntypen, Sumatra.

**collaris** KERREMANS, 1900 (*Callimicra*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 350–351

Syntypen, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyaz.

**collaris** KERREMANS, 1900 (*Endelus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 45–46

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DEI: 4 Syntypen, Sumatra.

**combinatrix** OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)  
Arch. Nat. 85 A 3, 124–125

Syntypen, Transkaspien, Penschdreh.  
DEI: 1 Syntypus, Transcasp., Imam-baba.

**computus** KERREMANS, 1900 (*Agriulus*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 331

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyaz.

**confusa** KERREMANS, 1912–13 (*Sphenoptera*)  
Monogr. Bupr. 6, 104

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in den Coll. HEYDEN, THÉRY und KERREMANS.  
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in Coll. HEYDEN.

**coreana** OBENBERGER, 1917 (*Buprestis*)  
Col. Rundsch. 6, 50–51

Syntypen; Korea, Soeul; China; 1 ♂, 1 ♀, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, China.

**corporaali** OBENBERGER, 1924 (*Trachys*)  
Treubia 6, 27

Zahlreiche Syntypen, Sumatra, Ostküste, Sibolangit, 550 m, 10. 1921, leg. LOERTZING & CORPORAAL, im Mus. Buitenzorg, Prag und im DEI.  
DEI: 5 Syntypen, Sibolangit, 7. 1921, leg. D. v. L.

***costata*** OBENBERGER, 1916 (*Melibocopsis*)  
Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 12

4 Syntypen, Nord-Nyassa-See, Utentpule Usafua, 1500 m, 6, 1909, leg. GOETZE.  
DEI: 1 Syntypus, Nord-Nyassa-See, Utentpule Usafua, 1500 m, 1899, leg. GOETZE.

***crassiceps*** JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 75—76

Syntypen, Kleinasiens, Malatia, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Malatia, Mesopotam., 1885, leg. STAUDGR., in Coll. HEYDEN.

***eratomerina*** OBENBERGER, 1922 (*Anthaxia*)  
Ent. Bl. 18, 127

Syntypen; West-Usumbara; Transvaal.  
DEI: 1 Syntypus, West-Usumbara.

***erinita maroccana*** OBENBERGER, 1916 (*Acmaeodera*)  
Wien. ent. Ztg. 35, 237; als var. beschrieben

2 Syntypen, Marokko, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Paralectotypus, Marocco, von VOLKOVITSH festgelegt.

***cetesias*** KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 115

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.  
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

***cupreosplendens*** KERREMANS, 1912 (*Lampra*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 203—204

Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***cupricauda*** CARTER, 1927 (*Neospades*)  
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 52, 228—229

♂ Holotypus, 18 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, Northern Territory, King River, leg. SPENCER.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, King R., 24. 12. 1915.

***cupricollis*** KERREMANS, 1903 (*Psiloptera*)  
In: WYTSMAN, Gen. Ins. Bupr. 12, 96

Syntypen, Engl. Ost-Afrika, Mengia.  
DEI: 1 Syntypus, Engl. O. Afrika.

***cuprinus*** KERREMANS, 1897 (*Brachys*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 6, 137

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Goyaz, leg. PUJOL.  
DEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy.

***cuprosus*** OBENBERGER, 1923 (*Agrilus*)  
Tijdschr. Ent. 66, 15—16

Syntypen; Cameroen, Tiko b. Victoria, 1. 1. 1915, leg. v. ROTIKIRCH; Buea; in Coll. VAN ROON, STAUDINGER, v. MÜHLHEIM, OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Buea.

***curtii*** OBENBERGER, 1913 (*Agrilus*)  
Col. Rundsch. 2, 32; als var. von *albogularis* GORY beschrieben

1 Syntypus, Uj-Pest, 12. 7. 1910, leg. PEČIRKA; 1 Syntypus, Bisamberg bei Wien; 1 Syntypus, Wien, Umgebung, leg. CURTI, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Hungaria, Uj. Pest, 12. 7. 1910.

***decastigma leonhardi*** OBENBERGER, 1924 (*Melanophila*)  
Jubilejní sborn. Čs. ent. spol., 25

Syntypen, Dsungaria, in Coll. LEONHARD und OBENBERGER.  
DEI: 3 Syntypen, Dsungarei, Karlyk Tak., 5.—6. 1908.

***depressifrons*** KERREMANS, 1900 (*Agrilus*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 326—327

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyas.

***dives*** JAKOWLEFF, 1902 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 35, 573—575, 580

Syntypen; Buchara, durch STAUDINGER & BANG-HAAS; Hissar, Oberlauf des Toupalang, durch WILLBERG, in Coll. SEMENOW.  
DEI: 1 Syntypus, Buchara, STAUDINGER.

***dolatus*** KERREMANS, 1897 (*Agrilus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 6, 119

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. PUJOL.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyas.

*ebenina* JAKOWLEFF, 1900 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 34, 498–499

♂♂ Syntypen, Alai, durch STAUDINGER.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Alai, STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

*etongatus* KERREMANS, 1900 (*Endelus*)

Mem. Soc. ent. Belg. 7, 44–45

Mehrere Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, leg. WEYERS; 3 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS.

*enmerichi* OBENBERGER, 1934 (*Coroebus*)

Časopis 31, 43–44

Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*erratrix* OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)

Arch. Nat. 85 A 3, 125

2 Syntypen, China, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, China.

*eugeni* JAKOWLEFF, 1899 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 32 (1898), 554–555

♂♂ Syntypen, Transcaucasie, Tiflis, leg. KÖNIG.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Tiflis, leg. KOENIG.

*excisa* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 21, 68–69

♂♀ Syntypen, Sardinien, in Coll. KRAATZ und HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, in Coll. HEYDEN.

*flavofasciata latisquamnis* OBENBERGER, 1914 (*Acmacodera*)

Ent. Bl. 10, 254

Syntypen; Ungarn; Griechenland, Saloniki; von KRÜPER erhalten.

DEI: 3 Paralectotypen, Ungarn, von VOLKOVITSCH festgelegt.

*formosana* KERREMANS, 1912 (*Trachys*)

Arch. Nat. 78 A 7, 209

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

*formosanus* KERREMANS, 1912 (*Agrius*)

Arch. Nat. 78 A 7, 205–206

Syntypen, Formosa, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*fossa* KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 271–272

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in Coll. HEYDEN.

*fuelleborni* KOLBE, 1901 (*Sternocera*)

Sitz. Ber. Ges. nat. Freunde 1901, 83–84

Mehrere Syntypen, Konde-Unyika am Nordende des Nyassa-Sees, leg. FÜLLEBORN; Syntypen, Gegend zwischen Poroto und dem Rukwa-See, Anfang 8. 1899, leg. GOETZE.

DEI: 1 Syntypus, N.-Nyassa-See, Konde-Unyika, 1. 1900, leg. FÜLLEBORN.

*gentilis* KERREMANS, 1895 (*Trachys*)

Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (Sér. 2) 14, 540–541

Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, leg. MODIGLIANI.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra.

*gestroi* OBENBERGER, 1924 (*Paragrilus*)

Arch. Nat. 90 A 3, 144–145

Syntypen; Paraguay, Asuncion; S. Bernardino, 9. 1898, leg. BOGGIANI, in Mus. Genua.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay.

*glabricollis* OBENBERGER, 1929 (*Sphenoptera*)

Coll. Centralbl. 4, 33

Syntypen, Kleinasiens, Eski Chehir.

DEI: 1 Syntypus, Klein-Asien, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.

*granulipennis* THÉRY, 1928 (*Anthaxia*)

Ent. Mitt. 17, 77–79

♀ Holotypus, Tipolti, Baikal, int. DEI.

*grusinus* OBENBERGER, 1917 (*Agrius*)

Wien. ent. Ztg. 36, 209–210

2 Syntypen, Ost-Kaukasus, Kasum-Kjant, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Kasum-Kjant, Ca.or., CHRISTOPH.

**helperti** OBENBERGER, 1939 (*Yermocella*)  
Arb. morph. tax. Ent. 6, 264—265

1 Syntypus, Californien, Yermo, 15. 5. 1937, leg. SCOTT, in Coll. OBENBERGER; 1 Syntypus, S. Cal., NICOLAY, im DEI.  
DEI: Lectotypus, S. Cal., NICOLAY, von NELSON festgelegt.

**hellenica** OBENBERGER, 1914 (*Aemacodera*)  
Ent. Bl. 10, 252

Syntypen, ohne Fundortangaben.  
DEI: 1 Paralectotypus, Saloni $\ddot{\text{k}}$ , von VOLKOVITSH festgelegt.

**helvetica** STIERLIN, 1868 (*Anthonaxia*)  
Mitt. Schw. ent. Ges. 2, 345—346

Mehrere Syntypen, Engadin; 2 Syntypen, Monte Rosa, 5500'.  
DEI: 1 Syntypus, Engadin; 1 Syntypus, Macugnaga.

**heva** KERREMANS, 1902 (*Julodis*)  
Bull. Soc. ent. France 1902, 38

Syntypen, West-Afrika, Benguela, durch DONCKIER.  
DEI: 3 Syntypen, Benguela.

**heynei** OBENBERGER, 1917 (*Agrilus*)  
Col. Rundsch. 6, 35—36

Zahlreiche Syntypen, Costa-Rica, 300', Strubres, durch HEYNE, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**heynei** OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)  
Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 11

Ca. 20 Syntypen, Südkamerun, Joko, 7., von HEYNE.  
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**hoplistrooides** OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)  
Wien. ent. Ztg. 35, 255—256

Wenige Syntypen, Turcia, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Turcia.

**horni** THÉRY, 1941 (*Belgaumia*)  
Bull. Soc. ent. France 46, 91—92, Fig. 1

Holotypus, Malacca, im DEI.

**horni** KERREMANS, 1914 (*Sambus*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 104—105

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, 5. 1912, leg. SAUTER.

**horni** KERREMANS, 1908 (*Stigmadera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 64—65

♂♂ Syntypen, Queensland, leg. ROLLE, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Queensland, Kuranda (Cairns), ROLLE.

**hornianus** KERREMANS, 1912 (*Trachys*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 116

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 5. 1912, leg. SAUTER.

**igniceps** JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 20, 89—90

Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**indistincta** SAUNDERS, 1869 (*Stigmadera*)  
Insecta Saundersiana 3, 11—12; Taf. 1, Fig. 16

Syntypen, Neu S. Wales.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

**infranitens** KERREMANS, 1912 (*Chrysobothris*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 204

Syntypen, Formosa, Kosempo, 10. 1909, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**insulicola** KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 205

Syntypen, Formosa, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*insulicola* KERREMANS, 1912 (*Coracbus*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 205

Syntypen, Formosa, Kosempo, 6. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*intrusus* KERREMANS, 1914 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 105–106  
Sbörn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 43–44  
Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

*iranica* OBENBERGER, 1937 (*Trachys*)  
Sbörn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 43–44  
Syntypen, Iran, Masenderan.  
DEI: 1 Syntypus, Persien, Masendran, leg. REITTER.

*ixion* KERREMANS, 1912–1913 (*Sphenoptera*)  
Monogr. Bupr. 6, 74; Taf. 33, Fig. 3  
Sbörn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 43–44  
Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in Coll. THÉRY, HEYDEN, KRAATZ und KERREMANS.  
DEI: 3 Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, davon 1 Ex. in Coll. HEYDEN.

*judeaeorum* OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)  
Ent. Bl. 10, 253–254

Syntypen, Palästina und Syrien.  
DEI: 1 Paralectotypus, Palaestina, von VOLKOVITSH festgelegt.

*kerremansi* THÉRY, 1927 (*Endelus*)  
Ann. Bull. Soc. ent. Belg. 67, 37; nom. nov. pro *parallelus* KERREMANS, 1913,  
Arch. Nat. 78 A 11 (1912), 116

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.  
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

*kheili* OBENBERGER, 1924 (*Taphrocerus*)  
Sbörn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 2, 55+73–74

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.  
DEI: 1 Syntypus, São Paulo, leg. MRÁZ.

*kleinei* OBENBERGER, 1939 (*Brachys*)  
Arb. morph. tax. Ent. 6, 305–306

2 Syntypen, Costa Rica, in Coll. OBENBERGER; 1 Syntypus, Costa Rica, im Mus. Stettin; 2 Syntypen, Costa Rica, aus Minen von *Calea urticifolia*, 8. 1930, leg. SCHMIDT, im Mus. Stettin und im DEI.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Costa Rica, San José, aus Minen von *Calea urticifolia*, 8. 1930, leg. SCHMIDT.

*lachesis* OBENBERGER, 1924 (*Psiloptera*)  
Arch. Nat. 90 A 3, 64–65

Syntypen, Madagaskar.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Ambanja.

*tata* HEYDEN, 1885 (*Acmaeodera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 29, 287

♂ Syntypen, Namagan, durch STAUDINGER.  
DEI: 2 Syntypen, Turkestan, Namagan, STAUDGR. 85.

*latipennis* OBENBERGER, 1914 (*Latipalpis*)  
Col. Rundsch. 3, 130–131

Syntypen; Griechenland; Kleinasiens, Mersina; Syrien, Aleppo.  
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Aleppo.

*leonhardi* OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)  
Ent. Bl. 10, 252–253

Holotypus, ohne Fundortangaben, in Coll. LEONHARD.  
DEI: Holotypus, Algier, Biskra, ex Coll. LEONHARD.

*leonhardi* OBENBERGER, 1916 (*Chrysobothrys*)  
Wien. ent. Ztg. 35, 261; als var. von *affinis* FABRICIUS beschrieben

2 Syntypen, Bulgarien, Maglie, 7.–8. 1912, leg. HILF, in Coll. LEONHARD.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*leonhardi* OBENBERGER, 1927 (*Sphenoptera*)  
Sbörn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 5, 25–26

Syntypen, Persien, Luristan, Poucht-é Kouh, Bazuft usw.; im Mus. Madrid, Paris und Berlin.  
DEI: 1 Syntypus, Persien, Sultanabad, leg. v. BODEMEYER.

*titura* KIESENWETTER, 1857 (*Agriulus*)  
In: ERICHSON, Naturgesch. Ins. Dtschl. 4, 139–140

Zahlreiche Syntypen, Steyermark, leg. KAHR.  
DEI: 3 Syntypen, Styria, leg. KAHR.

*tugubris* KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 107

♂♂ Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 1909, leg. SAUTER.

*luristana* KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 272—273

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*tusitanica* OBENBERGER, 1914 (*Acmacodra*)  
Ent. Bl. 10, 251—252

Syntypen, Portugal, 3 Ex., in Coll. OBENBERGER, 6 Ex., in Coll. LEONHARD.  
DEI: 4 Paralectotypen, S. Martinho, Portugal, leg. DE BARROS, von VOLKOVITSH festgelegt.

*luteogramma* OBENBERGER, 1923 (*Agrilus*)  
Tijdschr. Ent. 66, 25—26

Syntypen; Cameroon: Ebolowa, 1912; Buea, leg. v. ROTHKIRCH; in den Coll. VAN ROON, STAUDINGER, v. MÜHLHEIM und OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Buea.

*madagascariensis* OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 107

Syntypen, Madagascar, Tananarive.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Tananarive, leg. OLSOUPIEFF.

*maior alpina* OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)  
Arch. Nat. 82 A 11, 26+60; als var. beschrieben

Syntypen; Frankreich, Béziers, Jaén und Kärnten, Gailtal.  
DEI: 1 Syntypus, Gailtal Cr., leg. KLIMSCHE.

*marquardti* OBENBERGER, 1914 (*Agrilus*)  
Cas. Čs. Spol. ent. 11, 41—42+47—48

Einige Syntypen, China, Kiang-si.  
DEI: 1 Syntypus, China; 1 Syntypus, China, Kiangsi, in Coll. HEYDEN.

*massaiica* OBENBERGER, 1917 (*Psiloptera*)  
Col. Rundsch. 6, 86—87

Mehrere Syntypen; Abessinien, Harrar; Deutsch-Ostafrika, Kilimandjaro; einige Ex., in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Abyss., Harrar, coll. PLASON.

*mentor* KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 207

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 9. 1909, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*mesopotamica deserti* OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)  
Arch. Nat. 85 A 3, 129

Syntypen; Transkaspien, Merw; Afghanistan, Kuschke, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Transkaspien, Merw, 1900, ex Coll. HAUSER.

*micans* JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 20, 93

Syntypen, Persien, Astrabad, Coll. GANGLBAUER.  
DEI: 1 Syntypus, Perse, KRAATZ.

*minutus reflexiformis* OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)  
Arch. Nat. 82 A 11, 21+46

Syntypen, Italien, Vallombrosa.  
DEI: 1 Syntypus, Vallombrosa.

*modicus* KERREMANS, 1899 (*Pachyschelus*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 43, 355

Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. PUJOL.  
DEI: 2 Syntypen, Brasil, Jatahy, Prov. Goyas.

*moesta* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 64—65

Syntypen, Persien, leg. CHRISTOPH, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Persien.

*mongolica* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Rev. d'Ent. 6, 115

2 ♀♀, Syntypen, Nordchina, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, China, (Janowl.) KRTZ., in Coll. HEYDEN.

*monstruosa* KERREMANS, 1908 (*Psiloptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 61, Fig.

♂ Holotypus, Benguella, leg. WELLMAN, im DEI.

**mossulensis** OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)  
Arch. Nat. 85 A 3, 118–119

Zahlreiche Syntypen, Mesopotamien, Mossul, 5. 1909, leg. HAUSER, in Coll. BREIT, KNIRSCH, OBENBERGER, WINKLER usw.  
DEI: 2 Syntypen, Mesopotamien, Assur., 5. 08.

**mrazi** OBENBERGER, 1922 (*Callimicra*)  
Arch. Nat. 88 A 12, 162–163

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.  
DEI: 2 Syntypen, São Paulo, leg. MRÁZ.

**mrazi** OBENBERGER, 1924 (*Taphrocerus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 2, 49, 63

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.

**multeri** THÉRY, 1925 (*Agriulus*)  
Ent. Mitt. 14, 163–165

Syntypen, Neu Guinea, in Coll. THÉRY und im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES.

**multeri** THÉRY, 1925 (*Corocbus*)  
Ent. Mitt. 14, 162–163

Neu Guinea; 1 Syntypus, in Coll. THÉRY, 2 Syntypen, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES.

**myrmido** KERREMANS, 1912 (*Agriulus*)

siehe *achilleus* OBENBERGER, 1935

**nigra** KERREMANS, 1897 (*Callimicra*)

Mem. Soc. ent. Belg. 6, 144

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. PUJOL.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyas.

**nigricinctus** KERREMANS, 1912 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 206

Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**nigriventris** THÉRY, 1928 (*Chrysobothris*)  
Ent. Mitt. 17, 76–77, Fig. 1

Holotypus, Brasilien, Staat São-Paulo.  
DEI: Holotypus, Est. São Paulo, Guaruja, 3. 1923, leg. MELIN.

**nigrojubata** ROUBAL, 1913 (*Anthaxia*)  
Col. Rundsch. 2, 33–34

Einige Syntypen, Nordkaukasus, Frühling 1912, leg. ROUBAL; 1 Syntypus, Syrien, leg. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Ca. b. Teberda, 6. 1912, leg. ROUBAL.

**obesa beirae** OBENBERGER, 1926 (*Sphenoptera*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 4, 37

Syntypen, Beira.  
DEI: 1 Syntypus, Beira, leg. BODONG.

**obesa benningseni** THÉRY, 1936 (*Sphenoptera*)  
Arb. morph. tax. Ent. 3, 294+295, Fig. 3

♀ Holotypus, Dar es Salaam, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

**obnotatus** KERREMANS, 1912 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 78 A 7, 208

Syntypen; Formosa, Kosempo, 8. 1909; Taihorinsho, 7. 1909, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 8. 1909, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 8., leg. SAUTER.

**ogloblini** OBENBERGER, 1934 (*Taphrocerus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 12, 23+53

Syntypen, Argentinien, Missiones-Loreto, Sta Anna, leg. OGLOBLIN.  
DEI: 2 Syntypen, Arg., Loreto, 3., leg. OGLOBLIN.

**omissus** KERREMANS, 1914 (*Agriulus*)

Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 106  
Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

**onopordi costifera** OBENBERGER, 1919 (*Julodis*)  
Bull. Soc. ent. France 1919, 142

Mehrere Syntypen, Anti Taurus, Eibes, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Eibes, Antitaur.

***onopordi obsoletesulcata*** OBENBERGER, 1917 (*Julodis*)

Col. Rundsch. 6, 47

Mehrere Syntypen; Kleinasien, Amasie; Syrien, Nubien; in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, As.m., Amasia.***oporina*** JAKOWLEFF, 1903 (*Sphenoptera*)

Rev. Russe d'Ent. 3, 386—387

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, Transcaucasien, Elisabethpol, 25. 11. 1902, leg. MALUSHENKO.  
DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Elisabethpol, 15. 11. 1902, leg. MALJUSHENCO.***orbicularis*** KERREMANS, 1892 (*Parataenia*)

Ann. Soc. ent. Belg. 36, 55

20 Syntypen, Alt-Calabor, Gabon und Sierra-Leone; im Mus. Brüssel, in Coll. OBERTHÜR, MEYER-DARCIS und KERREMANS.  
DEI: 1 Syntypus, Old Calabor, MEYER-DARCIS.***ordubadensis*** OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)Wien. ent. Ztg. 35, 250<sup>1</sup>Einige Syntypen, Russisch-Armenien, Ordubad, am Araxes, leg. VESELY, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Araxes, leg. VESELY.***orestes*** KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 113

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.***paganettii*** OBENBERGER, 1913 (*Agrilus*)

Col. Rundsch. 2, 30—31

3 Syntypen, Calabria Antonimina, Mte. Conevo, Prov. di Ancona, leg. PAGANETTI, in Coll. PAGANETTI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***paganettii*** OBENBERGER, 1914 (*Cyphosoma*)

Col. Rundsch. 3, 115, Textfig.

3 Syntypen, Korfu, leg. PAGANETTI, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. PAGANETTI.***papua*** OBENBERGER, 1940 (*Endelus*)

Časopis 37, 32

Syntypen, Nova Guinea.  
DEI: 1 Syntypus, N. Guinea.***paracuspidatus*** OBENBERGER, 1939 (*Agrilus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 17, 15—16

Syntypen, Transvaal, Olifants Nek, leg. BAUM.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***parallelus*** KERREMANS, 1913 (*Endelus*)siehe *kerremansi* THÉRY, 1927***parnassia*** JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 21, 74—75

Syntypen, Parnass, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Parnass, 1. 6. 1855.***paulensis*** OBENBERGER, 1924 (*Paragrilus*)

Arch. Nat. 90 A 3, 142—143

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.  
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.***persuperba*** OBENBERGER, 1912 (*Anthaxia*)

Wien. ent. Ztg. 31, 159—160

6 Syntypen, Algérie, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Afr. du Nord, Algérie.***pertristis*** OBENBERGER, 1933 (*Agrilus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 11, 40

Syntypen, Brasilia, Santa Catharina, Bahia, leg. FRIUHSTORFER.  
DEI: 1 Syntypus, Bresil.***piceolus*** OBENBERGER, 1925 (*Pachyschelus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 117

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.***pilosula*** JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 21, 69—70

♀ Syntypen, Carthagena, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Carthagena, HANDSCHUCH, in Coll. HEYDEN.

***plantivorus*** OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 112

Syntypen, Madagascar; Tananarive, Ambodirano, Tanovano, Perinet etc.  
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Tananarive, leg. OLSONIEFF.***prava*** KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 278–279

♂ Syntypen, Asie mineure, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 1 Syntypus, Klein-Asien, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER, in Coll. HEYDEN.***preissi*** OBENBERGER, 1923 (*Lius*)

Ent. Bl. 19, 122

Zahlreiche Syntypen, Brasilien, São Paulo, durch PREISS, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, São Paulo.***priamus*** KERREMANS, 1912 (*Agrylus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 207–208

Syntypen, Formosa, Kosempo und Alikang, 9.+10. 1909, 8. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Alikang, 10. 1909, leg. SAUTER; 6 Syntypen, Formosa, Kosempo, 9. 1909, leg. SAUTER; 4 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 1911, leg. SAUTER.***priamus*** OBENBERGER, 1926 (*Sphenoptera*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 4, 33–34

Syntypen; Transvaal; Kap Kolonie; Rhodesien; Süd-Afrika.  
DEI: 3 Syntypen, Transvaal; 80 Syntypen, ohne Fundortangaben, Coll. KRAATZ.***problematica*** OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)

Arch. Nat. 82 A 11, 26+60–61, Fig. 28c

Syntypen; Preußen; Sachsen; Niederösterreich; Frankreich; Kleinasien.  
DEI: 1 Syntypus, Dresden; 1 Syntypus, Prussia.***profusa*** KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 277–278

Holotypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, im DEI, in Coll. HEYDEN.

***psittactina*** HEYDEN, 1887 (*Anthaxia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 303

Syntypen, Amur, Nebenfluß Suyfun, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 2 Syntypen, Amur, Suyfun, KOLTZE, in Coll. KOLTZE und HEYDEN.***puebla*** OBENBERGER, 1916 (*Acmaeodera*)

Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 9–10

Mehrere Syntypen, Mexico, Necaxa, Puebla.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Necaxa (Puebla), leg. HEINE.***pyrethri*** STIERLIN, 1863 (*Cylindromorphus*)

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow 36, 491

Syntypen, Sarepta.

DEI: 1 Syntypus, Sarepta.

***pyrrhus*** KERREMANS, 1912 (*Agrylus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 112–113

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 9. 1909, leg. SAUTER.***radiolus*** KERREMANS, 1912 (*Agrylus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 113–114

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.***ranguoni*** KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 273–274

24 Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 7 Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER; 3 Ex., in Coll. HEYDEN.***robusta duboisi*** CAZIER, 1939 (*Acmaeodera*)

Bull. S. Calif. Acad. Sci. 37 (1938), 138–140

♀ Holotypus, California, Death Valley, Fumace Creek, 14. 4. 1938, an *Prosopis juliflora glandulosa*, leg. DU BOIS, in Coll. CAZIER. 427 Paratypen, vom selben Fundort, leg. DUBOIS, WHITE und WOOLEY.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.***rollei*** KERREMANS, 1908 (*Stigmodera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 63–64

Syntypen, Queensland, leg. ROLLE, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Queensland, Cairns, Kuranda, ROLLE.

***roscidinus*** OBENBERGER, 1923 (*Agrylus*)

Tijdschr. Ent. 66, 18–19

Syntypen; Cameroone, Duala b. Victoria, 1. 1. 1913, leg. v. ROTHKIRCH, in den Coll. VAN ROON, STAUDINGER, V. MÜHLHEIM und OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Duala.

*rossicus* OBENBERGER, 1916 (*Agriulus*)

Wien. ent. Ztg. 35, 276

Mehrere Syntypen, Südrußland, Sarepta, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 3 Syntypen, Sarepta.*rothkirchi* OBENBERGER, 1923 (*Agriulus*)

Tijdschr. Ent. 66, 24, Textfig.

Syntypen; Cameroon; Tiko b. Victoria, Ebolowa, Buea, Duala, 1912, 1913, leg. v. ROTHKIRCH, in den Coll. VAN ROON, v. MÜHLHEIM, STAUDINGER und OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Buea.*roubali* OBENBERGER, 1913 (*Pachyschelus*)

Casopis 10, 91—94+100—102

Mehrere Syntypen, Algier-Grandin.  
DEI: 1 Syntypus, Alger., ex. Coll. OBENBERGER.*rugosipennis* OBENBERGER, 1916 (*Meliboeus*)

Wien. ent. Ztg. 35, 268

Holotypus, Nordafrika, wahrscheinlich Ägypten, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: Holotypus, Ägypt. mer.*sachtlebeni* OBENBERGER, 1958 (*Vanroonia*)

Acta ent. Mus. nat. Pragae 32, 506, 508—509

Holotypus, 1 Paratypus, Prins Frederic Island, Niedl. Neu Guinea; Holotypus, im DEI; Paratypus, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: Holotypus, Idenburg-riv., Seitenfluß des Mamberamo, Neu Guinea, 1911, leg. TER POORTEN.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Agriulus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 206

Syntypen, Formosa, Kosempo, 6. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Chrysobothris*)

Arch. Nat. 78 A 7, 204

Syntypen, Formosa, Kosempo, 10. 1910 und 7. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 1911, leg. SAUTER.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Coraebus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 205

Syntypen, Formosa; Anping, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Endelus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 209

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. 1909, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 9., leg. SAUTER.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Philanthaxia*)

Arch. Nat. 78 A 11, 110—111

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 1912, leg. SAUTER.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Sambus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 112

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.*sauteri* KERREMANS, 1912 (*Trachys*)

Arch. Nat. 78 A 7, 209

Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 1909, 8. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER.*scheibeii* THÉRY, 1936 (*Anthonaxia*)

Arb. morph. tax. Ent. 3, 188—190, Fig. 9

Holotypus, Hindukusch, Parigil und Patscheigil, 12. 7. 1935, im DEI.

*schenklingi* KERREMANS, 1908 (*Psiloptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 62—63

3 Syntypen, Benguella, leg. WELLMAN, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Benguella, leg. WELLMAN.*schmidti* OBENBERGER, 1939 (*Agriulus*)

Arb. morph. tax. Ent. 6, 302—303

Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, leg. SCHMIDT, im DEI, 1 Ex., im Mus. Stettin, 3 Ex., Coll. OBENBERGER.  
DEI: 5 Syntypen, C. R., La Caja, 8 km w. San José, 1930, leg. SCHMIDT.*schmidti* OBENBERGER, 1939 (*Brachys*)

Arb. morph. tax. Ent. 6, 306—308

2 Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, leg. SCHMIDT, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, 1 ♂, 1934; leg. SCHMIDT.

**schmidti** OBENBERGER, 1939 (*Pachyschelus*)  
Arb. morph. tax. Ent. 6, 309–310

2 Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. von San José, leg. SCHMIDT, im DEI.

**sculpticollis** HEYDEN, 1886 (*Sphenoptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 30, 278

2 Syntypen, Kleinasien, Malatia, in Coll. HEYDEN und KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Mesopotam., Malatia, STAUDGR. 85, in Coll. HEYDEN; 1 Syntypus, Malatia, KRAATZ.

**senilis** KERREMANS, 1914 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 107

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

**sicelidus** OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)  
Wien. ent. Ztg. 35, 251–252

2 ♂♂, Syntypen, Girgenti in Sizilien, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Girgenti.

**siva** OBENBERGER, 1916 (*Agriulus*)  
Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 14

Einige Syntypen, Süd-Ostindien, Shembaganur, durch HEYNÉ.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**sommeri** OBENBERGER, 1940 (*Endelus*)  
Časopis 37, 29–30

Syntypen, Nova Guinea.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea.

**sorocinus** KERREMANS, 1914 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 106–107

Syntypen, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 7. 7. 1912, leg. SAUTER.

**sphaerocephala** JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 54–55

Syntypen, Syrien, leg. LEDERER, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Syria, Haifa.

**spiridion** KERREMANS, 1912 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 114–115

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

**staudingerina** OBENBERGER, 1917 (*Psiloptera*)  
Ent. Bl. 13, 278–279

Ca. 90 Syntypen, Madagaskar, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 3 Syntypen, Delagoa Bay.

**strigosa** JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 71–73

Syntypen, Turkestan, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Samarkand.

**sturanyii** OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)  
Col. Rundsch. 3, 132

Syntypen, Albanien, Oroschi, leg. RAMBOUSEK, in Coll. OBENBERGER, RAMBOUSEK, LEONHARD.  
DEI: 1 Syntypus, Merdita, Oroschi.

**subsulcata** KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 282

Syntypen, Persien, Luristan, leg. V. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, in Coll. HEYDEN.

**sumatrensis** KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 40

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 3 Syntypen, Sumatra.

**surrubrensis** OBENBERGER, 1917 (*Agriulus*)  
Ent. Bl. 13, 182

Mehrere Syntypen, Costa Rica, 300', Surrubres, leg. HEYNÉ; ein Ex. in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**talysschensis** OBENBERGER, 1917 (*Agriulus*)  
Wien. ent. Ztg. 36, 215–216

Syntypen, Talyssch, leg. KORB, in Coll. OBENBERGER,

DEI: 1 Syntypus, Kaspia, Talyssch, 1897.

*temporalis* OBENBERGER, 1934 (*Taphrocerus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 12, 24+51—52

Syntypen, Argentinien, Missiones, Santa Anna, leg. OGLOBLIN.  
DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Missiones Santa Anna, leg. ČERNOSVITOV.

*tenebricosa bucharica* OBENBERGER, 1945 (*Capnodis*)  
Acta ent. Mus. nat. Pragae 23, 18—19

Syntypen; Asie centrale: Buchara or.; Tchitchantan, leg. HAUSER; Turkestan, Monts Alexandre; Buchara occ.; Samarkande; Monts Sussamyr, Ketmen Tjube, leg. HAUSER; Tokmak.  
DEI: 1 Syntypus, Samarkand.

*theryi* OBENBERGER, 1924 (*Taphrocerus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 2, 52+67

Syntypen, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.  
DEI: 1 Syntypus, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

*thoracica* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 21, 80—81

♀ Syntypen, Kaukasus, Mingrélie, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Mingrélie, in Coll. HEYDEN.

*tibialis* JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)  
Horae Soc. ent. Ross. 20, 88—89

Syntypen, Tourkestan, Alai, in Coll. HEYDEN.  
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Alai, in Coll. HEYDEN.

*transversus* KERREMANS, 1899 (*Brachys*)  
Ann. Soc. ent. Belg. 43, 354

Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. PUJOL.  
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy.

*tristis* KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)  
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 38—39

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DEI: 12 Syntypen, Sumatra.

*tyndarus* KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 115

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.  
DEI: 5 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

*tyrtaeus* KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 113

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

*uhmanni* OBENBERGER, 1939 (*Leiopleura*)  
Arb. morph. tax. Ent. 6, 308—309

Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, aus einer *Ficus*-Art gezogen, leg. SCHMIDT, im DEI.  
DEI: 15 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*ukerewensis* OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)  
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 17—18

Syntypen, Afrika, Ukerewe.  
DEI: 1 Syntypus, Ukerewe.

*uneta* KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 277

Holotypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

*ussuriensis* OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)  
Wien. ent. Ztg. 33, 116

Syntypen, Amurgebiet, Ussuri, leg. KASSAKIEWITSCH.  
DEI: 1 Syntypus, Ussuri-Geb., 1907, leg. KASAKEWITSCH KORB.

*vejdovskiyi* OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)  
Rozpravy král. české Akad. Nauk 23, Třída II, čísł. 31, 19

♂ Syntypen, Algier.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Alg., Hamman Rirha ?.

*viduus* KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)  
Arch. Nat. 79 A 8(1913), 105

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1912, leg. SAUTER.

*viridicyanea* KRAATZ, 1896 (*Pseudocastalia*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 86—87

♂ Holotypus, Zanzibar, Mpuapua, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

**viridis** KERREMANS, 1900 (*Coraebus*)  
Mém. Soc. ent. Belg. 7, 13–14

Ca. 20 Syntypen, Sumatra, Hindrapoera, leg. WEYERS.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS.

**vismiae** OBENBERGER, 1939 (*Pachyschelus*)  
Arb. morph. tax. Ent. 6, 311–312

Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km w. von San José, aus Minen vón *Vismia* spec., leg. SCHMIDT, im DEI.

**wellmani** KERREMANS, 1908 (*Psiloptera*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 63

Mehrere Syntypen, Benguella, leg. WELLMAN, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Benguella, leg. WELLMAN.

**weyersi** KERREMANS, 1900 (*Agriulus*)  
Mém. Soc. ent. Belg. 7, 23

Syntypen, Sumatra, Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

**wiecheltii** KERREMANS, 1908 (*Agelia*)  
Monographie des Buprestides 3, 224–225; Taf. 18, Fig. 6

♂♂ Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Outjo, in Coll. KERREMANS.  
DEI: 1 Syntypus, DSW-Afr., Outjo.

**winkleri** OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)  
Ent. Bl. 10, 255–256

Syntypen, Syrien, Aleppo.  
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Aleppo.

**xantippus** KERREMANS, 1912 (*Agriulus*)  
Arch. Nat. 78 A 11, 115–116

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.  
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

**yunnanica** OBENBERGER, 1935 (*Sambus*)  
Cas. Cs. Spol. Ent. 32, 15

Syntypen, China, Yunnan.  
DEI: 2 Syntypen, China, Prov. Yunnan, Vallis flumin., Soling-ho.

**zarathustrae** OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)  
Arch. Nat. 85 A 3, 107–108

Syntypen, Persien, Ala-Dagh, Budschnurd, 1033 m, 6. 1902, leg. HAUSER.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**zonifali** OBENBERGER, 1914 (*Julodis*)  
Col. Rundsch. 3, 112–113

Holotypus, Kaukasus, Ararat, in Coll. OBENBERGER.  
DEI: Holotypus, Caucasus.

#### Wahrscheinlich nicht beschrieben:

**aeneipes** OBENBERGER (*Julodella*)

DEI: 1 Ex., Persien, Pers. Golf, Buschir., als Cotypus ausgezeichnet.

**bhadrawatensis** OBENBERGER (*Trachys*)

DEI: 1 Ex., India mer., Tanjore Distr., Bhadrawati, als Typus ausgezeichnet.

**bodemeyeri** KERREMANS (*Acmaeodera*)

DEI: 3 Ex., Elburs-Gebirge, Iran, Nord-Persien, leg. v. BODEMEYER, als Typen ausgezeichnet.

**bytinskii** OBENBERGER (*Hoplistura*)

DEI: 1 Ex., Palestine, Bir Rechne ?, 6. 6., an *Tamarix*, leg. BYTINSKI-SALZ, als Cotypus ausgezeichnet.

**bytinskii** OBENBERGER (*Sphenoptera*)

DEI: 1 Ex., Palestina, Bersheba, 23. 6., an *Syapsaphila*, leg. BYTINSKI-SALZ, als Paratypus ausgezeichnet.

**fastuosus** OBENBERGER (*Sambus*)

DEI: 1 Ex., China, Prov. Yunnan, Vallis flumin., Soling-ho, als Cotypus ausgezeichnet.

**ferganensis** REITTER (*Anthaxia*)

DEI: 1 Ex., Costa Rica, 26. 2. 1924, leg. NEVERMANN, als Paratypus ausgezeichnet.

**gebieni** THÉRY (*Actenodes*)

DEI: 1 Ex., N. Guinea, Astrolabe-B., leg. RHODE, als Typus ausgezeichnet.

**gloriosa** KERREMANS (*Iridotaenia*)

DEI: 1 Ex., N. Guinea, Astrolabe-B., leg. RHODE, als Typus ausgezeichnet.

***hackeri*** KERREMANS (*Agriulus*)

DEI: 1 Ex., N. S. W., Tweed R., W. W. F., 18. 10. 1901, als Typus ausgezeichnet.

***hilaris*** DANIEL (*Anthaxia*)

DEI: 1 Ex., Asia Minor, Bozanti-Thal, leg. v. BODEMEYER, als Typus ausgezeichnet.

***holdhausi*** OBENBERGER (*Julodis*)

DEI: 2 Ex., ohne Fundortangaben, als Cotypen ausgezeichnet.

***leonhardi*** OBENBERGER (*Agriulus*)

DEI: 1 Ex., Ost Sibirien, Schilka-Gebirge, leg. v. BODEMEYER, als Cotypus ausgezeichnet.

***micropoecilus*** OBENBERGER (*Agriulus*)

DEI: 1 Ex., Brasilien, Rondon, 24°38' B, 54°07' L, 500 m, leg. PLAUMANN, als Cotypus ausgezeichnet.

***nevermanni*** THÉRY (*Lius*)

DEI: 2 Ex., Costa Rica, 24. 5. 1925, leg. NEVERMANN, als Cotypen ausgezeichnet.

***nodieri*** THÉRY (*Leiopleura*)

DEI: 1 Ex., Costa Rica, 16. 11. 1924, leg. NEVERMANN, als Paratypus ausgezeichnet.

***obesa*** JAKOWLEFF (*Sphenoptera*)

DEI: 1 Ex., Persien, Luristan, leg. von BODEMEYER, als Typus ausgezeichnet.

***paulensis*** OBENBERGER (*Agriulus*)

DEI: 2 Ex., Brasilia, Sao Paulo, leg. MRÁZ, als Typen ausgezeichnet.

***peruviana*** KERREMANS (*Chrysobothris*)

DEI: 1 Ex., Peru, Pozuzo, als Cotypus ausgezeichnet.

***plaumanniellus*** OBENBERGER (*Agriulus*)

DEI: 1 Ex., Brasilien, Rondon, 24°38' B, 54°07' L, 500 m, leg. PLAUMANN, als Cotypus ausgezeichnet.

***rondicus*** OBENBERGER (*Agriulus*)

DEI: 1 Ex., Brasilien, Rondon, 24°38' B, 54°07' L, 500 m, leg. PLAUMANN, als Cotypus ausgezeichnet.

***sulcicollis*** KERREMANS (*Cisseis*)

DEI: 1 Ex., S. Australien, Finke Revier, als Typus ausgezeichnet.

***tananaicensis*** OBENBERGER (*Trachys*)

DEI: 1 Ex., Madagaskar, Tananarive, 193, leg. OL'SOUIEFF, als Typus ausgezeichnet.

***transvaalensis*** OBENBERGER (*Acmocadera*)

DEI: 1 Ex., Transvaal, Coll. OBENBERGER, als Typus ausgezeichnet.

***trichelytrius*** OBENBERGER (*Pachyseclus*)

DEI: 1 Ex., Rio Caraguata, Mato Grosso, 3. 1953, als Cotypus ausgezeichnet.

***volatrix*** OBENBERGER (*Psiloptera*)

DEI: 1 Ex., Joko, Sd. Kamerun, HEYNÉ, als Paratypus ausgezeichnet.

***zubaei*** OBENBERGER (*Trachys*)

DEI: 1 Ex., N. Guinea, als Typus ausgezeichnet.

**Phylloceridae*****dimidiatus*** SCHWARZ, 1906 (*Plastocerus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 158

Holotypus, Peru, Pachitea, im DEI.

***nigricollis*** SCHWARZ, 1902 (*Dodecacius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 154

♀ Holotypus, Peru, Chanchamayo, durch LANGE, im DEI.

***ruficollis*** SCHWARZ, 1902 (*Plastocerus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 200—201

Syntypen, Ecuador: Santa Inéz; Napo.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH; 1 Syntypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH.

**Dicronychidae*****alternatus*** SCHWARZ, 1906 (*Dicronychus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 370

♂ Syntypen, Delagoa-Bai.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Delagoa Bai, leg. SCHNEIDER.

**ambiguus** SCHWARZ, 1903 (*Dicronychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 365–366

♂♀ Syntypen, Congo Franç., Benito.  
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Congo Franç., Benito.

**bipectinatus** SCHWARZ, 1896 (*Dicronychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 94

♂♂ Syntypen, Afrika, Niam-Niam.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Njam-Njam.

**crassipes** SCHWARZ, 1905 (*Dicronychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 282–283

Syntypen, S. Thomé.  
DEI: 1 Syntypus, S. Thomé.

**ferrugineus** SCHWARZ, 1906 (*Tarsalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 369

♂♂ Syntypen, Deutsch Südwest-Afrika.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, D.-Sw.Afr.

**granifer** SCHWARZ, 1896 (*Tarsalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 92

♂♂ Syntypen, Ost-Afrika, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN.

**pectinicornis** SCHWARZ, 1896 (*Tarsalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 91–92

♂♀ Syntypen, Ost-Afrika, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Dar-es-Salaam.

**prosternalis** SCHWARZ, 1906 (*Dicronychus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 370

Syntypen, Kamerun, Victoria.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kamerun, Victoria.

**schniederi** SCHWARZ, 1906 (*Tarsalus*)  
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 370

Syntypen, Delagoa-Bai.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Delagoa-Bai, leg. SCHNEIDER.

## Dascillidae

**mongolicus** HEYDEN, 1889 (*Dascillus*)  
Horae Soc. ent. Ross. 23, 675–676

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kan-ssu, 16.–17. 6., 5.–9. 7. 1885, leg. POTANIN.  
DEI: 2 Syntypen, Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, in Coll. HEYDEN.

## Helodidae

**corsicus** NYHOLM, 1964 (*Cyphon*)  
Opusc. ent. 29, 54, Fig. 6, 12, 18

8 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Korsika, teils ohne nähere Fundortangaben, teils Vizzavona.  
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Corse, leg. CROISSANDEAU.

**designandus** NYHOLM, 1957 (*Cyphon*)  
Ent. Tidskr. 78, 78

♀ Holotypus, Macedonia, Bitola, Perister, 28. 7. 1909, leg. RAMBOUSEK, im DEI.

**exotica** CHAPIN, 1927 (*Ptilodactyla*)  
Trans. Amer. Ent. Soc. 53, 246–247

♂ Holotypus, 115 ♂♂, Paratypen, USA, Melrose Park, Ill., im Rosengewächshaus, 11. 1926, leg. COMPTON; Holotypus (Cat. Nr. 40348), 60 Paratypen, im U.S.N.M.; weitere Paratypen, im Mus. Comp. Zool., Am. Mus. Nat. Hist., Acad. Nat. Sc., Philadelphia, Ill. St. Labor. Nat. Hist., Cal. Acad. Sc., British Mus. und DEI.  
DEI: 1 Paratypus, Melrose Park, 3. 11. 1926, in greenhouse; 1 Paratypus, Melrose Park, bench soil rose house, 1. 12. to 17. 3. 1926, leg. COMPTON.

**formosanus** PIC, 1918 (*Cyphon*)  
Mélanges exot. ent. 27, 3

Syntypen, Formosa.  
DEI: 9 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 10. 1911, leg. SAUTER.

**friesei** KLAUSNITZER, 1969 (*Cyphon*)  
Beitr. Ent. 19, 840–841, Fig. 1–2

♂ Holotypus, Albanien, Borshi südlich Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.–27. 5. 1961; 2 ♂♂, Paratypen, Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit *Olea* und *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. 5. 1961; alle Albanien-Expedition des DEI; Holotypus, 1 Paratypus, im DEI; 1 Paratypus, in Coll. KLAUSNITZER.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*fulviculus* REITTER, 1898 (*Scyrtes*)  
Wien. ent. Ztg. 17, 121

Zahlreiche Syntypen, Lenkoran, leg. KORB.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Typus, Kasp. Meer-Geb., Lenkoran, 1897, leg. KORB.

*klapperichi* PIC, 1954 (*Ptilodactyla*)  
Bull. Soc. ent. Mulhouse 1954, 65

Zahlreiche Syntypen, China, Fukien, 18. 5. 1946, 10, 10, 1946, in Coll. KLAPPERICH und PIC.  
DEI: 1 Syntypus, China, Fukien, Kuatun, 22. 5. 1946, leg. TSCHUNG SEN.

*malabarensis* PIC, 1938 (*Ptilodactyla*)  
Arb. morph. tax. Ent. 5, 333

Holotypus, Paratypen, Indien, Malabar, 1600 m, 26. 12. 1920. Holotypus, Paratypus, im DEI, Paratypus, in Coll. PIC.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*schwabei* PIC, 1938 (*Cyphon*)  
Arb. morph. tax. Ent. 5, 332—333

Holotypus, Paratypen, Chili, Puerto Puyuhuapi, an einem Gletscherfluß, 10—100 m, 27. 12. 1937, leg. SCHWABE, im DEI;  
Paratypus, in Coll. PIC.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*tournieri africanus* KLAUSNITZER, 1972 (*Helodes*)  
Ent. Nachr. 16, 70—71

♂ Holotypus, Tunis, DESBROCH., Coll. HEYDEN, im DEI.

### Dryopidae

*abditus* HINTON, 1937 (*Cylloepus*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 106—108, Fig. 13—16

♂ Holotypus, 56 Paratypen, Mexico, Distr. Temascaltepec, Tejupilco, 4000 Fuß, 7. 1934, leg. HINTON; 1 Paratypus, vom gleichen Fundort, 16. 6. 1933. Holotypus, Paratypen in Coll. HINTON; 1 Paratypus, im DEI, 2 Paratypen, im U.S.N.M.  
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*angusta* HINTON, 1937 (*Sostea*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 94—96

Holotypus, Brazil, Sao Paulo, ex Coll. MELZER, im DEI.

DEI: Holotypus, Bras., Sao Paulo, leg. MUUS & MELZER.

*clavipes* HINTON, 1937 (*Pelonomus*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 99—100

♂ Holotypus, Brazil, Sao Paulo, 3. 11. 1924, leg. MELZER, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Brasilien, S. Paulo, Est. S. Paulo, 3. 2. 1924, leg. MELZER.

*doderoi* BOLLOW, 1936 (*Dryops*)

Ent. Bl. 32, 156—157; Taf. 4, Fig. 3, 3a; Taf. 4, Fig. 4; Taf. 5, Fig. 3

♂ Holotypus, Neapel, 6. 9. 1869, Coll. KRAATZ, im DEI; 58 Paratypen; Italien, Neapel; Messira, Catania; Spanien, Toledo; Tanger; Marocco, Oran; im DEI und Coll. BOLLOW.

DEI: ♂ Holotypus, 3 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Neapel, 6. 9. 1869, Coll. KRAATZ.

*foveicollis* BOLLOW, 1938 (*Freyiella*)

Mitt. Münch. ent. Ges. 28, 169—172, Abb. 19—27

Holotypus, 75 Paratypen, Süd-China, Prov. Kuangtung, Ostfluß im Berggebiet Wang-lung-kum; Holotypus, im Mus. Berlin.

DEI: 3 Paratypen, China, Kuangtung, Wang-lung-kum, Berggebiet d. Lo-fau-zan, am Ostfluß, 4.—5., 12, leg. MELL S. V.

*gracilis discretus* BOLLOW, 1936 (*Dryops*)

Ent. Bl. 32, 156; Taf. 5, Fig. 3

♂ Holotypus, Tunis, ROLPH, im DEI; 5 ♂♂, Paratypen, Oran, Tunis.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Oran, Coll. KRAATZ; der Holotypus befindet sich nicht in unserer Sammlung.

*hintoni* BOLLOW, 1940 (*Helichus*)

Mitt. Münch. ent. Ges. 30, 32—34; Abb. 246—253; Taf. 5, Fig. 5; Taf. 6, Fig. 3

Holotypus, 5 Paratypen, Kaukasus, Elisabethpol. Holotypus, Paratypen, in Coll. BOLLOW, Paratypen, im DEI und Coll. HINTON.

DEI: 1 Paratypus, Caucasus, Elisabetpol, leg. BABADJANIDES.

*horioni* ILLIES, 1953 (*Lathelmis*)

Ent. Bl. 49, 179—180; Abb. 2, Fig. 9; Abb. 3

♂ Holotypus, Moravia, REITTER; 1 ♂, Paratypus, ohne Fundortangaben, Coll. SCHNEIDER-KELCH, im DEI; 1 ♂, Paratypus, ohne Fundortangaben, in Coll. Bayer. Zool. Staats.

DEI: ♂ Holotypus, Moravia, leg. REITTER; 1 Paratypus, ohne Fundortangaben, Coll. SCHNEIDER-KELCH.

*horni* HINTON, 1937 (*Cylloepus*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 109, Fig. 17, 18

♂ Holotypus, Mexico, Distr. de Temascaltepec, Tejupilco, unter 4000 Fuß, 7. 1934, leg. HINTON, in Coll. HINTON; 2 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Mexico, Sierra de Durango, 1922, Coll. SCHAUFUSS; 1 ♂, Paratypus, in Coll. HINTON; 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Sierra de Durango, 1922, leg. SCHAUFUSS.

**humeralis** CARTER, 1929 (*Notriolus*)  
Austr. Zool. 6, 65–66; Taf. 4, Fig. 25

Holotypus, Paratypen, N. S. Wales: 18 Ex., Eccleston, Allyn River; 5 Ex., Williams River, Dungog und Dorrigo; leg. HERON. Holotypus, in Coll. CARTER.  
DEI: 2 Paratypen, N.S.W., Dorrigo, leg. HERON.

**konoi** BOLLOW, 1940 (*Helichus*)  
Mitt. Münch. ent. Ges. 30, 52–55, Abb. 279–295

♂ Holotypus, 63 Paratypen, Formosa, Anping, Hailo, in Coll. FREY und im DEI.  
DEI: 38 Paratypen, Formosa, Anping, 35 Ex., 22. 6. 1912, 1 Ex., 22. 5. 1912, 1 Ex., 7. 1912, 1 Ex., 5. 1911, leg. SAUTER.

**leblanci** PEYERIMHOFF, 1929 (*Stenelmis*)  
Bull. Soc. ent. Fr. 1929, 171–172

Syntypen, Süd-Algerien, Tassili occidental, Tin-Tahart, 850 m, April.  
DEI: 2 Syntypen, Tassili ouert, Tin Tahart, 24., 25. 4. 1925.

**marginatus** KONO, 1934 (*Grouvelleus*)  
Insect. matsum. 8, 127

5 Syntypen, Shikoku, Koyadaira, 23.–29. 7. 1913, leg. GALLOIS; 1 Syntypus, Kiushu, Kumamoto, 3. 9. 1907, leg. KAWAMURA, Mus. Sapporo.  
DEI: 3 Syntypen, Japan, Shikoku, Awa Kayadaira, 31. 7. 1913, leg. GALLOIS.

**musgravei** HINTON, 1935 (*Helichus*)  
Pan-Pacif. Ent. 11, 69; Taf. 1, Fig. D

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Mexico, Distr. of Temascaltepec, Real de Arriba, 5.–7. 1933, 6000–7000 Fuß, leg. USINGER, im U.S.N.M. Paratypen, Mexico, Tejupilco, Juni, 4000 Fuß.  
DEI: 1 Paratypus, Mexico, Real de Arriba, Temescaltepec, 22. 5. 1933, leg. HINTON & USINGER.

**nevermanni** HINTON, 1936 (*Stenelmis*)  
Trans. Ent. Soc. London 85, 424–426; Taf. 1, Fig. 1; Textfig. 18–20

♂ Holotypus, Costa Rica, Reventazon, lux., 1. 11. 1934, leg. NEVERMANN, in Coll. HINTON; 12 Paratypen, vom gleichen Fundort, 11. 1931; 2. 1932; 7. und 11. 1934.  
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, lux. 29. 11. 1931, leg. NEVERMANN.

**proximus** HINTON, 1937 (*Cylloepus*)  
Arb. morph. tax. Ent. 4, 106, Fig. 11

♂ Holotypus, Mexico, Necaxa, Puebla, leg. HEINE, im DEI.

**punctatellus** BOLLOW, 1936 (*Dryops*)  
Ent. Bl. 32, 56–57; Taf. 1, Fig. 8, 8a; Taf. 2, Fig. 7

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Turkestan, Kulias, Ak-sou-Thal, 1898, leg. HAUSER, im DEI; 1 Paratypus, in Coll. BOLLOW.  
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, Prov. Kuljab, Ak-sou-Thal, 1898, leg. HAUSER.

**punctatosstriatus** BOLLOW, 1940 (*Grouvelinus*)  
Arkiv Zoologi 32 A, Nr. 13, 32–35, Abb. 61–67

♂ Holotypus, 40 Paratypen, Nord-Birma, Washaung, östlich von Myitkyina, ca. 200 m, 14. 7. 1934, Holotypus, Paratypen, im Mus. Stockholm, Paratypen, in Coll. FREY.  
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**punctulatus** BOLLOW, 1940 (*Stenelmis*)  
Arkiv Zoologi 32 A, Nr. 13, 24–26, Abb. 43–49

♂ Holotypus, 22 Paratypen, Nord-Birma, Washaung, östlich von Myitkyina, ca. 200 m, 14. 7. 1934; Holotypus, Paratypen im Riksmus. Stockholm; Paratypen, in Coll. FREY.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, von BOLLOW als *punctulatus* ausgezeichnet.

**sauteri** KONO, 1936 (*Stenelmis*)  
Arb. morph. tax. Ent. 3, 122

Holotypus, Formosa, Kankau, leg. SAUTER, im DEI.  
DEI: Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1912, leg. SAUTER.

**sexualis** HINTON, 1937 (*Cylloepus*)  
Arb. morph. tax. Ent. 4, 102–106, Fig. 4–10, 12

♂ Holotypus, 80 Paratypen, Mexico, Distr. Temascaltepec, Tejupilco, 4000 Fuß, 7. 1934, leg. HINTON, in Coll. HINTON; 16 Paratypen, vom gleichen Fundort, 15.–28. 6. 1933, leg. HINTON und USINGER; 1 Paratypus vom gleichen Fundort, 5000 Fuß. Paratypen, im DEI, British Mus., U.S.N.M. und Coll. MUSGRAVE.  
DEI: 3 Paratypen, Mexico, Tejupilco, Temescaltepec, 1 Ex., 15. 6. 1933, 2 Ex., 7. 1934, leg. HINTON.

**similaris** BOLLOW, 1936 (*Dryops*)  
Ent. Bl. 32, 191–193; Taf. 4, Fig. 7+7a; Taf. 5, Fig. 8; Taf. 6, Fig. 6

♂ Holotypus, Breslau, Coll. LETZNER, im DEI. 42 Paratypen, Deutschland, Spanien, Sardinien, Österreich, Böhmen, Kärnten, Ungarn, Siebenbürgen, Kaukasus, Astrachan, Holland, Dänemark, Portugal, Türkei.  
DEI: ♂ Holotypus, Breslau, LETZNER; 1 ♀, Paratypus, Karlowitz, LETZNER.

**spinipes** HINTON, 1934 (*Cylloepus*)  
Rev. de Ent. Rio de Jan. 4, 192–193

♂ Holotypus, 69 Paratypen, Mexico, Real de Arriba, Distr. of Temascaltepec, 5.–7. 1933, 6000 Fuß, leg. USINGER & HINTON. Holotypus, im U.S.N.M.  
DEI: 2 Paratypen, Mexico, Real de Arriba, Temescaltepec, 4. 6. 1933, 28. 5. 1933, leg. HINTON & USINGER.

**submaculatus** HINTON, 1937 (*Stenelmoidea*)  
Arb. morph. tax. Ent. 4, 109—111, Fig. 19—21

♂ Holotypus, 3 ♀♀, Paratypen, Brazil, Esp. Santo, 10. 1920. Holotypus, 1 Paratypus, im DEI; 2 Paratypen, in Coll. HINTON.  
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Espir. Santo, 10. 1920—11. 1921.

**ungulatus** HINTON, 1934 (*Limnias*)  
Rev. de Ent. Rio de Jan. 4, 200—201

Holotypus, 154 Paratypen, Mexico, District of Temascaltepec, 5.—7. 1933, 6000 Fuß, leg. USINGER. 1 Paratypus, Mexico, Tejupilco, Juni, 4000 Fuß. Holotypus, im U.S.N.M.  
DEI: 7 Paratypen, Mexico, Real de Arriba, Temascaltepec, 4 Ex., 22. 5. 1933, 1 Ex., 28. 5. 1933, 1 Ex., 31. 5. 1933, 1 Ex., 2. 6. 1933, leg. HINTON & HINTON.

**vicina** GROUVELLE, 1896 (*Stenelmoidea*)  
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (Ser. 2) 17 (= 37) (1896—97), 47—48

Syntypen, Ilh d'Engano, leg. MODIGLIANI, im Mus. Genua.  
DEI: 1 Syntypus, Engano, Bua-Bua, 5.—6. 1891, leg. MODIGLIANI.

### Wahrscheinlich nicht beschrieben:

**herthae** BOLLOW, (*Esolus*)

DEI: 4 Ex., Thessalien, Pelion, als Paratypen ausgezeichnet.

### Georyssidae

**formosanus** KONO, 1936 (*Georyssus*)  
Arb. morph. tax. Ent. 3, 53—54

Holotypus, Formosa, Laubeh, 2. 1908, leg. SAUTER, im DEI.

**overbecki** VAN EMDEN, 1934 (*Georyssus*)  
Ent. Bl. 30, 198—200

7 Syntypen, Mittel-Java, Djokjakarta, 1932, leg. OVERBECK, im Mus. Dresden. 1 Syntypus, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampungs, 11.—12. 1921, leg. KARNY, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Wai Lima, Lampungs Nr. 1, 11.—12. 1921, leg. KARNY.

### Heteroceridae

**andalusicus** BREIT, 1916 (*Heterocerus*)  
Col. Rundsch. 5, 58—59

Syntypen: 2 Ex., ohne Fundortangaben, KRAATZ 866; 2 Ex., Sevilla, leg. MÜLLER; im Mus. Wien. Portugal: Quellar; Evora; Lissabon; leg. SCHATZMAYR, in Coll. LEONHARD und KREKICH-STRASSOLDO.  
DEI: 3 Syntypen, Lusitania, Evora, 5. 1910, leg. SCHATZMAYR; 1 Syntypus, Lusitania, Quellar, 5. 1911, leg. SCHATZMAYR.

**fusculus** KIESENWETTER, 1843 (*Heterocerus*)  
Ztschr. Ent. (GERMAR) 4, 220, Fig. 11

Zahlreiche Syntypen, Deutschland.  
DEI: 1 Syntypus, Deutschland, Berol.

**glicki** PACHECO, 1963 (*Heterocerus*)  
Acta zool. mex. 6, Nr. 4, 5—6; Taf. 3, Fig. 11—16

♂ Holotypus, USA, Tex., Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK, im Inst. Biol. U.N.A.M., Mexico. Zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 9 Paratypen, USA, Texas, Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK.

**imperator** PACHECO, 1965 (*Tropicus*)

Monogr. Escuela nac. Agric. Coleg. Post-Graduad. (Chapingo, Mex.) Nr. 1, 1964, 114—115

♂ Holotypus, Brasilien, Etiquetas, Rio Caraguata, 21°41' B, 52°27' L, 400 m, 2. 1953, leg. PLAUMANN, im Chicago Nat. Hist. Mus. Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Argentinien, La Paz, Entre Ríos, 27. 1. 1951, leg. WITTENER.

**internurialis** PACHECO, 1963 (*Heterocerus*)

Acta zool. mex. 6, Nr. 4, 3—5; Taf. 2—3, Fig. 1—10

♂ Holotypus, USA, Texas, Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK, im Inst. Biol. U.N.A.M. Mexico. Zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 10 Paratypen, USA, Texas, Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK.

**marmota** KIESENWETTER, 1850 (*Heterocerus*)

Stett. ent. Ztg. 11, 224

Syntypen, Spanien, Gerona, Perpinignan.  
DEI: 5 historische Exemplare, vielleicht Typen, Perpignan.

**stankevici** PACHECO, 1963 (*Heterocerus*)

Acta zool. mex. 6, Nr. 4, 6—8; Taf. 4, Fig. 1—10

♂ Holotypus, Mexico, San Blas, Nayarit, 22. 3. 1962, leg. STANGE & PARKER, im Inst. Biol. U.N.A.M. Mexico. Zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 10 Paratypen, San Blas, Nay., 22. 3. 1962, leg. STANGE & PARKER.

## Dermestidae

*antoniae* REITTER, 1884 (*Hadrotoma*)  
Verh. nat. Ver. Brünn 22, 7

Syntypen, Lirik.

DEI: 1 Syntypus, Caspi.-M.-Gebiet, Liryk, leg. LEDER, REITTER.

*apicebrunneus* KALIK, 1955 (*Attagenus*)  
Rev. zool. bot. afr. 52, 316–318, Fig. 29, 30

♂ Holotypus, 93 Paratypen, D.O.A., Lukuledi, ex. Coll. ERTL, im Mus. Belg. Congo.

DEI: 1 Paratypus, D.O.A., Lukuledi, 1914, Coll. ERTL, Musée du Congo.

*bellulus* CHOBAUT, 1897 (*Anthrenus*)  
Bull. Soc. ent. France 1897, 277–278

Syntypen, südliches Algerien: Ain Sefra, 6. 1896, leg. BLEUSE; Mecheria, 7. 1896, leg. DION; Ghardaia, 5. 1896, leg. CHOBAUT; Oase von Berriane, 9. 1897. Typen in den Sammlungen ABEILLE DE PERRIN, BEDEL, VAULOGER, CHOBAUT und Mus. Paris.

DEI: 1 Syntypus, Süd-Algerien, Ghardaia (MZAB).

*bodemeyeri* GANGLBAUER, 1900 (*Hadrotoma*)  
In: BODEMEYER, Quer durch Kleinasiens, 148–149

2 ♀ Syntypen, Kleinasiens, Konia, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Konia, leg. v. BODEMEYER.

*conradti* PIC, 1927 (*Thaumaglossa*)  
Ent. Mitt. 16, 247

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

*formosanus* PIC, 1918 (*Orphinus*)  
Mé. Exot. Ent. 27, 2

Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

*heydeni* REITTER, 1881 (*Telops*)  
Verh. nat. Ver. Brünn 19 (1880), 35

Syntypen, Marocco, Tanger.

DEI: 1 Syntypus, Marocco, DESBROCH., in Coll. HEYDEN.

*horni* PIC, 1927 (*Orphinus*)  
Ent. Mitt. 16, 247

Holotypus, Paratypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN. Holotypus, im DEI; Paratypen, in Coll. PIC.  
DEI: Holotypus, 4 Paratypen, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

*klapperichi* PIC, 1954 (*Tiresiomorpha*)  
L'échange, Rev. Linna. 70, No 537, 11

Syntypen, China, 22. 4. 1946–1. 6. 1946, in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, China, Kuautun, Fukien, 1. 6. 46, leg. TSCHUNG SEN.

*kratochvili* KALIK, 1955 (*Attagenus*)  
Rev. zool. bot. afr. 52, 305–307, Fig. 13, 14

♂ Holotypus, Paratypen, Côte d'Ivoire, Mandaloa, leg. SKULINA, im Mus. Prag; 7 Paratypen, Sangha, Bandragava Mts., Suchan Fr., leg. SKULINA; 1 Paratypus, Haute Volta, Onagadongon.  
DEI: 1 Paratypus, Mandaloa, Côte d'Ivoire, leg. SKULINA.

*luganensis* STIERLIN, 1902 (*Dermestes*)  
Mitt. schw. ent. Ges. 10, 425–426

Syntypen, Lugano.

DEI: 1 Syntypus, Lugano.

*meridionalis* KRAATZ, 1858 (*Trogoderma*)  
Berl. ent. Ztschr. 2, 146

Syntypen, Griechenland, in der Königl. Samml.; Syntypen, Sizilien, in Coll. KRAATZ.  
DEI: 1 Syntypus, Sicil., Grohmu.

*quadrimaculatus* KRAATZ, 1858 (*Attagenus*)  
Berl. ent. Ztschr. 2, 145

Syntypen, Griechenland; Syra, von Blumen, leg. ZEBE; bei Nauplia, leg. v. KIESENWETTER.  
DEI: 1 Syntypus, Graciá, leg. ZEBE.

*rufimembris* PIC, 1927 (*Attagenus*)  
Ent. Mitt. 16, 246

Holotypus, Zanzibar, im DEI.

*rufiventris* PIC, 1927 (*Attagenus*)  
Ent. Mitt. 16, 246–247

Holotypus, Transvaal, leg. HARTMANN, im DEI.

*rufiventris* PIC, 1927 (*Thaumaglossa*)  
Ent. Mitt. 16, 246–247

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

*settatus* L. W. SCHAUFLUSS (*Anthrenus*)

DEI: 2 Ex., Callistoga, Aril., als Typen ausgezeichnet.

### Byrrhidae

*atrolucidus* PIC, 1923 (*Pelocharops*)

MéL. Exot. Ent. 39, 3

Syntypen, Guinea, Addah, in Coll. PIC und GROUVELLE.

DEI: 1 Syntypus, Goldküste, Adah, Westafrika.

*deubeli* GANGLBauer, 1900 (*Simplocaria*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 49 (1899), 534—535

Zahlreiche Syntypen, südöstliches Siebenbürgen, am Buesecs, in subalpinen Wäldern unter Moos, leg. DEUBEL.

DEI: 2 Syntypen, Siebenbürgen, Buesecs, alpin, leg. DEUBEL.

*dovrensis* MÜNSTER, 1902 (*Arctobyrrhus*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 91

♂♂♀ Syntypen, Norwegen, Dovre.

DEI: 2 Syntypen, Dovre.

*montanus* CZWALINA, 1887 (*Byrrhus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 495—496

Syntypen, Monte Rosa, unter Steinen, leg. CZWALINA.

DEI: 1 Syntypus, Mt. Rosa.

*montenegrina* OBENBERGER, 1916 (*Simplocaria*)

Arch. Nat. 82 A 4, 30—31

Einige Syntypen, Montenegro, auf dem Südabhang des Maglić bei Trnovičko Jezero, aus Moos gesiebt, leg. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Montenegro, Maglić, 8. 1913, leg. OBENBERGER.

*pumilio* OBENBERGER, 1916 (*Limnichus*)

Arch. Nat. 82 A 4, 29—30

Syntypen, Corfu, leg. PAGANETTI.

DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. PAGANETTI.

*striatopunctata incisa* OBENBERGER, 1916 (*Syneclypta*)

Arch. Nat. 82 A 4, 30

Syntypen, Corfu.

DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. PAGANETTI.

*taggetanus* REITTER, 1884 (*Curimus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 70

Syntypen, Griechenland, Nordmorea, leg. BRENSKE.

DEI: 1 historisches Ex., Griechenland, Morea, Hagios Vlassis, leg. BRENSKE.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

*densepunctatus* REITTER (*Limnichus*)

DEI: 1 Ex., Goldküste, Adah, als Typus ausgezeichnet.

*leonhardi* OBENBERGER (*Curimus*)

DEI: 1 Ex., Kephallenia, Megalo Vupo, 4. 4. 1905, leg. LEONHARD, als Typus ausgezeichnet.

*skradensis* OBENBERGER (*Syneclypta*)

DEI: 2 Ex., Croatie, Skad, 7. 1913, leg. OBENBERGER, als Typen ausgezeichnet.

### Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen der Familien Rhypiceridae (8 Typen), Cebrionidae (8 Typen), Elateridae (895 Typen), Eucnemidae (9 Typen), Throscidae (3 Typen), Chelonariidae (9 Typen), Buprestidae (242 Typen), Phyllocoeridae (3 Typen), Dieronychidae (9 Typen), Dascillidae (1 Type), Helodidae (10 Typen), Dryopidae (26 Typen), Georyssidae (2 Typen), Heteroceridae (7 Typen), Dermestidae (16 Typen) und Byrrhidae (8 Typen), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

### Summary

The present catalogue contains the types of Coleoptera of the families Rhypiceridae (8 types), Cebrionidae (8 types), Elateridae (895 types), Eucnemidae (9 types), Throscidae (3 types), Chelonariidae (9 types), Buprestidae (242 types), Phyllocoeridae (3 types), Dieronychidae (9 types), Dascillidae (1 type), Helodidae (10 types), Dryopidae (26 types), Georyssidae (2 types), Heteroceridae (7 types), Dermestidae (16 types) and Byrrhidae (8 types) preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

### Резюме

Данный каталог включает типы Coleoptera следующих семейств: Rhypiceridae (8 типов), Cebrionidae (8 типов), Elateridae (895 типа), Eucnemidae (9 типов), Throscidae (3 типа), Chelonariidae (9 типов), Buprestidae (242 типа), Phyllocoeridae (3 типа), Dieronychidae (9 типов), Dascillidae (1 тип), Helodidae (10 типов), Dryopidae (26 типов), Georyssidae (2 типа), Heteroceridae (7 типов), Dermestidae (16 типов) и Byrrhidae (8 типов), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при Научноисследовательском институте, Береславдский филиал, (бывший Немецкий энтомологический институт).