caractérisée par la structure des antennes dont les articles 4—6 sont plus ou moins impressionnés et inégaux.

Type de la var. *Jacobsoni* au Museum de Paris, co-types in collections Jacobson et Pic.

Fauna sumatrensis.

(Beitrag Nr. 34).

Byrrhidae, Dermestidae, Anobiidae (Col.).

Par M. Pic, Digoin.

Les insectes étudiés ici, tous recueillis par Mr. Ed. Jacobson, sont de la grande famille des Clavicornes et comprennent quatre espèces de *Byrrhidae*, mises en tête, et 7 espèces de *Dermestidae*, enfin il y a une seule espèce d'*Anobiidae*, la dernière. Le matériel est déposé dans les collections de Mr. Ed. Jacobson, de l'auteur et du Musée de Leyden ou de Paris (unica). Voici l'énumération des espèces:

Limnichus densatus Pic, var. Fort de Kock, 920 m; Janvier 1922.

Diffère des exemplaires types, de Java, par les élytres un peu plus allongés.

Cyphonichus brevior (n. sp.): Subovatus, nitidus, minute, sat dense punctatus, griseo pubescens, pro parte hirsutus, rufus, elytris ad medium vage piceo subfasciatis et valde convexis. Long. 3 mm.

Tandjunggadang 1000 m, 1926. — Type au Museum de Paris, co-type dans la coll. Pic.

Voisin de *C. punctatus* Pic, en diffère, à première vue, ainsi que des espèces voisines, par la forme moins allongée des élytres.

Byrrhinus Jacobsoni (n. sp.): Oblongus, antice et postice attenuatus, convexus, nitidus, griseo pubescens aut fusco hirsutus, niger, thorace pro parte pedibusque rufis; antennis testaceis, brevibus, sat gracilibus; capite inter oculos subconvexo, parum punctato; thorace breve et lato, antice attenuato, medio convexo, minute et sparse punctato, lateraliter paulo rufescente; scutello triangulare, parum punctato; elytris thorace non latioribus, post humeros paulo dilatatis, postice attenuatis, antice fortiter et irregulariter punctatis, ad basin medio fortiter et breve impressis. Long. près de 3 mm.

Kalung XII, 1913, dans un nid d'écureuil. — Type au Museum de Paris.

Voisin de *B. punctatus* Pic, moins trapu, prothorax moins nettement et plus éparsément ponctué, élytres à ponctuation un peu plus forte et plus longuement attenués à l'extrémité.

Byrrhinus testaceipes Pic. Fort de Kock, 920 m. La forme typique

présente une coloration générale foncée sur le dessus du corps avec le sommet des élytres variablement roux.

Var. ***semicinctus*** (v. nov.) a le pourtour du prothorax, l'écusson et les élytres plus ou moins bordés de roux.

Types de la variété nouvelle *semicinctus* au Museum de Paris, cotype dans la coll. Pic.

Attagenus annulifer Cast. Fort de Kock, 920 m; Haran Kloof, 500 m, VII. 1925. — Espèce cosmopolite.

Pseudotelopes testaceipes Pic. Fort de Kock, 920 m; Gunung Singgalang, 1800 m, 1925.

Espèce décrite du Tonkin, très variable par la forme plus ou moins subovalaire, la coloration du dessus variant du roux au foncé, avec le sommet des élytres restant roux, les mouchetures grises des élytres diversement séparées, ou parfois en partie jointes.

Thaumaglossa atricolor Pic. Tadjonggadang 100 m, 1926.

Anthrenus fasciatus latebasalis (n. var.): Subovatus, niger, membris rufis, sat late squamulatus, supra albo aut luteo multimaculatus, elytris ad basin late albo squamulatis, infra corpore dense albo squamulato, segmentibus abdominis lateraliter nigro notatis et ultimo medio nigro maculato. Long 3 mm.

Padang, 1926. — Type in Museum de Paris.

Diffère, à première vue, de la forme typique par la fascie blanche squamuleuse des élytres tout-à-fait antérieure et couvrant presque toute la base, les squamules apparaissent aussi plus larges.

Trinodes minor Pic. Fort de Kock, 920 m, 1925. Tandjunggadang, 100 m, X. 1925 — Espèce décrite du Tonkin.

Orphinus apicalis Pic. Fort de Kock, 920 m. La forme typique décrite de Java et retrouvée à Sumatra par M. Jacobson est noire en dessus avec le sommet des élytres plus ou moins largement roux, et ceux ci sont ornés d'une fascie placée en dessous des épaules et revêtue de pubescence grise s'oblitérant parfois un peu.

Var. ***obliteratus*** (v. nov.): Noire avec les élytres brièvement roux au sommet, n'a pas de fascie distincte aux élytres.

Type de la variété nouvelle *obliteratus* au Museum de Paris.

Orphinus formosanus Pic. Fort de Kock, 920 m, Déc. 1921, 1926.

Espèce décrite de Formose, ayant, avec les membres testacés, une coloration générale foncée, le sommet des élytres diversement teinté de roussâtre, rarement entièrement brunâtre. Varie de taille entre 2,5 à 3,5 mm et présente une ponctuation plus ou moins fine.

Lasioderma serricorne F. Fort de Kock, 920 m, Janvier 1922.