

supra impresso; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatus, fere opacis, minute granulosis; pedibus sat gracilibus. Long. 5 mill. Gunung Singgalang, 1800 m, VIII 1925. — Type in Museum Paris, co-type in coll. Pic.

Par la forme du prothorax se rapproche de *S. Bakeri* Pic, mais de coloration bien différente. Espèce très caractérisée par ses élytres ornés d'une bande longitudinale jaune.

Drilosilis rufithorax Pic, var. Fort de Kock, 920 m, 1925.

Pseudopachymesia Wallacei Pic et var. Baso, 800 m, III 1926; Lubuksikaping, 450 m, 1926; Tandjunggadag, 1000 m, 1926.

Fauna sumatrensis.

(Beitrag Nr. 48).

Byrrhidae, Dermestidae, Anobiidae, Bruchidae.

(Col.) II¹⁾.

par. M. Pic, Digoïn.

Comme précédemment, tous les insectes énumérés ci-dessous ont été récoltés par. M. Ed. Jacobson. Les types uniques ont été déposés au Museum de Paris, les autres exemplaires se trouvent dans les collections de M. Ed. Jacobson, de l'auteur, etc.

Byrrhinus testaceipes Pic var. Gunung Singgalang, 1200 m, 1925

Byrrhinus padanganus (n. sp.). Parum elongatus, antice et postice attenuatus, parum, convexus, griseo-luteo pubescens, niger, elytris apice membrisque late rufescentibus, aut testaceis. Capite inter oculos subconvexo, mediocre et sparse punctato; antennis brevibus, gracilibus; thorace breve et lato, antice attenuato, minute et sparse punctato; scutello triangulare, parum punctato; elytris thorace non latioribus, post humeros paulo dilatatis, postice attenuatis, diverse, antice pro parte, lineato-punctatis.

Long. 2,5 mm. Padang, 2 m, 1926. Dans un Polyporus — Type in Museum de Paris, co-types in coll. Pic et Jacobson.

Voisin de *B. Boucardi* Pic, moins robuste avec les élytres à ponctuation moins forte et autrement disposée.

Byrrhinus punctaticeps (n. sp.). Oblongus, antice et postice attenuatus, sat convexus, nitidus, griseo-luteo pubescens, rufescens, capite aliquot-brunnescente, membris testaceis, Capite sat fortiter et dense punctato; thorace breve et lato, minute et sparse punctato; scutello parum punctato; elytris antice fortiter et irregulariter punctatis. Long. 2 mm. Fort de Kock, 920 m, 1926. — Type in Museum de Paris, co-types in coll. Pic et Jacobson.

Très voisin de *B. borneensis* Pic et en différant, à première vue, par la ponctuation assez forte et dense de la tête.

1) Voir I in Supplem. Entom. XV, 1927, p. 65.
Suppl. Ent. XVI.

Limnichus densatus Pic. Fort de Kock, 920 m, 1924 à 1926.

Thaumaglossa atricolor Pic et var. Fort de Kock, 920 m, 1926. —
Eclot d'une oothèque de Mante.

Trinodes minor Pic; Padang, 2 m, 1926. — Sur feuilles de *Hibiscus tiliaceus* L.

Orphinus formosanus Pic, var. Padang, 2 m, 1926.

Sitodrepa panicea L. Fort de Kock. Dans du vermicelle. Espèce cosmopolite.

Catorama Jacobsoni (n. sp.). Oblonga, antice et postice attenuata, convexa, nitida, griseo-holosericeo pubescens, nigro metallica, membris rufis. Capite minute sat dense punctato; thorace breve et lato, antice attenuato, minute et parum dense punctato; elytris parum latis, sat brevibus, minute et parum dense punctatis, insulcatis. Long. 2 mm. Fort de Kock, 920 m, 1925. — Type in Museum Paris, co-types in coll. Pic et Jacobson.

Espèce très distincte par sa petite taille, jointe à l'absence complète de sillon latéral. Peut se placer près de *C. insulcata* Pic, moins robuste que ce dernier avec les épaules moins marquées, la tête foncée.

Caenocara albosetosa (n. sp.). Subrotundata, parum convexa, nitida, sat breve albo setosa, circa densiore, rufa, elytris castaneis. Capite mediocre et sparse punctato; thorace breve et lato, antice valde attenuato, sat fortiter et sparse punctato; elytris latis et brevibus, sat fortiter et irregulariter punctatis, antice externe bistriatis et postice bisulcatis; membris rufis. Long. 1,5 mm. Tandjunggadang. — Dans un Polyporus. A placer près de *C. rubriceps* Pic. Type in Museum de Paris.

Espèce très distincte par ses soies blanches raides qui dessinent sur le pourtour, par suite de leur condensation, une sorte de bordure très nette, l'insecte étant vu du dessus.

Ptinus niger v. *borneensis* Pic. Fort de Kock, 920 m, 1925; Tandjunggadang, 1200 m, II 1926.

Bruchus (Callosobruchus) chinensis. Fort de Kock, 920 m, 1925.

D'après M. Ed. Jacobson les représentants de la famille des Bruchidae se rencontrent rarement à Sumatra.

Fauna Sumatrensis.

(Beitrag Nr. 49.)

Family *Calliphoridae* (Diptera).

J. B. Mallonch, Washington, D. C.

(With 3 Fig.)

In this paper I present descriptions of some species of the subfamily *Calliphorinae*. The material was collected by Mr E. Jacobson,