

einstimmung mit dem Kopulationsapparat dieser Gruppe kann sogar als eine gewisse Stütze dieser Ansicht angesehen werden.

#### Literatur.

- Aldrich, J. M., *Braula coeca* Nitzsch in Maryland Apiaries. Journ. Wash. Acad. Sci., 14, 181, 1924.
- Arnhart, L., Eine neue *Braula*-Art. Arch. Bienenk., 7, 18—22, 1926.
- Bezzi, M., Riduzione e scomparsa delle ali negli Insetti Ditteri. Natura (Pavia), 7, 85—182, 1916.
- Börner, C., *Braula* und *Thaumatoxena*. Zool. Anz. 32, 537—549, 1908.
- Cole, F. R., A Study of the Terminal Abdominal Structures of Male Diptera. Proc. Calif. Acad. Sci., (4) 16, 397—499, 1927.
- Crampton, G. C., Suggestions for a new interpretation of the postabdomen in male Cyclorrhaphous Diptera. Bull. Brooklyn ent. Soc. 31, 141—148, 1936.
- Dacqué, E., Organische Morphologie und Paläontologie. Berlin 1935.
- Duda, O., *Aptilotella borgmeieri* ♂, eine neue flügellose Borboride. Natuurh. Maandbl., 13, 74—76, 1924.
- Hendel, F. (& M. Beier), Diptera in Kükenthal-Krumbach, Handbuch der Zoologie, Band 4, 2. Hälfte, Ins. 2, p. 1729—1998, 1937.
- Nitzsch, Ch. L., Die Familien und Gattungen der Thierinsekten als ein Prodrömus der Naturgeschichte derselben. Germar, Mag. Ent, 3, 261—316, 1818.
- Schmitz, H., Ist *Braula* Nitzsch eine Gattung der Phoridae? Wien. Ent. Zeit., 36, 179—189, 1917.
- Wesché, W., The genitalia of both the sexes in Diptera. Trans. Linn. Soc. Zool., (2) 9, 339—386, 1906.

---

## Curculionides nouveaux de l'Amérique méridionale,

qui se trouvent dans le Deutsches Entomologisches Institut.

(1<sup>ère</sup> Note.)

Par A. Hustache, Lagny (S. & M.), France.

### *Anchonus bolivianus* n. sp.

Ovale, noir, convexe, le revêtement dorsal grisâtre, dense, composé, sur le prothorax de grandes squamules minces, concaves, tapissant les fovéoles, les soies dorsales jaunâtres, courtes, dressées sur les élytres, soulevées sur le prothorax.

Rostre aussi long que le prothorax, arqué, étranglé à sa base, avec 6—8 séries de gros points alignés et squamulés. Antennes ferrugineuses le 2<sup>e</sup> article du funicule moins long que les trois suivants ensemble.

Prothorax aussi long que large, sa plus grande largeur un peu en avant du milieu, en ce point les côtés modérément arrondis, en avant les côtés obliquement et peu brusquement convergents, sinués en dedans

derrière le bord antérieur, ce dernier au milieu sinue, échancré, les côtés en arrière moins fortement convergents qu'en avant et rectilignes; peu convexe, largement impressionné transversalement en avant, la ligne médiane parfois légèrement enfoncée; criblé de grandes fovéoles, très serrées séparées par d'étroites cloisons sensiblement de même élévation.

Elytres ovales, peu plus longs que larges, les côtés peu arqués dans le milieu, plus fortement en arrière, la base échancrée en arc régulier, la rebord interrompu; disque modérément convexe, peu inégal, les interstries pourvus de granules sétigères, ordinairement rapprochés par groupe, parfois isolés; tout le disque le plus souvent enrobé d'une couche squamuleuse traversée par les soies, les granules un peu plus gros vers la base. Pattes setosulées, les tibias antérieurs finement granulés, denticulés en dedans.

Long: 4,5—5 mm.

Bolivie: Coroico, type (ex Staudinger) ma collection; Bolivie (Ph. Germain) une série de specimens.

Dans le tableau donné par Faust<sup>1)</sup>, cette espèce s'insère au Nr. 24, près de *A. Kürschi* Fst.

Var. *dubius* n. var.

Cette variété diffère de la forme typique par la forme du prothorax et la sculpture des élytres. Prothorax plus large, très brusquement étranglé en avant, les côtés du resserrement parallèles entre eux, les côtés du prothorax en arrière rectilignes. Elytres moins ovales, leurs granules disposés en quinconce plus régulier.

Même provenance.

### *Cestophorus bioblongus* n. sp.

Oblong, noir, mat, sans soies dorsales, pourvu en dessus dans les points de squamules terreuses.

♂ Rostre de un tiers moins long que le prothorax, peu courbé jus qu'à l'insertion antennaire, jusqu'à ce dernier point avec des séries de gros points et une faible carène médiane, sa dilatation apicale un peu plus large que longue et ponctuée rugueuse. Antennes robustes, le 2<sup>e</sup> article du funicule aussi long que les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> ensemble.

Prothorax oblong, plus long que large, sa plus grande largeur au milieu, les côtés modérément arqués, la base tronquée, et un peu plus large que le bord antérieur, derrière le bord antérieur légèrement resserré latéralement; convexe, la ligne médiane enfoncée, couvert de tubercules peu serrés, sur le disque assez gros et peu inégaux, sur les côtés plus petits, les flancs ponctués mais non tuberculés en avant des hanches, le bord antérieur ponctué rugueux mais non tuberculé.

<sup>1)</sup> Deutsch. Ent. Zeitschr. 1892 p. 17, 29, 49.

Elytres trois fois aussi longs que larges, aussi larges que le prothorax, fortement rétrécis dans leur tiers postérieur, au sommet séparément calcaireux; base brièvement rebordée et très peu plus large que celle du prothorax; disque couvert de fortes ondulations transversales, surmontées çà et là de quelques granules très petits; déclivité postérieure à 45°, pourvue à son sommet de deux gros tubercules arrondis, séparés par la suture, et de chaque côté de cette dernière d'une série de 4 tubercules, le 4<sup>e</sup>, près du calus apical, et plus gros.

Pattes élancées, ponctuées rapeuses, les tibias finement granulés, le 3<sup>e</sup> article tarsal beaucoup plus large que le 2<sup>e</sup>. Dessous grossièrement ponctué (milieu des 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> segments ventraux excepté) les segments ventraux 1—2 plans et pourvus en leur milieu d'une dense pubescence fauve, le 5<sup>e</sup> segment largement impressionné, tomenteux, fauve.

♀ Rostre à peine plus long, sa sculpture moins forte, sa dilatation apicale plus longue que large. Sculpture dorsale moins forte. Dessous sans pubescence spéciale, l'abdomen convexe à la base.

Long: 13 mm.

Colombie: Rio Vitaco, ♂, type (ex Bang-Haas), ma collection; St. Antonio, vers 2000 m. ♀, type (collection Pape).

Cette espèce prend place au Nr. 4 dans le tableau de Faust, la sculpture particulière des élytres la fait aisément reconnaître.

### *Isorhinus elegans* n. sp.

Elytres, prothorax, pattes (fémurs en partie rembrunis excepté), dessous en partie d'un brun marron, la tête et le rostre noirs. Orné en dessus d'un dessin rosé formé par une fine pubescence couchée, simple et comprenant: sur le prothorax trois larges bandes peu tranchées; sur les élytres trois bandes larges, transversales, la 1<sup>ère</sup> basale, rétrécie à la suture, interrompue sur la base des interstries 3—5 et par le calus huméral foncé, la 2<sup>e</sup> bande médiane, dentelée sur ses bords, la 3<sup>e</sup> apicale, remontant en dedans sur la suture, contournant le calus apical, prolongée sur le bord latéral jusqu'à la 2<sup>e</sup> bande.

Rostre gros, droit, à peine plus long que large, avec une fine carène médiane et de chaque côté un petit tubercule au-dessus de l'insertion antennaire, comme la tête à ponctuation très fine et serrée. Front presque aussi large que la moitié du rostre. Yeux modérément convexes. Antennes ferrugineuses, la massue oblongue et noire, le 1<sup>er</sup> article du funicule plus long que large, obconique.

Prothorax subtrapézoïdal de un tiers plus large que long, la base arquée, brièvement relevée et plus large que le bord antérieur, en avant étroitement et peu fortement resserré, les côtés modérément et assez régu-

lièrement arqués; modérément convexe, la ligne médiane légèrement enfoncée la punctuation très fine serrée.

Elytres convexes, un peu plus longs que larges, échancrés en arc à la base, les épaules largement arrondies et non élevées, en arrière graduellement et faiblement rétrécis, au sommet séparément arrondis et déprimés autour du calus apical assez élevé et arrondi; stries dorsales très fines, leurs points petits et les interstries larges et plans; stries latérales plus fortes, leurs points plus gros et les interstries convexes.

Long: 6 mm.

Paraguay (K. Fiebrig), deux specimens (coll. Kraatz).

*Phelypera x-maculata* n. sp.

Brun ferrugineux, les élytres ornés d'une large fascie squamuleuse (squamules étroites et simples) en forme de X, commençant sur le milieu (n'atteignant pas les bords), prolongée jusqu'au sommet (sur les trois premiers interstries), dilatée et remontant un peu latéralement sur le bord apical, cette fascie d'un ocre rosé, ses bords saupoudrés de cendré; les élytres avec encore quatre courtes linéoles sur la base et le prothorax avec trois bandes dorsales semblablement colorées.

Rostre aussi long que le prothorax, peu arqué, de chaque côté avec un fin sillon parallèle au scrobe, densément pointillé, la ligne médiane obsolètement carénée. Intervalle interoculaire linéaire, squamulé. Antennes ferrugineuses, le scape atteignant l'œil, le funicule avec ses deux premiers articles allongés et égaux, les suivants courts et ne s'épaississant que très peu, le 7<sup>e</sup> distinct de la massue, cette dernière étroite, fusiforme et rembrunie.

Prothorax transversal (2—1,5) assez fortement dilaté arrondi sur le milieu des côtés, ces derniers en avant largement resserrés, en arrière brièvement sinués devant les angles postérieurs aigus; modérément convexe, densément pointillé. Ecusson triangulaire squamulé.

Elytres un peu plus longs que larges, les épaules arrondies et faiblement relevées, les côtés parallèles jusqu'au milieu, ensuite arqués convergents; modérément convexes, assez fortement impressionnés derrière le calus postérieur accusé, assez fortement striés ponctués, moins fortement dans la fascie, les interstries convexes; la suture avec une linéole claire postscutellaire, une petite macule sombre sur le milieu de la déclivité postérieure et le bord apical avec deux petites macules foncées sur le sommet des interstries 2—3.

Pattes ferrugineuses, les fémurs squamulés, les postérieurs avec une tache foncée.

Long. 8 mm.

Brésil, deux spécimens (coll. Kraatz)

***Phelypera brunnea* n. sp.**

Oblong, le revêtement très dense, en dessus d'un brun fauve, varié de brun clair et de noir, en dessous plus clair, d'un brun jaune, les squamules dorsales allongées, peu visiblement impressionnées; prothorax avec deux bandes dorsales et les côtés plus clairs; écusson clair; élytres avec un trait sur la base du 3<sup>e</sup> interstrie et une ligne transversale ondulée, au sommet de la déclivité, mal délimitée, d'une teinte plus claire.

Rostre aussi long que le prothorax, faiblement arqué, densément pointillé, avec une fine carène médiane. Intervalle interoculaire linéaire.

Prothorax hexagonal, sa plus grande largeur un peu en arrière du milieu, en ce dernier point les côtés obtusément arrondis, en avant et en arrière presque rectilignes, derrière le bord antérieur légèrement sinués en dedans, devant les angles postérieurs droits, mais les angles postérieurs aigus, la base largement du double de la largeur du bord antérieur; peu convexe, la ponctuation cachée par le revêtement. Ecusson semi-ovalaire, un peu plus long que large.

Elytres plus longs que larges, les côtés parallèles jusqu'au tiers postérieur, les épaules largement arrondies et un peu relevées; convexes, le sommet du 9<sup>e</sup> interstrie faiblement calleux et plus clair; assez fortement pontués striés, les points pourvus au fond d'un très court poil, les interstries larges et faiblement convexes.

Pattes robustes; fémurs squamulés, les postérieurs avec un large anneau dénudé, brun; tibias d'un brun foncé, en majeure partie dénudés.

Long: 6—7 mm.

Paraguay, une paire (coll. Kraatz).

Cette espèce doit être voisine de *P. cervina* Cap. et en différer par la forme du prothorax.

***Larinosomus semi-lunatus* n. sp.**

♀ Ovale, noir de poix, le revêtement d'un blond cendré, fin, dense composé de petites squamules allongées, ponctuées; tête, rostre revêtus d'une fine pubescence; prothorax dénudé mais avec une tache subtrian-gulaire et antéscutellaire et quelques squamules éparses blondes, les élytres avec des taches noires: une petite sur l'épaule, une bande transversale médiane, commune, étroite, entre les 9<sup>es</sup> interstries, une tache latérale de chaque côté, semi-circulaire, grande, atteignant en dedans le 4<sup>e</sup> interstrie; pattes médianes et postérieures avec une tache sur les fémurs et la majeure partie des tibias foncées.

Rostre à peine moins long que le prothorax, peu arqué, avec trois fines carènes. Intervalle interoculaire linéaire et squamulé. Antennes ferrugineuses, les deux premiers articles du funicule égaux, et chacun

aussi long que les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> ensemble, le 7<sup>e</sup> distinct de la massue, cette dernière ovale.

Prothorax du double aussi large que long, les côtés subparallèles dans leur moitié postérieure, obliquement et fortement convergents en avant; convexe, avec une légère et courte impression antéscutellaire. Écusson triangulaire, squamulé, concolore.

Elytres un peu plus longs que larges (5,5—4,2), les épaules largement arrondies, les côtés légèrement sinués derrière les épaules; convexes, légèrement impressionnés derrière le calus apical, ce dernier non accusé mais indiqué par trois points plus clairs bordant la tache foncée; points des séries dorsales oblongs, petits, moindres que leurs intervalles; interstries dorsaux sur le disque très plans, sur la déclivité postérieure convexes. Tarses roux. Trois derniers segments ventraux avec deux séries de taches foncées.

♂ Rostre plus court, plus fortement sculpté. Derniers segments ventraux, les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> dans le milieu, le 5<sup>e</sup> sur les côtés avec une touffe de pubescence.

Long: 6—6,2 mm.

Brésil: Rio La Plata, ♂ ma collection (ex Bang-Haas); sans localité précise ♀ (coll. Kraatz).

#### *Larinosomus Jacobi* n. sp.

Forme et fasciés de l'espèce précédente dont elle diffère par les caractères suivants:

Revêtement grisâtre, varié de brun, les squamules plus grossières, plus longues mais non ponctuées dans leur centre, les élytres avec trois petites taches sur la base (une entourant l'écusson, une sur le 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> interstrie), sans bande transversale sur le milieu, mais dans cette région avec des petites taches irrégulières. Prothorax plus large, plus distinctement arrondi sur le milieu des côtés, sans impression antéscutellaire. Elytres plus larges, les épaules plus obliques, moins élevées, les côtés indistinctement sinués derrière les épaules, les points des séries plus gros, les interstries sur le disque légèrement convexes, sous les taches foncées plus fortement relevés; taches des pattes moins tranchées, parfois nulles.

Long: 5,5—6,5.

Paraguay: Hohenau, une série de spécimens (Hans Jacob).

La coloration est variable et les taches noires, même la latérale, tendent à disparaître chez quelques spécimens probablement un peu immatures, variations analogues à celles de *Phytonomus variabilis*, *nigrirostris* etc, d'Europe.

#### *Adioristus bolivianus* n. sp.

Oblong, brun de poix, les antennes, les tibias et les tarses fer-

rugineux, revêtu en dessus d'une fine pubescence d'un jaune de sable, espacée, couchée, entremêlée de longues et fines soies blanches et dressées.

Rostre moins long que le prothorax, arqué, densément pointillé, pubescent, ainsi que la tête, pourvu d'une très fine carène médiane et de chaque côté d'un petit tubercule au-dessus de l'insertion antennaire. Front presque aussi large que le rostre. Antennes fines; scape dépassant le bord postérieur de l'œil; funicule avec le 1<sup>er</sup> article allongé, très peu moins long que les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> ensemble, le 2<sup>e</sup> moitié du 1<sup>er</sup>, les suivants graduellement plus courts et un peu plus épais, le 7<sup>e</sup> encore un peu plus long que large, la massue oblongue, articulée.

Prothorax peu plus large que long, la base subtronquée et un peu plus large que le bord antérieur, les angles postérieurs droits, les côtés peu arqués, derrière le bord antérieur, largement mais peu fortement resserrés; peu convexe, assez densément ponctué, avec des traces d'une ligne médiane lisse. Ecusson triangulaire et pubescent, la pubescence ordinairement d'un vert brillant.

Elytres oblongs, plus longs que larges, brièvement arrondis aux épaules; modérément convexes, le 5<sup>e</sup> interstrie terminé par un petit calus; assez fortement ponctués striés les points serrés, les interstries faiblement convexes, plus larges que les stries, assez densément pointillés, les points piligères. Pattes normales.

Long: 5,5—6 mm.

Bolivie (Ph. Germain), 7 spécimens (coll. Kraatz).

#### *Hyperodes crassirostris* n. sp.

Oblong, noir, mat, revêtu d'une fine pubescence grisâtre, couchée ne voilant pas les téguments, le prothorax de chaque côté avec une bande de pubescence plus longue et plus claire. Lobes oculaires du prothorax faibles.

Rostre seulement du double aussi long que large, aussi épais que large, arqué, en dessus convexe, avec une seule carène, médiane, fine, s'évanouissant en arrière dans une fovéole frontale, sa ponctuation, comme celle de la tête, très fine, très serrée, légèrement confluyente longitudinalement. Yeux peu convexes; antennes ferrugineuses, courtes; funicule avec le 2<sup>e</sup> article aussi long que le 1<sup>er</sup>, les suivants transversaux, graduellement plus larges, le 7<sup>e</sup> lenticulaire et subcontigu à la massue, cette dernière ovale.

Prothorax à peine plus large que long, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, d'égale largeur à ses extrémités, derrière le bord antérieur légèrement étranglé, les côtés arqués en avant, droits en arrière; faiblement convexe, criblé de points très petits et très serrés, avec une

carène médiane lisse et quelques courtes soies dressées sur les bords latéraux. Ecusson ponctué.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au tiers postérieur, la base échancrée en arc, les angles huméraux légèrement avancés; modérément convexes, assez fortement ponctués striés, les interstries convexes, densément coriacés pointillés, les côtés avec quelques courtes soies.

Pattes normales, ferrugineuses. Dessous à ponctuation très serrée et fine (3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> segments ventraux exceptés).

♂ Une profonde impression médiane sur le bord postérieur du métasternum la base de l'abdomen et sur le 5<sup>e</sup> segment.

Long: 4 mm.

Bolivie (Ph. Germain), 5 spécimens (collection Kraatz).

Les trois *Hyperodes* qui suivent, à cause de leur forme et de leur sculpture dorsale pourraient être confondus avec des *Anchonus* Sch. Ils ont de forts lobes oculaires et le dessous du corps à ponctuation forte et serrée, excepté sur les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> segments ventraux très courts et séparés par de profondes sutures, le rostre gros et court, etc.<sup>1)</sup>

#### *Hyperodes anchonoideus* n. sp.

Ovale, noir, antennes et tarseux roux, les côtés du prothorax et des élytres avec des granules sétigères.

Rostre épais, plus large que les fémurs antérieurs, peu arqué, ses trois carènes fines et parallèles, ainsi que la tête, densément ponctué rugueux. Antennes fines, le 2<sup>e</sup> article du funicule de un tiers moins long que le 1<sup>er</sup>.

Prothorax à peine plus large que long, graduellement élargi et les côtés peu arqués de la base au tiers antérieur, derrière le bord antérieur brusquement rétréci; peu convexe, criblé de fovéoles plus ou moins confluentes, leurs intervalles étroits irréguliers et luisants, le long des côtés déprimé et granulé.

Elytres ovales, plus longs que larges, les côtés peu arqués, la base échancrée en arc, rebordée, les angles huméraux aigus, avancés, les épaules effacées; convexes, grossièrement ponctués-striés, les interstries dorsaux peu plus larges que les stries, avec quelques rugosités transversales, les latéraux convexes et finement granulés; sur la déclivité postérieure tous les interstries convexes et granulés. Métasternum court, moins long que le diamètre de la hanche.

<sup>1)</sup> Le genre *Hyperodes* étant représenté dans l'Argentine et les régions voisines par un très grand nombre d'espèces, il serait prématuré et imprudent de créer de nouveaux genres basés sur des caractères plutôt spécifiques que génériques.



Long: 3,5—4,5 mm.

Bolivie (Ph. Germain), trois spécimens (coll. Kraatz).

*Hyperodes costulatus* n. sp.

Ovale oblong, noir, les antennes et les tarses roux, les points des élytres pourvus d'une courte soie claire, couchée, les granules avec une soie plus longue et mi-dressée.

Prothorax aussi long que large, les côtés rectilignes et convergents du tiers antérieur à la base, cette dernière à peine aussi large que le bord antérieur, la ponctuation forte, serrée, rugueuse. Elytres fortement rétrécis dans leur moitié postérieure, tous les interstries étroits, convexes, les 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, plus fortement, transversalement découpés et irrégulièrement granulés.

Les autres caractères analogues à ceux de l'espèce précédente dont elle diffère encore par sa forme plus étroite, le prothorax plus long, sa ponctuation moins grossière, plus serrée, les élytres à interstries convexes, plus fortement sculptés.

Long: 3,5 mm.

Bolivie (Ph. Germain), trois spécimens (coll. Kraatz).

*Hyperodes sulcicollis* n. sp.

Noir de poix, les antennes et les tarses roux, revêtu en dessus d'un enduit limoneux plus clair sur les côtés du prothorax, les tubercules élytraux sétigères.

Rostre très épais, court, peu arqué, sa sculpture cachée par le revêtement, le front fovéolé. Prothorax aussi long que large, les côtés rectilignes et parallèles de la base au tiers antérieur, en avant faiblement convergents, la base plus large que le bord antérieur, derrière le bord antérieur faiblement et obliquement resserré; modérément convexe, profondément sillonné au milieu, la ponctuation forte, très serrée, rugueuse.

Elytres plus longs que larges, obliquement élargis aux épaules, s'élargissant ensuite très peu jusqu'au tiers postérieur, la base échancrée en arc mais non rebordée; modérément convexes, grossièrement ponctués striés, les interstries beaucoup moins larges que les stries, les 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> plus fortement convexes et pourvus de granules sétigères.

Long: 3,5 mm.

Bolivie (Ph. Germain), trois spécimens (coll. Kraatz).

*Falklandius dissimilis* n. sp.

Oblong, noir, luisant, les antennes et les pattes ferrugineuses, les fémurs plus au moins rembrunis; élytres avec une série de soies courtes, blanches, sur les interstries.

♀ Rostre moitié de la longueur du prothorax, épais, peu arqué,

graduellement rétréci de la base jusqu' à la brusque dilatation apicale, latéralement pourvu d'un sillon profond; son aire dorsale convexe, densément ponctuée ruguleuse. Tête couverte de rugosités plus fortes que celles du rostre, les yeux petits et presque plats. Antennes subapicales; scape dépassant le milieu de l'œil; funicule avec le 1<sup>er</sup> article allongé, le 2<sup>e</sup> un plus long que large, les suivants arrondis, courts, la massue ovale, rembrunie.

Prothorax à lobes postoculaires extrêmement faibles, pratiquement nuls; oblong, aussi long que large, sa plus grande largeur en arrière du milieu, la base tronquée, finement rebordée, plus large que le bord antérieur, les côtés modérément arqués, devant la base brusquement et très brièvement resserrés; peu convexe, avec un sillon médian, abrégé à ses extrémités, deux petites impressions de chaque côté du sillon, l'une en avant, l'autre en arrière; ferrugineux à ses extrémités, luisant, le disque avec des petits points épars, les côtés coriacés ruguleux et avec de très courtes soies.

Elytres oblongs, peu plus larges que le prothorax, presque du double aussi longs que larges, les épaules obliquement arrondies, les côtés modérément arqués, au sommet fortement rétrécis et brièvement arrondis ensemble, à la base de chaque côté obliquement tronqués vers l'écusson et ensuite peu arqués jus'qu'à l'extrémité; peu convexes, la déclivité postérieure verticale et en ogive; luisants, assez fortement ponctués-sériés, les interstries larges, peu convexes, plus fortement en arrière, avec une série de très petits points espacés et sétigères, les soies plus distinctes sur les côtés et la déclivité postérieure.

Fémurs à peine pointillés, finement pubescents; tibias antérieurs en dedans, bisinués et ciliés, pourvus d'un très petit onglet apical interne. Dessous coriacé, luisant.

♂ Forme plus étroite, l'impression longitudinale du rostre plus profonde, l'onglet des tibias plus fort. Base de l'abdomen et 5<sup>e</sup> segment impressionnés au milieu.

Long. 2,8—3,1 mm.

Bolivie (Ph. Germain), 3 ♀♀, 2 ♂♂ (collection Kraatz).

La sculpture dorsale paraît variable suivant les individus, et en particulier les impressions prothoraciques très fortes chez l'un des spécimens sont nulles chez un autre. Les soies paraissent être fragiles.

Les 4 espèces de ce genre sont spéciales aux îles Falkland; bien que ne possédant aucun spécimen de cette dernière région je crois pouvoir rattacher l'espèce ci-dessus au genre *Falklandius* tel que l'a défini Enderlein.

***Laemossacus angustifrons*** n. sp. (♀).

Luisant, marron, le prothorax plus foncé, les tarsi et les antennes.

d'un roux clair, la pubescence sur le dessous cendrée, assez serrée, formée de squamules laciniées.

Rostre de moitié de la longueur du prothorax, peu arqué, robuste, assez densément ponctué jusqu'au sommet, en arrière avec une ligne médiane imponctuée. Front très étroit, de la largeur du scape à son sommet. Yeux subplans, en avant brièvement et nettement échancrés en angle aigu par un prolongement latéral du rostre. Antennes avec le 2<sup>e</sup> article du funicule conique et beaucoup plus long que le 3<sup>e</sup>.

Prothorax aussi long que large, en avant largement et fortement resserré, les côtés modérément arqués en arrière, les angles postérieurs aigus et un peu prolongés; convexe, obliquement déclive en avant, avec une carène médiane entière, dans le milieu plus large et flanquée de chaque côté d'une large mais peu profonde impression, cette impression traversée par des plis obliquement dirigés vers la carène; le reste du disque couvert de plis assez réguliers, convergents en avant; devant la base de chaque côté une impression ponctuée.

Ecusson grand, élevé, ovale, entouré d'une collerette de quelques squamules cendrées.

Elytres subrectangulaires, un peu plus longs que larges, fortement impressionnés latéralement dans le milieu des côtés, fortement déprimés longitudinalement le long de la suture entre les troisièmes interstries; striés ponctués; interstries irréguliers, en carène vive dans les impressions latérales, ailleurs transversalement découpés, crénelés, le 3<sup>e</sup> plus fortement et plus élevé. Pygidium mat, noirâtre, ses points petits, peu serrés, pourvus chacun d'une petite squamule grise mais simple, le milieu relevé en une carène obtuse et squamulée.

Fémurs antérieurs avec leur dent obtuse, obliquement tronquée à son sommet.

Long. 5 mm.

Bolivie (Ph. Germain), 5 spécimens (coll. Kraatz).

Cette espèce est particulièrement caractérisée par l'étroitesse du front et surtout par l'échancrure antérieure de ses yeux.

## Eine neue Milbengattung aus Süd- und Mittelamerika.

Von Dr. Max Sellnick, Königsberg (Pr.).

Im 21. Band der amerikanischen wissenschaftlichen Zeitschrift *Psyche* beschreibt N. Banks 1914 auf Seite 162 eine Milbe *Trachyuro-poda tricuspis* n. sp. Sie wurde auf einem großen *Passalus* (Coleopt.) bei Itacoatiara, Amazonas, Brasilien, gesammelt. Aus der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts wurde mir vor einiger Zeit ein Röhrchen